najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: علوم تجريبية

دورة: 2019

اختبار في مادة: الرياضيات
المدة: 03 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0 = 13$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$

1) أ) برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 1$.

ب) أُدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

2) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \ln(u_n - 1)$.

أثبت أنّ المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

3) اكتب v_n بدلالة n ثم بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$ واحسب عندئذ $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

4) بيّن أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $(u_0 - 1)(u_1 - 1) \times \ldots \times (u_n - 1) = \left(\frac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يحتوي كيس على خمس كريات حمراء منها أربع كريات تحمل الرقم 1 وكرية واحدة تحمل الرقم 2 وسبع كريات خضراء منها أربع كريات تحمل الرقم 1 وثلاث كريات تحمل الرقم 2 (كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس). نسحب عشوائيا كريتين من الكيس في آن واحد ونعتبر الحادثتين A و B حيث: A : " سحب كريتين من نفس اللون " ، B : " سحب كريتين تحملان نفس الرقم " .

1) بيّن أنّ احتمال الحادثة A هو $P(A) = \frac{31}{66}$ واحسب احتمال الحادثة B.

2) علما أنّ الكريتين المسحوبتين من نفس اللون، ما احتمال أن تحملا نفس الرقم؟

3) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات الحمراء المتبقية في الكيس.

عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X واحسب أمله الرياضياتي $E(X)$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

I. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z - i)(z^2 - 4z + 5) = 0$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

II. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{u},\vec{v}\right)$ ، النقط A ، B و C التي لاحقاتها i ، $2-i$ و $2+i$ على الترتيب.

1) اكتب العدد المركب $\dfrac{z_C-z_A}{z_C-z_B}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .

2) من أجل كل عدد مركب z يختلف عن $2+i$ نضع $f(z)=\dfrac{iz-1-2i}{2z-4-2i}$

أ) عين المجموعة (E) للنقط M من المستوي ذات اللاحقة z التي تحقق: $|f(z)|=\dfrac{1}{2}$

ب) بيّن أن العدد $\left[f(i)\right]^{1440}$ حقيقي موجب.

3) نعتبر الدوران r الذي مركزه C و زاويته $\dfrac{\pi}{2}$.

أ) عيّن لاحقة D صورة B بالدوران r وبيّن أنّ النقط D، A و C في استقامية.

ب) استنتج أنّ D هي صورة النقطة A بتحويل نقطي بسيط يطلب تحديد طبيعته وعناصره .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدّالة العددية المعرفة على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ بـ : $f(x)=\dfrac{1}{x-2}+\ln x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ) احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}2} f(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}2} f(x)$ ثم فسّر النتائج بيانيا.

ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) ادرس اتجاه تغيّر الدّالة f على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ وشكّل جدول تغيُّراتها.

3) نسمي (Γ) المنحنى البياني للدّالة اللّوغاريتمية النّيبيرية "ln" في المعلم السابق.

أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)$ ثم فسّر النَّتيجة بيانيا.

ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنِّسبة إلى المنحنى (Γ).

4) ارسم بعناية المنحنى (Γ) ثمَّ المنحنى (C_f).

5) H الدّالة المعرفة على المجال $]3;+\infty[$ بـ: $H(x)=\int_3^x \ln(t)dt$ حيث t متغيّر حقيقي موجب تماما.

أ) باستعمال المكاملة بالتّجزئة، عيّن عبارة $H(x)$ بدلالة x .

ب) احسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيّز المستوي المحدَّد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x=3$ و $x=4$.

6) g الدّالة المعرَّفة على $]-1;0[\cup]-\infty;-1[$ بـ : $g(x)=f(-2x)$.

دون حساب عبارة $g(x)$ حدّد اتجاه تغيّر الدالة g على مجموعة تعريفها.

انتهى الموضوع الأول

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

التمرين الأوّل: (04 نقاط)

يحتوي صندوق على 10 كريات لا نفرق بينها عند اللّمس منها كريتان تحملان الرقم 0 وثلاث تحمل الرقم1 والكريات الأخرى تحمل الرقم 2. نسحب عشوائياً وفي آنٍ واحدٍ ثلاث كريات من الصندوق.

ليكن X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل سحب، جداء الأرقام المسجّلة على الكريات المسحوبة.

1) عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

2) بيّن أنّ احتمال الحصول على ثلاث كريات كل منها تحمل رقماً زوجياً هو $\frac{7}{24}$.

3) نسحب الآن من الصندوق كريتين على التوالي دون إرجاع.

ما احتمال الحصول على كريتين تحملان رقمين مجموعهما فردي علما أن جداءهما زوجي؟

التمرين الثاني: (04 نقاط)

f الدّالة المعرّفة على المجال $]4\,;7]$ بـ: $f(x)=\sqrt{x+2}+4$.

1) أ) بيّن أنّ الدالة f متزايدة تماما على المجال $]4\,;7]$.

ب) استنتج أنّه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]4\,;7]$ فإنّ $f(x)\in[4\,;7[$.

2) برهن أنّه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]4\,;7]$ فإنّ $f(x)-x=\frac{-x^2+9x-14}{x-4+\sqrt{x+2}}$.

ثمّ استنتج أنّه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]4\,;7[$ فإنّ $f(x)-x>0$

3) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ : $u_0=4$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_{n+1}=f(u_n)$.

أ) برهن بالتّراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n $4\le u_n<7$.

ب) استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ثمّ بيّن أنّها متقاربة.

4) أ) بيّن أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n $7-u_{n+1}<\frac{1}{4}(7-u_n)$.

ب) استنتج أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n $0<7-u_n<3\left(\frac{1}{4}\right)^n$ ، ثمَّ احسب نهاية المتتالية (u_n).

التمرين الثالث: (05 نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$.

نعتبر النّقط A، B و C التي لاحقاتها z_A، z_B و z_C على التّرتيب حيث:

$z_A=\sqrt{2}+i\sqrt{6}$ ، $z_B=\overline{z_A}$ و $z_C=-2z_A$.

1) أ) اكتب العدد المركب z_A على الشكل الأسي .

ب) احسب العدد $\left(\frac{z_A}{2\sqrt{2}}\right)^{2019}+\left(\frac{z_B}{2\sqrt{2}}\right)^{2019}$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2) أ) T الانسحاب الذي يحوّل A إلى C، عيّن z_D لاحقة النّقطة D صورة B بالانسحاب T.

ب) استنتج طبيعة الرّباعي $ABDC$.

3) اكتب العدد المركب $z_C - z_A$ على الشكل الأسي.

4) جد قيم العدد الطّبيعي n التي يكون من أجلها العدد المركب $\left(\frac{-6\sqrt{2}}{z_C - z_A}\right)^n$ عددا حقيقيا.

5) لتكن M نقطة كيفيّة من المستوي لاحقتها z حيث M تختلف عن A وتختلف عن C .

عيّن (E) مجموعة النّقط M التي من أجلها يكون $\frac{z_A - z}{z_C - z}$ عددا حقيقيا موجبا تماما.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. تُؤخذ وحدة الطول $2cm$

$(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$ التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرّفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x) = e^x - ex \quad \text{و} \quad f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2$$

1) أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g.

ب) استنتج اشارة $g(x)$ حسب قيم x الحقيقية.

2) ادرس اتجاه تغيّر الدالة f .

3) احسب كلاً من $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ؛ ثمّ شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

4) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين $(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$ على $\mathbb{R}$.

5) ارسم على المجال $[0;2]$ المنحنيين $(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$ في نفس المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$. (يُعطى $e^2 - 2e \approx 2$)

6) احسب بالسنتمتر المربّع، مساحة الحيّز المستوي المحدّد بالمنحنيين $(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$.

7) h الدالة المعرّفة على المجال $[-2\ ;\ 2]$ كما يلي: $h(x) = \frac{1}{2}ex^2 - e^{|x|}$ و ليكن (Γ) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ) بيّن أنّ h دالة زوجية.

ب) من أجل $x \in [0\ ;\ 2]$ احسب $h(x) + f(x)$ ثم استنتج كيفية رسم (Γ) انطلاقا من $(\mathcal{C}_f)$ ثم ارسمه.

انتهى الموضوع الثاني

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: **الرياضيات** //الشعب(ة): علوم تجريبية// بكالوريا: 2019

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجم
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1) أ) تبيان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n > 1$: .	**0.75×2**	
ب) دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n) واستنتاج تقاربها :		
(u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$	**0.50**	
بما أن (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة	**0.50**	
2) إثبات أن المتتالية (v_n) حسابية وتعيين أساسها وحدها الأول :		
من أجل كل عدد طبيعي n : $v_{n+1}-v_n=-\ln 5$	**0.25**	
حدها الأول v_0 : $v_0=\ln(12)$	**0.25**	**04**
3) كتابة v_n بدلالة n : $v_n=\ln\left(\frac{12}{5^n}\right)$	**0.25**	
تبيان أن $u_n=1+\frac{12}{5^n}$	**0.25**	
حساب نهاية المتتالية (u_n) : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=1$	**0.25**	
4) تبيان أن : $(u_0-1)(u_1-1)\times\ldots\times(u_n-1)=\left(\frac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}$	**0.25**	
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1) تبيان أن : $P(A)=\frac{31}{66}$	**01**	
$P(B)=\frac{17}{33}$	**01**	**3.75**
2) احتمال أن تحملا نفس الرقم: $P(B/A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{15}{31}$	**0.25**	
3) أ) قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X :	**025×3**	

x_i	3	4	5
$P(X=x_i)$	$\frac{10}{66}$	$\frac{35}{66}$	$\frac{21}{66}$

0.25×3

الأمل الرياضياتي $E(X)=\frac{275}{66}$	**0.25**	**0.25**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
ا. حلول المعادلة هي : $2+i$ ، $2-i$ ، i	0.5×3	05
II.**1)** $\frac{z_C-z_A}{z_C-z_B}=-i=e^{-i\frac{\pi}{2}}$	0.75	
المثلث ABC قائم في C ومتساوي الساقين.....	0.50	
2)- أ) (E) هي محور القطعة $[BC]$	0.75	
- ب) $f(i)=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ و $\left[f(i)\right]^{1440}\in\mathbb{R}^+$	0.75	
3)- أ) $z_D=4+i$ و $\frac{z_C-z_A}{z_C-z_D}=-1$ أي $\overrightarrow{CD}=-\overrightarrow{CA}$. النقط في استقامية.....	0.5	
- ب) D هي صورة A بتحاك مركزه C ونسبته -1 أو بدوران مركزه C وزاويته π ..... أو بتناظر مركزي بالنسبة لـ C أو بتشابه مباشر نسبته 1 مركزه C وزاويته π	0.25	
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
1) أ) $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}2}f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}2}f(x)=+\infty$	0.5×3	2.5
التفسير الهندسي: $x=0$ و $x=2$ معادلتين للمستقيمين المقاربين للمنحنى (C_f)	0.25×2	
ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$	0.5	
2) اتجاه تغير الدّالة f : لدينا $f'(x)=\frac{x^2-5x+4}{x(x-2)^2}$	0.5	01.75
إشارة $f'(x)$	0.50	
f متزايدة تماما على كلّ من المجالين: $]4;+\infty]$ و $[0;1[$ و f متناقصة تماما على كلّ من المجالين $]1;2]$ و $[2;4[$ وتشكيل جدول التغيرات	3×0.25	
3) أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)=0$	0.5	0.75
التّفسير البياني: (Γ) منحنى مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.	0.25	
ب) وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المنحنى (Γ) : لدينا $f(x)-\ln x=\frac{1}{x-2}$	0.5	0.5
إذن: على المجال $]0;2[$: (C_f) يقع تحت (Γ)		
وعلى المجال $]2;+\infty[$: (C_f) يقع فوق (Γ).		
4) الرسم.....	0.5	0.5

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
5) أ) باستعمال المكاملة بالتّجزئة نجد : $H(x)=\int_3^x (\ln t)dt=-x+3+x\ln x-3\ln 3$.	**0.25**	**0.5**
ب) المساحة $\mathcal{A}=(-1+9\ln 2-3\ln 3)\ (u.a)$.	**0.25**	
6) g الدّالة المعرَّفة على المجموعة $]-\infty;-1[\cup]-1;0[$ بـ : $g(x)=f(-2x)$. $g'(x)=-2f'(-2x)$ الدالة g متناقصة على $\left]-\infty;-2\right[\cup\left]\frac{-1}{2};0\right[$ ومتزايدة على $\left]-2;-1\right[\cup\left]-1;\frac{-1}{2}\right[$	**0.25** **0.25**	**0.5**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1)عدد الامكانيات هو 120 ،	**0.5**	**02.5**
قانون الاحتمال: . قيم X هي 1،0، 2 ، 4 ، 8 مع احتمالاتها	**01.5**	
الامل الرياضياتي هو $\frac{231}{120}$	**0.50**	
2)احتمال الحصول على 3كريات تحمل كل منها رقما زوجيا $\frac{7}{24}$	**01**	**01**
3)احتمال الحصول على كرتين تحملان رقمين مجموعهما فردي علما أن الجداء زوجي هو $\frac{1}{2}$	**0.25×2**	**0.5**
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1) أ) $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x+2}}$ ومنه الدّالة f متزايدة تماما على المجال $[4;7[$.	**0.75**	**01.25**
ب) من أجل كلّ عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ يكون: $f(x)\in[4;7[$	**0.5**	
2) $f(x)-x=\frac{-x^2+9x-14}{\sqrt{x+2}+x-4}$ ومن أجل كلّ x من المجال $[4;7[$: $f(x)-x>0$.	**0.75**	**0.75**
3) أ) برهان بالتّراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $4\leq u_n<7$.	**0.75**	**01.25**
ب) لدينا: $u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n$ إذن: $u_{n+1}-u_n>0$ ومنه : (u_n)متزايدة تماما.	**0.25**	
(u_n) متقاربة.	**0.25**	
4) أ) **برهان** أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $7-u_{n+1}<\frac{1}{4}(7-u_n)$.	**0.25**	**0.75**
ب) استنتاج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $0<7-u_n<\frac{3}{4^n}$	**0.25**	
و $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=7$ حسب مبرهنة الحصر.	**0.25**	
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
1) أ) الشكل الآسي لـ z_A .	**01**	**01.5**
ب) حساب $\left(\frac{z_A}{2\sqrt{2}}\right)^{2019}+\left(\frac{z_B}{2\sqrt{2}}\right)^{2019}$	**0.5**	
2) أ) حساب z_Dصورة B بواسطة T	**0.75**	**01.5**
ب) الرّباعي $ABDC$ متوازي أضلاع.	**0.75**	
3) الشكل الأسّي للعدد المركب z_C-z_A هو $6\sqrt{2}e^{i\frac{4\pi}{3}}$.	**0.75**	**0.75**
4) لدينا $\left(\frac{-6\sqrt{2}}{z_C-z_A}\right)^n=e^{-in\frac{\pi}{3}}$	**0.5**	**0.5**
$\left(\frac{-6\sqrt{2}}{z_C-z_A}\right)^n$ عدد حقيقي يعني أن: $n=-3k$ حيث $k\in\mathbb{Z}_-$.		

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
5) M نقطة كيفية من المستوي لاحقتها z تختلف عن A و C. (E) هي المستقيم (AC) باستثناء القطعة المستقيمة $[AC]$ أي أن $(E)=(AC)-[AC]$	**0.75**	**0.75**
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
1) أ) دراسة اتجاه تغيّر الدالة g: ليكن $x\in\mathbb{R}$: $g'(x)=e^x-e$	**0.5×2**	**02**
ب) الدالة g تقبل قيمة حدّية صغرى: لدينا $g(1)=e^1-e=0$ اذن من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $g(x)\geq 0$	**0.5×2**	
2) دراسة اتجاه تغيّر الدالة f: ليكن $x\in\mathbb{R}$: $f'(x)=e^x-ex=g(x)$.	**0,50**	**01**
لدينا $f'(1)=g(1)=0$ ومن أجل $x\in\mathbb{R}-\{1\}$: $g(x)>0$ أي $f'(x)>0$ إذاً الدالة f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$.	**0,50**	
3) حساب كلاً من $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}e^x-\frac{1}{2}ex^2=-\infty$ لأنّ $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}-\frac{1}{2}ex^2=-\infty$.	**0.25**	**0.75**
$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^x-\frac{1}{2}ex^2\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\frac{e^x}{x^2}-\frac{1}{2}e\right)=+\infty$ لأنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^2}=+\infty$.	**0.25**	
جدول التغيرات	**0.25**	
4) دراسة الوضعية النسبية للمنحنيين $(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$. ليكن $x\in\mathbb{R}$: $f(x)-g(x)=ex\left(-\frac{1}{2}x+1\right)$	**0,50**	**0.50**
$x\in]-\infty;0[\cup]2;+\infty[$: $(\mathcal{C}_f)$ تحت $(\mathcal{C}_g)$ $x\in]0;2[$: $(\mathcal{C}_f)$ فوق $(\mathcal{C}_g)$ $x\in\{0;2\}$: $(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$ متقاطعان	**0,75**	**0.75**
5) الرسم : $(\mathcal{C}_f)$	**0.25**	**0.50**
$(\mathcal{C}_g)$	**0.25**	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

najah213.com · نجاح 213

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
6) حساب بالسنتمتر المربّع، مساحة الحيّز المستوي المحدّد بالمنحنيين $(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$. $A=\int_0^2[g(x)-f(x)]dx=\int_0^2\left(-\frac{1}{2}ex^2+ex\right)dx=\left[-\frac{1}{6}ex^3+\frac{1}{2}ex^2\right]_0^2$ $A=-\frac{8e}{6}+\frac{4e}{2}=-\frac{4e}{3}+2e=\frac{2e}{3}ua$	**0.25**	**0.5**
$A=\frac{8e}{3}cm^2$	**0.25**	
7) أ) h دالة زوجية.....	**0.25**	**01**
ب) حساب $h(x)+f(x)$	**0.25**	
استنتاج كيفية رسم (Γ) انطلاقا من $(\mathcal{C}_f)$.....	**0.25**	
الرسم.....	**0.25**	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com