najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الثانويات :**زريمش عيسى(حمام دباغ) ـ هواري بومدين (عين احساينية)**

امتحان الثلاثي الثاني للتعليم الثانوي — **بتاريخ:27 فيفري 2017**

الشعبة : الثالثة تقني رياضي

اختبار في مادة: الرياضيات — **المدة: 03 سا و 30 د**

التمرين الأول: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط $A(1;0;1)$، $B(2;-1;1)$ و $C(0;1;1)$

1) تحقق أن النقط A ، B و C لا تعين مستويا وحيدا.

2) (P_m) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق: $m\,x-y+(2-m)z+m+4=0$ ، m عدد حقيقي

أ) بين أن (P_m) مستو من أجل كل عدد حقيقي m.

ب) بين ان جميع المستويات (P_m) تتقاطع في نفس المستقيم (Δ) الذي يطلب تعيين تمثيلا وسيطيا لـه .

3) أ) أحسب إحداثيات النقطة H المعرفة بـ $2.\overrightarrow{HA}-\overrightarrow{HB}+e.\overrightarrow{HC}=\vec{0}$ (e أساس اللوغاريتم النيبيري)

ب) أحسب المسافة بين النقطة H و المستقيم (Δ).

4) أ) أوجد (S) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق: $\left\|2.\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+e.\overrightarrow{MC}\right\|=\sqrt{5}.(1+e)$

ب) أوجد المستويات (P_m) التي تمس المجموعة (S).

التمرين الثاني: (04 نقاط)

1) حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة ذات المجهول z : $(I)\ldots z^2-2\sqrt{3}z+4=0$

ثم اكتب الحلول على الشكل المثلثي.

2) المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O,\vec{u},\vec{v})$ ، لتكن النقط A ، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A=2i$, $z_B=\sqrt{3}+i$, $z_C=\overline{z_B}$ ، وليكن العدد المركب L حيث: $L=\dfrac{(1-i)z_B}{z_C}$

أ*/ أكتب العدد L على الشكل الأسي .ثم أحسب L^{2016}

ب*/ عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد L^n تخيلي صرف.

3) أ*/ بين أنه يوجد دوران r مركزه B و يحول A الى C ، يطلب تعيين زاويته.

ب*/ استنتج طبيعة المثلث ABC واحسب مساحته .

4) أ*/ عين (E_1) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z بحيث يكون العدد $\dfrac{z-\sqrt{3}+i}{z-2i}$ حقيقي موجب.

ب*/عين (E_2) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z بحيث يكون $i\,z=-1+i\sqrt{3}+2i\,e^{i\theta}$ عندما θ يمسح .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثالث: (05 نقاط)

1) بين أن العدد 2017 أولي.

2) نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x;y)$: $14119x-10085y=22187$.....(E)

أ*/ أوجد القاسم المشترك الأكبر للأعداد : 22187 ; 10085 ; 14119 .

ب*/ بين أن الثنائية $(3;2)$ حلا خاصا للمعادلة (E) ثم عين مجموعة حلولها .

ج*/ عين الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) بحيث يكون $p\ \gcd(x;y)=11$.

3) أ*/ أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية لكل من العددين 5^n و 7^n على 11.

ب*/عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد 5^n+7^{2017} قابلا للقسمة على 11.

4) ليكن a و b عددان طبيعيان غير معدومين كلا منهما أصغر من 8 ، نعتبر العدد $N=\overline{a01b}$ مكتوب في النظام العشري .

أ*/ تحقق أن: $10^3\equiv -1[11]$.

ب*/ عين قيم العدد الطبيعي N حيث باقي قسمته على 11 هو 4 ،

ج*/ ثم أكتب هذه القيم في النظام ذي الأساس 11.

التمرين الرابع: (07 نقط)

نعتبر الدالة f للمتغير الحقيقي x المعرفة على $D_f=\mathbb{R}-\{-1;0\}$ بـ : $f(x)=x+1+2\ln\left|\dfrac{x+1}{x}\right|$

(C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$.

1) أدرس تغيرات الدالة f.

2) أ*/ بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.

ب*/ x عدد حقيقي من D_f: أحسب $f(x)+f(-1-x)$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا .

3) أ*/ برهن انه يوجد مماس (Δ) للمنحنى (C_f) يعامد المستقيم ذو المعادلة $x+9y=0$، يطلب كتابة معادلته المماس (Δ).

ب*/ بين أن المعادلة: $\left(\dfrac{x+1}{x}\right)^2=\dfrac{1}{e^{x+1}}$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]-0.6;-0.5[$ ، ثم فسر النتيجة .

4) أ*/ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (D) ذو المعادلة: $y=x+1$

ب*/ ارسم (Δ) ، (D) و (C_f).

5) ليكن المستقيم (D_m) ذو المعادلة $y=m\left(x+\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{1}{2}$ ، m وسيط حقيقي .

** بين أنه عندما يتغير m في $\mathbb{R}$ جميع المستقيمات (D_m) تمر من نقطة ثابتة يطلب تعيينها.

إذا أنت لم تَزرَع وأبصرتَ حاصدَاً ندمتَ على التفريط في زَمَنِ البَذرِ

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

عرض حال الامتحان الثاني – الثالثة تقني رياضي 2017

التمرين الأول: (04 نقاط)

$A(1;0;1)$ ، $B(2;-1;1)$ و $C(0;1;1)$

1) التحقق أن النقط A ، B و C لا تعين مستويا وحيدا:

$\overrightarrow{AB}(1;-1;0)$ ، $\overrightarrow{AC}(-1;1;0)$

بما أن: $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{AC}$ فإن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ مرتبطان خطيا وبالتالي النقط A ، B و C على استقامة واحدة ومنه النقط A ، B و C تعين ما لا نهاية من المستويات.وهي حزمة المستويات المتقاطعة وفق المستقيم المار بالنقط الثلاث.

2) (P_m) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق:

$m\,x-y+(2-m).z+m+4=0$ ، m عدد حقيقي

أ) نبين أن (P_m) مستوي من أجل كل عدد حقيقي m :

لدينا:من أجل كل m من $\mathbb{R}$ الثلاثية $(m;-1;2-m)\neq(0;0;0)$

ومنه: (P_m) مستوي من أجل كل عدد حقيقي m .

ب) نبين ان جميع المستويات (P_m) تتقاطع في نفس المستقيم (Δ) الذي يطلب تعيين تمثيلا وسيطيا لـه :

$m\,x-y+(2-m).z+m+4=0$ يكافئ

$(-y+2z+4)+m(x-z+1)=0$ يكافئ

$(-y+2z+4=0)$ و $(x-z+1=0)$

ومنه: (Δ) معرف بالجملة : $\begin{cases}x-z+1=0\\y-2z-4=0\end{cases}$

أي أن $\begin{cases}x=-1+z\\y=4+2z\end{cases}$ بوضع: $z=t$ ، t عدد حقيقي

ومنه:التمثيل الوسيطي لـ (Δ) هو: $\begin{cases}x=-1+t\\y=4+2t\\z=t\end{cases}$; $t\in\mathbb{R}$

3)أ)حساب إحداثيات النقطة H حيث $2.\overrightarrow{HA}-\overrightarrow{HB}+e.\overrightarrow{HC}=\vec{0}$

بما أن: $2-1+e\neq 0$ فإن النقطة H موجودة و وحيدة هي مرجح الجملة $\{(A;2),(B;-1),(C;e)\}$

ومنه: $H=C(0,1,1)$ $\begin{cases}x_H=\dfrac{2x_A-1x_B+ex_C}{2-1+e}=0\\y_H=\dfrac{2y_A-1y_B+e.y_C}{2-1+e}=1\\z_H=\dfrac{2z_A-1z_B+ez_C}{2-1+e}=1\end{cases}$

ب) المسافة بين النقطة H و المستقيم (Δ) : لتكن النقطة H' المسقط العمودي لـ H على المستقيم (Δ) ، $\vec{u}(1,2,1)$ شعاع توجيهه ، $\overrightarrow{HH'}(x_{H'},y_{H'}-1,z_{H'}-1)$

معناه $\begin{cases}\overrightarrow{HH'}.\vec{u}=0\\H'\in(\Delta)\end{cases}$,$t\in\mathbb{R}$ معناه $\begin{cases}x_{H'}+2y_{H'}+z_{H'}-3=0\\x_{H'}=-1+t\\y_{H'}=4+2t\\z_{H'}=t\end{cases}$

معناه $(-1+t)+2(4+2t)+t-3=0$ ومنه $t=\dfrac{-2}{3}$

$H'\left(\dfrac{-5}{3};\dfrac{8}{3};\dfrac{-2}{3}\right)$

$d(H;(\Delta))=HH'=\sqrt{\left(-\frac{5}{3}-0\right)^2+\left(\frac{8}{3}-1\right)^2+\left(-\frac{2}{3}-1\right)^2}=\frac{5}{\sqrt{3}}$

4) أ) إيجاد (S) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق $\left\|2.\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+e.\overrightarrow{MC}\right\|=\sqrt{5}.(1+e)$:

$M\in(S)$ معناه $\left\|2.\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+e.\overrightarrow{MC}\right\|=\sqrt{5}.(1+e)$

معناه $\left\|(2-1+e)\overrightarrow{MH}\right\|=\sqrt{5}.(1+e)$ معناه $\left\|\overrightarrow{MH}\right\|=\sqrt{5}$

ومنه (S) سطح كرة مركزها النقطة H ونصف قطرها $\sqrt{5}$

ب) إيجاد المستويات (P_m) التي تمس المجموعة (S) :

المستويات (P_m) تمس المجموعة (S) معناه $d(H;(P_m))=\sqrt{5}$

$d(H;(P_m))=\dfrac{|m\,x_H-y_H+(2-m)z_H+m+4=0|}{\sqrt{m^2+(-1)^2+(2-m)^2}}=\dfrac{5}{\sqrt{2m^2-4m+5}}$

$\dfrac{5}{\sqrt{2m^2-4m+5}}=\sqrt{5}$ معناه $\sqrt{5}\sqrt{2m^2-4m+5}=5$

معناه $m^2-2m=0$ $m=0$ أو $m=2$ ومنه:

$(p_0):-y+2z+4=0$ أو $(p_2):2x-y+6=0$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

1) نحل في $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z : $z^2-2\sqrt{3}z+4=0$

$\Delta=-4$ ، بما أن $\Delta\prec 0$ فان المعادلة تقبل حلين متمايزين

$z_1=\sqrt{3}-i$ أو $z_2=\sqrt{3}+i$ ومنه: $S=\{\sqrt{3}-i;\sqrt{3}+i\}$

كتابة الحلول على الشكل المثلثي:

$z_1=2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$ ، $z_2=2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$

2) أ) كتابة العدد L على الشكل الأسي ثم حساب L^{2016} :

لدينا: $z_A=2i$, $z_B=\sqrt{3}+i$, $z_C=\overline{z_B}$ ، $L=\dfrac{(1-i)z_B}{z_C}$

$z_B=2e^{i\frac{\pi}{6}}$, $z_C=2e^{i\left(-\frac{\pi}{6}\right)}$ ، $1-i=\sqrt{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{4}\right)}$

ومنـــــه: $L=\dfrac{\sqrt{2}e^{i\left(-\frac{\pi}{4}\right)}2e^{i\frac{\pi}{6}}}{2e^{i\left(-\frac{\pi}{6}\right)}}=\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}$

$L^{2016}=\sqrt{2}^{2016}e^{i.2016\frac{\pi}{12}}=\sqrt{2}^{2016}e^{i.168\pi}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$$L^{2016}=\sqrt{2}^{2016}\left[\cos(186\pi)+i\sin(186\pi)\right]=\sqrt{2}^{2016}$$

ب) تعيين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون L^n تخيلي صرف:

لدينا: $L=\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}$، أي أن $L^n=\sqrt{2}^n e^{i.\left(n\frac{\pi}{12}\right)}$

$$L^n=\sqrt{2}^n\left[\cos\left(n\frac{\pi}{12}\right)+i.\sin\left(n\frac{\pi}{12}\right)\right]$$

L^n عدد تخيلي صرف معنـاه $\cos\left(n\frac{\pi}{12}\right)=0$

معناه $n\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{2}+k\pi$ ومنه: $n=12k+6$ ، $k\in\mathbb{Z}$

3) أ) نبين أنه يوجد دوران r مركزه النقطة B و يحول A إلى C، يطلب تعيين زاويته: ليكن r تحويل عبارته المركبة من الشكل $z'=az+b$ حيث $a;b$ عددا ن مركبان

لدينا: $\begin{cases}r(A)=C\\r(B)=B\end{cases}$ معناه $\begin{cases}z_C=az_A+b\ldots(1)\\z_B=az_B+b\ldots(2)\end{cases}$

بطرح (2) من (1) نجد: $a=\frac{z_C-z_B}{z_A-z_B}=\frac{-1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$

من(2) نجد : $b=z_B-az_B=z_B(1-a)=2\sqrt{3}$

ومنه: $z'=\left(\frac{-1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z+2\sqrt{3}$ بما ان $|a|=\left|\frac{-1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right|=1$

فإن r هو دوران مركزه B وزاويته $\arg(a)=\frac{2\pi}{3}$

ب)استنتاج طبيعة المثلث ABC وحساب مساحته :

لدينا: $AB=BC$ و $\arg\left(\frac{z_C-z_B}{z_A-z_B}\right)=(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC})=\frac{2\pi}{3}$

اذن المثلث ABC متقايس الضلعين

لتكن $z_{B'}$ لاحقة منتصف $[AC]$، $z_{B'}=\frac{z_A+z_C}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$

$[BB']$ارتفاع و عمود و متوسط و محور متعلق بـ$[AC]$

في المثلث ABC المتقايس الضلعين مساحته $S=\frac{BB'\times AC}{2}$

ومنه: $S=\sqrt{3}ua$ ، $AC=|z_C-z_A|=2\sqrt{3}$ ، $BB'=|z_{B'}-z_B|=1$

4) أ)تعيين (E_1) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z بحيث يكون العدد $\frac{z-\sqrt{3}+i}{z-2i}$ حقيقي موجب: لدينا: $\frac{z-\sqrt{3}+i}{z-2i}=\frac{z-z_C}{z-z_A}$

$\frac{z-\sqrt{3}+i}{z-2i}$ حقيقي موجب معناه $\arg\left(\frac{z-z_C}{z-z_A}\right)=2\pi k;k\in\mathbb{Z}$

$$\arg\left(\frac{z-z_C}{z-z_A}\right)=(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MC})=2\pi k;k\in\mathbb{Z}$$

ومنه: (E_1) هي المستقيم (AC) باستثناء القطعة $[AC]$

ب)تعيين (E_2) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z بحيث يكون

قيم n	$n=4k$	$n=4k+1$	$n=4k+2$	$n=4k+3$	$[4]$
$5^n\equiv$	1	5	4	9	$[11]$

$i\,z=-1+i\sqrt{3}+2ie^{i\theta}$ **عندما** θ **يمسح** $\mathbb{R}$:

لدينا: $i\,z=-1+i\sqrt{3}+2ie^{i\theta}=i\left(i+\sqrt{3}+2e^{i\theta}\right)$

أي أن: $z=\sqrt{3}+i+2e^{i\theta}=z_B+2e^{i\theta}$ ، θ **يمسح** $\mathbb{R}$

ومنه: (E_2) هي دائرة مركزها النقطة B و نصف قطرها 2

التمرين الثالث: (05 نقاط)

1) نبين أن العدد 2017 أولي: $\sqrt{2017}\approx 44.91$

بما أن 2017 لا يقبل القسمة على الاعداد الاولية الاصغر من $\sqrt{2017}$ فإن 2017 عدد أولي.

2)أ)إيجاد القاسم المشترك الأكبر للأعداد:

لدينا: $14119=7\times 2017$ ، $14119;10085;22187$

$10085=5\times 2017$ ، $22187=11\times 2017$ ومنه:

$p\ \gcd(14119;10085;22187)=2017$

تصبح المعادلة $(E):7x-5y=11$

ب) نبين أن الثنائية $(3;2)$ حلا خاصا للمعادلة (E):

بالتعويض في المعادلة (E) نجد: $7(3)-5(2)=11$ محققة .

تعيين حلول المعادلة (E): $\begin{cases}7x-5y=11\ldots(1)\\7(3)-5(2)=11\ldots(2)\end{cases}$

بطرح (2) من (1) نجد: $7(x-3)=5(y-2)$

بما أن: 7 يقسم $5(y-2)$ والعددان 5،7 أوليان فيما بينهما

فإن حسب مبرهنة غوص نجد: 7 يقسم $y-2$

ومنه: $y=7k+2$ ، $k\in\mathbb{Z}$ وتعويضها في المعادلة (1)

نجد: $y=5k+3$ ، $k\in\mathbb{Z}$ ومنه:

$$S=\left\{(5k+3;7k+2);k\in\mathbb{Z}\right\}$$

ج) تعيين الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) بحيث يكون $p\ \gcd(x;y)=11$:

معناه: $p\ \gcd(x;y)=11$ أي $\begin{cases}x=0[11]\\y=0[11]\end{cases}$ $\begin{cases}5k+3\equiv 0[11]\\7k+2\equiv 0[11]\end{cases}$

بالجمع نجد: $12k+5\equiv[11]$ أي: $k=11k'+6$ $(k'\in\mathbb{Z})$

ومنه الثنائيات $(x;y)$ المطلوبة هي :

$(55k'+33;77k'+44)$ حيث $(k'\in\mathbb{Z})$

3)أ)دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية لكل من العددين 5^n و 7^n على 11:

$5^0\equiv 1[11],5\equiv 5[11],5^2\equiv 4[11],5^3\equiv 9[11],5^4\equiv 1[11]$

ومنه بواقي قسمة 5^n على 11 متتالية دورية ودورها 4.

من أجـــل كل عدد صحيح k :

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

بواقي قسمة 7^n على 11:

$7^0\equiv 1[11], 7^1\equiv 7[11], 7^2\equiv 5[11], 7^3\equiv 2[11], 7^4\equiv 3[11]$

$7^5\equiv 10[11], 7^6\equiv 4[11], 7^7\equiv 6[11], 7^8\equiv 9[11], 7^9\equiv 8[11], 7^{10}\equiv 1[11]$,

ومنه بواقي قسمة 7^n على 11 متتالية دورية ودورها 10

$n\equiv$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	[10]
$7^n\equiv$	1	7	5	2	3	10	4	6	9	8	[11]

ب)تعيين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد 5^n+7^{2017} قابلا للقسمة على 11: لدينا: $7+10(201)=2017$ أي ان $7^{2017}\equiv 6[11]$ أي ان : $5^n+6\equiv 0[11]$ ومنه: $5^n\equiv 5[11]$

إذن: $n=4k+1$ حيث $k\in\mathbb{N}$.

4) أ) التحقق أن $10^3\equiv -1[11]$:

لدينا $10\equiv -1[11]$ أي $10^3\equiv(-1)^3[11]$ ومنه $10^3\equiv -1[11]$

ب)تعيين قيم N حيث $N\equiv 4[11]$:

لدينا $N=\overline{a01b}^{10}=a\cdot 10^3+10+b$ أي $-a-1+b\equiv 4[11]$

ومنه: $b-a\equiv 5[11]$ وبما أن $a;b$ عددان طبيعيان أصغر من 8

فإن: $a=1,b=6$ و $N=1016$ أو $a=2,b=7$ و $N=2017$

أو $a=7,b=1$ و $N=7011$ ومنه قيم N هي: $1016;2017;7011$

ج)كتابة قيم العدد الطبيعي N في نظام التعداد ذي الأساس 11

$1016=\overline{844}^{11}$, $2017=\overline{1574}^{11}$, $7011=\overline{52\alpha 4}^{11}$ حيث $\alpha=10$

التمرين الرابع: (07 نقط)

f المعرفة على $D_f=\mathbb{R}-\{-1;0\}$ بـ: $f(x)=x+1+2\ln\left|\frac{x+1}{x}\right|$

1) دراسة تغيرات الدالة f:

النهايات: $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ ، $\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(x+1+2\ln\left|\frac{x+1}{x}\right|\right)=+\infty$

$\lim_{x\to 0^-}f(x)=+\infty$ ، $\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\left(x+1+2\ln\left|1+\frac{1}{x}\right|\right)=+\infty$

$\lim_{x\to(-1)}f(x)=-\infty$ ، $\lim_{x\to -1^+}f(x)=\lim_{x\to -1^+}\left(x+1+2\ln\left|1+\frac{1}{x}\right|\right)=-\infty$

اتجاه التغير:

f قابلة للاشتقاق على D_f دالتها المشتقة f': $f'(x)=\frac{x^2+x-2}{x(x+1)}$

$f'(x)=0$ معناه $x^2+x-2=0$ معناه $x=-2$ أو $x=1$

، ثم تفسير النتيجة : $]-0.6;-0.5[$

x	$-\infty$		-2		-1		0		1		$+\infty$
x^2+x-2		$+$	0	$-$	‖	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$x(x+1)$		$+$		$+$	‖	$-$	‖	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	‖	$-$	0	$+$	

الدالة f متناقصة تماما على $[-2;-1[\cup]0;1]$

جدول التغيرات:

x	$-\infty$		-2		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$-1-ln4$	↘	$-\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$2+ln4$	↗	$+\infty$

2) أ) بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها:

الدالة f قابلة للاشتقاق على D_f مرتين: $f''(x)=\frac{4x+2}{[x(x+1)]^2}$

x	$-\infty$		-1		$-1/2$		0		$+\infty$
$4x+2$		$-$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$f''(x)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	

بما ان: $f''(x)$ تنعدم عند $x=\frac{-1}{2}$ مغيرة إشارتها فإن المنحنى (C_f) يقبـــل نقطة انعطاف له $\omega\left(\frac{-1}{2};\frac{1}{2}\right)$

ب*/ x عدد حقيقي من D_f حساب: $f(-1-x)+f(x)$

x من D_f، $(-1-x)$ من D_f : $f(-1-x)+f(x)=1$

تفسير النتيجة بيانيا : لدينا: $f(-1-x)+f(x)=1$ أي أن

$$f\left(2\left(\frac{-1}{2}\right)-x\right)=2\left(\frac{1}{2}\right)-f(x)$$

ومنه: النقطة $\omega\left(\frac{-1}{2};\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)

3) أ) نبرهن انه يوجد مماس (Δ) للمنحنى (C_f) يعامد المستقيم ذو المعادلة $x+9y=0$ ، يطلب كتابة معادلة المماس (Δ)

$x+9y=0$ معناه معامل توجيه هذا المستقيم $y=\frac{-1}{9}x$

$f'(x).\frac{-1}{9}=-1$ معناه $\frac{x^2+x-2}{x(x+1)}\left(\frac{-1}{9}\right)=-1$ معناه $4x^2+4x+1=0$

ومنه: $x=\frac{-1}{2}$ اذن يوجد مماس (Δ) وحيد للمنحنى (C_f) في النقطة $\omega\left(\frac{-1}{2};\frac{1}{2}\right)$ معادلته : $y=9x+5$

03

تبين أن المعادلة: $\left(\frac{x+1}{x}\right)^2=\frac{1}{e^{x+1}}$ تقبل حلا وحيدا في المجال

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

$\left(\frac{x+1}{x}\right)^2=\frac{1}{e^{x+1}}$ يكافئ $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)^2=\ln\left(\frac{1}{e^{x+1}}\right)$ يكافئ

$2\ln\left|\frac{x+1}{x}\right|=-x-1$ يكافئ $x+1+2\ln\left|\frac{x+1}{x}\right|=0$ يكافئ $f(x)=0$

$f(-0.5)=0.5$ ، $f(-0.6)=-0.41$

بما ان الدالة f مستمرة متزايدة تماما على $]-0.6;-0.5[$،

و $f(-0.6)f(-0.5)\prec 0$ فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة

المعادلة $\left(\frac{x+1}{x}\right)^2=\frac{1}{e^{x+1}}$ تقبل حل وحيد α في $]-0.6;-0.5[$


المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة واحدة فاصلتها α حيث $-0.6\prec\alpha\prec-0.5$

4) أ)دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (D) ذو المعادلة $y=x+1$: ندرس اشارة الفرق

$$f(x)-y=2\ln\left|\frac{x+1}{x}\right|=\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)^2$$

x	$-\infty$	-1		$\frac{-1}{2}$		0	$+\infty$
$f(x)-y$	$-$	$\|$	$-$	0	$+$	$\|$	$+$
وضعية (C_f) بالنسبة لـ (D)	(C_f) تحت (D)	$\|$	(C_f) تحت (D)	(C_f) يقطع (D) في $\omega\left(\frac{-1}{2};\frac{1}{2}\right)$	(C_f) فوق (D)	$\|$	(C_f) فوق (D)

ب) رسم (Δ) ، (D) و (C_f):



5) ليكن المستقيم (D_m) ذو المعادلة $y=m\left(x+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}$

****نبين أنه عندما يتغير m في $\mathbb{R}$ جميع المستقيمات (D_m)**

تمر من نقطة ثابتة يطلب تعيينها : m وسيط حقيقي

$m\left(x+\frac{1}{2}\right)+\left(-y+\frac{1}{2}\right)=0$ معناه $y=m\left(x+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}$

معناه $x+\frac{1}{2}=0$ و $-y+\frac{1}{2}=0$ معناه $x=-\frac{1}{2}$ و $y=\frac{1}{2}$ ومنه:

جميع المستقيمات (D_m) تمر من النقطة الثابتة $\omega\left(\frac{-1}{2};\frac{1}{2}\right)$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com