najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الـدفـاع الوطـــني
أركان الجيش الوطني الشعبي
دائرة الاستعمال و التحضيـر
مديرية مدارس أشبال الأمـة

السنة الدراسية : 2020 / 2021
دورة جوان 2021

امتحان البكـالوريـا التجريـــبـي
الشعبة: رياضيات

اختبار مادة الرياضيات — المـــدة : 04 ساعات و نصف

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04.5 نقاط)

نعتبر v_1 و q عددان طبيعيان ، (v_n) هي المتتالية الهندسية التي أساسها q و حدها الأول v_1.

I) عين v_1 و q علما أن v_1 و q أوليان فيما بينهما و $2v_1^2 = v_4 - v_2$.

II) نفرض أن: $v_1 = 3$ و $q = 2$.

1) أكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n ، ثم عين كل الحدود المحصورة بين العددين: 2020 و 1441.

2) نضع: $S_n = v_1^2 + v_2^2 + ... + v_n^2$ و $P_n = \ln(S_n)$.

– أحسب كلا من S_n و P_n بدلالة n ، ثم أحسب: $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n$.

3) نعتبر α و β عددان طبيعيان حيث: $v_\alpha < v_\beta$.

أ) حلل العدد 2304 إلى جداء عوامل أولية.

ب) عين كل الثنائيات الطبيعية (α,β) بحيث يكون: $\begin{cases} v_\alpha \times v_\beta = 2304 \\ PGCD(\alpha,\beta) = 2 \end{cases}$.

ج) نسجل قيم الحدود السته الأولى للمتتالية (v_n) على 6 بطاقات متماثلة ونخلطها جيدا ثم نسحب منها بصفة عشوائية بطاقتان في آن واحد.

– ما هو احتمال سحب بطاقتين تحملان حدين رقميهما أوليان فيما بينهما ؟

التمرين الثاني : (04 نقاط)

1) أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.

ب) استنتج باقي قسمة العدد $1440^{2019^{2020}}$ على 7.

2) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $4\left(5^{n-2} + 5^{n-3} + ... + 1\right) \equiv 3[7]$.

3) أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n يكون: $2C_{n+1}^2 + A_{n+3}^2 = 2n^2 + 6n + 6$.

ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد: $2C_{n+1}^2 + A_{n+3}^2$ مضاعفا للعدد 7.

4) فيما يلي نفرض: $n = 9$.

نعتبر x و y عددين صحيحين ولتكن المعادلة (E) حيث: $C_{10}^2 x - A_{12}^2 y = 15$ .....(E).

أ) عين $PGCD\left(C_{10}^2 ; A_{12}^2\right)$ ، ثم استنتج أن المعادلة (E) تقبل على الأقل حلا (x,y).

ب) بين أنه إذا كانت الثنائية (x,y) حلا للمعادلة (E) فإن: $y \equiv 0[5]$ ، ثم حل المعادلة (E).

5) أ) إذا كان x و y عددين طبيعيين ، ما هي القيم الممكنة لـــ d حيث: $d = PGCD(x,y)$.

ب) عين الثنائيات (x,y) حلول المعادلة (E) بحيث يكونا العددين x و y أوليان فيما بينهما.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثالث: (04 نقاط)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O,\vec{u};\vec{v})$. نعتبر النقطتين M و M' التين لاحقتاهما z و z' على الترتيب . نضع $z=x+iy$ و $z'=x'+iy'$ حيث x ، y ، x' و y' أعداد حقيقية .

نذكر أن $\overline{z}$ هو مرافق العدد المركب z و $|z|$ هي طويلة العدد المركب z .

1) بين أن الشعاعين $\overrightarrow{OM}$ و $\overrightarrow{OM'}$ متعامدين إذا وفقط إذا كان $\text{Re}(z'\overline{z})=0$.

2) بين أن النقط O ، M و M' في استقامية إذا وفقط إذا كان $IM(z'\overline{z})=0$.

3) لتكن N النقطة ذات اللاحقة z^2-1 . عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي يكون من أجلها الشعاعين $\overrightarrow{OM}$ و $\overrightarrow{ON}$ متعامدين .

4) لتكن P النقطة ذات اللاحقة $\frac{1}{z^2}-1$ حيث $z\neq 0$.

أ) بين أن $\left|\frac{1}{z^2}-1\right|^2\left(\overline{z^2-1}\right)=-\overline{z}^2\left(\frac{1}{z^2}-1\right)$.

ب) عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تكون من أجلها النقط O ، N و P في استقامية .

التمرين الرابع : (07.5 نقاط)

I) نعتبر g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $g(x)=x^2-\ln(x^2)$.

1) أدرس اتجاه تغير الدالة g وشكل جدول تغيراتها.

2) استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x يكون: $g(x)>0$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـــ: $f(x)=\frac{2}{x}+x+\frac{\ln(x^2)}{x}$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ) أحسب: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

ب) أحسب: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}}f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}}f(x)$ ، ثم فسر النتائج بيانيا.

2) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}^*$ تكون: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$.

ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

ج) برهن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب (Δ) ذو المعادلة $y=x$، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـــ (Δ).

3) أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $-x\in\mathbb{R}^*$ و $f(x)+f(-x)=0$ ، ماذا تستنتج ؟ فسر النتيجة بيانيا.

ب) بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0,3<\alpha<0,4$ ، ثم استنتج أنها تقبل حلا آخر β يطلب تعيين حصر له.

4) أ) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين (T_1) و (T_2) يوازيان المستقيم (Δ) يطلب كتابة معادلتيهما.

ب) أنشئ كلا من: (T_1) ، (T_2) ، (Δ) و المنحنى (C_f).

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

5) نعتبر الدالة h المعرفة على $]-\infty;-1[\cup]-1;+\infty[$ بالعبارة: $h(x)=\left[\frac{\ln(x+1)^2}{x+1}+(x+1)+\frac{2}{x+1}\right]+2$

وليكن (C_h) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

– بين أنه يوجد تحويل نقطي يحول المنحني (C_f) إلى المنحني (C_h). (الإنشاء غير مطلوب)

6) أ) بين أن الدالة F المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـــ: $F(x)=\left[\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4}\left(\ln x^2\right)^2+2\ln|x|\right]$ هي دالة أصلية لـــ f على $\mathbb{R}^*$.

ب) عين دالة أصلية للدالة f والتي تنعدم من أجل $x=1$.

ج) نعتبر λ عدد حقيقي حيث $\lambda>1$. أحسب التكامل: $I=\int_1^{\lambda} f(x)\,dx$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

انتهى الموضوع الأول

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي كيس على أربع كريات بيضاء تحمل الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 5 و ست كريات حمراء تحمل الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 3 ، 4 ، 4 . لا نفرق بينها عند اللمس .

نسحب من الكيس كريتان على التوالي دون إرجاع .

1) ما هو عدد الحالات الممكنة للسحب.

2) أحسب احتمال سحب كريتان من نفس اللون .

3) أحسب احتمال سحب كريتان تحملان رقمان زوجيان .


4) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل حالة سحب عدد الكريات البيضاء المسحوبة .

أ) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

ب) أحسب الأمل الرياضي $E(X)$.

التمرين الثاني : (04 نقاط)

I . ABC مثلث مباشر قائم في A حيث $\left(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA}\right)=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ و $k\in\mathbb{Z}$ (أنظر الشكل)



A' نظيرة A بالنسبة للنقطة C. ليكن S التشابه المباشر الذي يحول A' إلى C و C إلى B.

1)عين نسبة وزاوية التشابه S.

2)أنشئ D صورة A بواسطة S.

3)ليكن Ω مركز التشابه المباشر S.

أ) أثبت أن المستقيمين (ΩC) و (BC) متعامدان.

ب) أثبت أن المستقيمين $(\Omega A')$ و (CA') متعامدان.

ج) استنتج طريقة لإنشاء النقطة Ω.

II . فيما يلي المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(A;\vec{u};\vec{v})$ حيث لاحقة B هي 1.

1) عين لاحقة كل من C و A'.

2) بين أن العبارة المركبة للتشابه المباشر S هي $z'=\left(1+i\sqrt{3}\right)z+\frac{6-i\sqrt{3}}{3}$، ثم استنتج لاحقة Ω.

3) عين ثم أنشئ (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث $\arg\left(z-2i\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرن الثالث: (05 نقاط)

متتاليتا الأعداد الطبيعية (x_n) و (y_n) معرفتان على $\mathbb{N}$ كما يلي $\begin{cases} x_0 = 3 \\ x_{n+1} = 2x_n - 1 \end{cases}$ و $\begin{cases} y_0 = 1 \\ y_{n+1} = 2y_n + 3 \end{cases}$

1) أثبت بالتراجع من أجل كل طبيعي n أن $x_n = 2^{n+1} + 1$.

2) أ) احسب $\text{pgcd}(x_2; x_3)$ و $\text{pgcd}(x_8; x_9)$

ب) هل x_n و x_{n+1} أوليان فيما بينهما من أجل كل طبيعي n.

3) أ) أثبت من أجل كل طبيعي n أن $2x_n - y_n = 5$.

ب) أكتب y_n بدلالة n.

جـ) أدرس حسب قيم الطبيعي n بواقي قسمة 2^n على 5.

4) نضع $d_n = \text{pgcd}(x_n; y_n)$.

أ) ما هي القيم الممكنة لـــــــ d_n.

ب) عين مجموعة قيم n التي يكون من أجلها x_n و y_n أوليين فيما بينهما.

التمرين الرابع : (07 نقاط)

I. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــــــ : $g(x) = e^x(x-1)+1$

1) أدرس تغيرات g ثم أنجز جدول تغيراتها.

2) استنتج أن $g(x) \geq 0$ من أجل كل عدد حقيقي x.

II. لتكن الدالة العددية I المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي $I(x) = \int_0^x (x-t)e^t \, dt$

1) أثبت بواسطة مكاملة بالتجزئة أن: $I(x) = e^x - (1+x)$

2) ليكن x عدد حقيقي موجب . أثبت من أجل كل t من $[0; x]$ أن: $1 \leq e^t \leq e^x$.

ثم استنتج أن: $\frac{x^2}{2} \leq I(x) \leq \frac{x^2 e^x}{2}$.

3) ليكن x عدد حقيقي سالب. أثبت من أجل كل t من $[x; 0]$ أن: $1 \leq e^t \leq e^x$، ثم استنتج أن: $\frac{x^2}{2} \leq I(x) \leq \frac{x^2 e^x}{2}$.

4) استنتج أن: $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}$.

III. لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــــ : $\begin{cases} f(x) = \dfrac{e^x - 1}{x} & x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1) أحسب نهايات الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

2) أدرس قابلية اشتقاق f عند 0.

3) أحسب $f'(x)$ ثم استنتج تغيرات الدالة f.

4) عين معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

5) أرسم (T) و (C_f).

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الـدفـاع الوطـــني
أركان الجيش الوطني الشعبي
مديرية مدارس أشبال الأمـــة

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المستوى الثالثة رياضيات

التصحيح النموذجي للبكالوريا التجريبي مادة الرياضيات

الموضوع الأول

محاور الموضوع	عناصـــر الإجـــابة	العلامـــة مجزأة	العلامـــة كاملة
التمرين الأول	I) تعيين العددين v_1 و q: لدينا: $2v_1^2 = v_4 - v_2$ و نعلم أن: $v_2 = v_1.q$ و $v_4 = v_1.q^3$ أي تصبح: $2v_1^2 = v_1.q^3 - v_1.q$ أي: $2v_1^2 = v_1.q(q^2-1)$ ومنه: $\boxed{2v_1 = q(q^2-1)}$. لدينا: q يقسم $2v_1$ و q أولي مع v_1 إذن: q يقسم 2 (حسب مبرهنة غوص) أي أن: $q \in \{1,2\}$. - في حالة $q=1$ يكون: $2v_1 = 0$ أي: $v_1 = 0$ (مرفوض). - في حالة $q=2$ يكون: $2v_1 = 6$ أي: $v_1 = 3$. إذن نتحصل على: $\boxed{q=2}$ و $\boxed{v_1=3}$.	0.75 ن	04.5 ن
	II) نفرض أن: $v_1 = 3$ و $q = 2$. 1) كتابة عبارة الحد العام للمتتالية (v_n): نعلم أن: $v_n = v_1 \times q^{n-1}$ ومنه: $\boxed{v_n = 3 \times 2^{n-1}}$.	0.25 ن	
	*) تعيين كل الحدود المحصورة بين 2020 و 1441: لدينا: $1441 \le 3 \times 2^{n-1} \le 2020$ أي: $481 \le 2^{n-1} \le 673$ أي نجد: $\ln 481 \le \ln 2^{n-1} \le \ln 673$ أي: $\ln 481 \le (n-1)\ln 2 \le \ln 673$ و منه: $\frac{\ln 481}{\ln 2} \le n-1 \le \frac{\ln 673}{\ln 2}$ أي: $8,9 \le n-1 \le 9,39$ ومنه: $9,9 \le n \le 10,39$ ، إذن: $\boxed{n=10}$ وبالتالي يوجد حد وحيد محصور بين العددين 2020 و 1441 هو: $\boxed{v_{10} = 1536}$	0.75 ن	
	2) لدينا: $S_n = v_1^2 + v_2^2 + ... + v_n^2$ و $P_n = \ln(S_n)$. المجموع S_n هو عبارة عن مجموع لمتتالية هندسية أساسها q^2 و حدها الأول v_1^2 وعدد حدودها n حدا. أي يكون: $S_n = v_1^2 \times \frac{1-(q^2)^n}{1-q^2} = 9 \times \frac{1-(4)^n}{1-4}$ ومنه: $\boxed{S_n = 3(4^n-1)}$.	01 ن	
	*) لنحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$: $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = \lim\limits_{n \to +\infty}[3(4^n-1)] = +\infty$ لأن: $\lim\limits_{n \to +\infty} 4^n = +\infty$.		

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	*) لنحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n$: $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \ln(S_n) = +\infty$ لأن: $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = +\infty$.	0.25 ن
	3) لدينا: α و β عددان طبيعيان حيث: $v_\alpha < v_\beta$.	0.25 ن
	أ) تحليل العدد 2304 إلى جداء عوامل أولية فنتحصل على: $\boxed{2304 = 2^8 \times 3^2}$.	0.25 ن
	ب) تعيين كل الثنائيات (α,β):	
	لدينا: $\begin{cases} v_\alpha \times v_\beta = 2304 \\ PGCD(\alpha,\beta) = 2 \end{cases}$ أي يكون: $\begin{cases} (3\times 2^{\alpha-1})(3\times 2^{\beta-1}) = 2^8\times 3^2 \\ PGCD(\alpha,\beta) = 2 \end{cases}$ ومنه:	
	$\begin{cases} 2^{\alpha+\beta-2}\times 3^2 = 2^8\times 3^2 \\ PGCD(\alpha,\beta) = 2 \end{cases}$	
	أي: $\begin{cases} \alpha+\beta = 10 \\ PGCD(\alpha,\beta) = 2 \end{cases}$. لدينا: $\alpha = 2\alpha'$ و $\beta = 2\beta'$ و منه: $2\alpha'+2\beta' = 10$ أي نجد: $\boxed{\alpha'+\beta' = 5}$.	
	لكن لدينا: $\alpha < \beta$ لأن: $v_\alpha < v_\beta$ (المتتالية (v_n) متزايدة) ومنه يكون: $\alpha' < \beta'$.	
	أي نجد أن هناك ثنائيتان تحقق: $(\alpha',\beta') = (1,4)$ و $(\alpha',\beta') = (2,3)$.	
	إذن الثنائيات (α,β) المطلوبة هي: $\boxed{(\alpha,\beta) = (2,8)}$ و $\boxed{(\alpha,\beta) = (4,6)}$.	0.5 ن
	4) الأعداد المسجلة على البطاقات الست هي: 3 ، 6 ، 12 ، 24 ، 48 ، 96.	
	نلاحظ أنه توجد بطاقة وحيدة تحمل حدا رقميه أوليان فيما بينهما و هو v_3.	
	لكن السحب هنا يتم دفعة واحدة وفي هذا الأخير لا يوجد تكرار أي ليس باستطاعتنا سحب البطاقة التي تحمل الحد v_3 مرتين في آن واحد إذن هذا حدث مستحيل واحتماله يساوي 0.	0.5 ن
التمرين الثاني	1) أ) بواقي قسمة العدد 5^n على 7.	
	نجد: $5^0 \equiv 1[7]$ ، $5^1 \equiv 5[7]$ ، $5^2 \equiv 4[7]$ ، $5^3 \equiv 6[7]$ ، $5^4 \equiv 2[7]$ ، $5^5 \equiv 3[7]$ و $5^6 \equiv 1[7]$	04 ن
	و نلخصها في الجدول التالي:	

قيم العدد الطبيعي n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
بواقي قسمة 5^n على 7	1	5	4	6	2	3

0.5 ن

	ب) نعلم أن: $1440 \equiv 5[7]$ أي أن: $1440^{(2019)^{2020}} \equiv 5^{(2019)^{2020}}[7]$.	0.25 ن
	*) لنعين باقي قسمة العدد 2019^{2020} على 6: $2019 \equiv 3[6]$ أي: $2019^{2020} \equiv 3^{2020}[6]$	
	لكن نعلم أنه من أجل كل عدد طبيعي n يكون: $\boxed{3^n \equiv 3[6]}$ و منه: $2019^{2020} \equiv 3[6]$ أي: $2019^{2020} = 6k+3$.	
	إذن: $1440^{(2019)^{2020}} \equiv 5^{6k+3}[7]$ أي: $1440^{(2019)^{2020}} \equiv 6[7]$.	
	و منه باقي قسمة العدد $1440^{(2019)^{2020}}$ على 7 هو 6.	0.25 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2) لدينا: $(5^{n-2}+5^{n-3}+.....+1)\equiv 3[7]$ ، نلاحظ أن: $4(5^{n-2}+5^{n-3}+.....+1)$ هو مجموع حدود لمتتالية هندسية أساسها 5 عدد حدودها $(n-1)$ حدا و منه: $4\left(1\times\frac{5^{n-1}-1}{5-1}\right)\equiv 3[7]$ أي: $5^{n-1}-1\equiv 3[7]$ أي: $5^{n-1}\equiv 4[7]$ ومنه يكون: $n-1=6k+2$ إذن: $\boxed{n=6k+3}$ مع $(k\in\mathbb{N})$.	0.5 ن	
3) أ) لنبين أن: $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=2n^2+6n+6$. *) لنحسب $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2$: $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=2\times\frac{(n+1)!}{(n+1-2)!\times 2!}+\frac{(n+3)!}{(n+3-2)!}$ $=\frac{(n+1)\times n\times(n-1)!}{(n-1)!}+\frac{(n+3)(n+2)(n+1)!}{(n+1)!}$ و منه: $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=(n+1)n+(n+3)(n+2)=n^2+n+n^2+2n+3n+6$ إذن: $\boxed{2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=2n^2+6n+6}$ هو المطلوب.	0.5 ن	
ب) لنعين قيم n بحيث يكون: $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2\equiv 0[7]$. لدينا: $2n^2+6n+6\equiv 0[7]$ أي: $2(n^2+3n+3)\equiv 0[7]$ بما أن 2 أولي مع 7 يكون: $n^2+3n+3\equiv 0[7]$ أي: $n^2+3n\equiv -3[7]$ و منه: $n^2+3n\equiv 4[7]$. يمكن الاستعانة بالجدول التالي (الموافقة بتردد 7): $n\equiv$ 0 1 2 3 4 5 6 [7] $n^2\equiv$ 0 1 4 2 2 4 1 [7] $3n\equiv$ 0 3 6 2 5 1 4 [7] $n^2+3n\equiv$ 0 4 3 4 0 5 5 [7] وبالتالي يكون: $n\equiv 1[7]$ أو $n\equiv 3[7]$ أي: $\boxed{n=7k+1}$ أو $\boxed{n=7k+3}$ مع $(k\in\mathbb{N})$.	0.75 ن	
4) لدينا: (E).....$C_{10}^2x-A_{12}^2y=15$. أ) لنعين $PGCD(C_{10}^2;A_{12}^2)$: نعلم أن: $C_{10}^2=\frac{10!}{8!\times 2!}=45$ و $A_{12}^2=\frac{12!}{10!}=132$ ومنه $PGCD(C_{10}^2;A_{12}^2)=3$. إذن المعادلة (E) تصبح: $45x-132y=15$ هذه الأخيرة تقبل على الأقل حلا في $\mathbb{Z}^2$ لأن: $PGCD(45,132)=3$ و 3 يقسم 15.	0.25 ن	
ب) لدينا: $45x-132y=15$ أي تصبح: $15x-44y=5$ أي: $44y=15x-5$ أي: $44y=5(3x-1)$ لدينا: 5 يقسم $44y$ و 5 أولي مع 44 حسب مبرهنة غـوص فإن: 5 يقسم y وبالتالي يكون: $y=5k$ أي: $\boxed{y\equiv 0[5]}$ هو المطلوب. *) لنحل المعادلة (E): نبحث أولا عن الحل الخاص أي: $y=5$ و منه: $5(3x-1)=5\times 4$ أي: $3x-1=4$ إذن:	0.25 ن	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثالث	$15x=15$. ومنه: $(x_0,y_0)=(5,15)$. لدينا: $\begin{cases}15x-44y=5\\15(15)-44(5)=5\end{cases}$ بالطرح نجد: $15(x-15)=44(y-5)$ بما أن 15 أولي مع 44 وحسب مبرهنة غوص نستنتج أن: $\begin{cases}x-15=44k\\y-5=15k\end{cases}$ إذن: $\boxed{x=44k+15}$ و $\boxed{y=15k+5}$. ومنه: $\boxed{(x,y)=(44k+15,15k+5)}$ مع $(k\in\mathbb{Z})$.		
	5) أ) لدينا الثنائية (x,y) حل للمعادلة (E) أي يكون: $15x-44y=5$ و بما أن: $PGCD(x,y)=d$ فإن: d يقسم $(15x-44y)$ و d يقسم 5 ، إذن قيم d هي: 1 ، 5.	0.25 ن	
	ب) لندرس حالة $d=5$ أي: $x\equiv 0[5]$ أي: $44k+15\equiv 0[5]$ و منه: $4k\equiv 0[5]$ أي يكون: $\boxed{k=5\alpha}$ مع $(\alpha\in\mathbb{Z})$.	0.25 ن	
	إذن: $d=5$ لما $k=5\alpha$ و بالتالي يكون: $d=1$ لما $k\neq 5\alpha$ و منه: $\boxed{(x,y)=(44k+15,15k+5)}$ مع $(k\neq 5\alpha)$.	0.25 ن	04 ن
التمرين الرابع	1) لدينا : $\overrightarrow{OM}(x;y)$ و $\overrightarrow{OM'}(x';y')$ متعامدين معناه $xx'+yy'=0$. $(xx'+yy')+i(xy'-yx')=(x'+iy')(x-iy)$ ومنه : $xx'+yy'=0$ تكافئ $\mathrm{Re}(z'\overline{z})=0$.	0.75 ن	
	2) النقط O ، M و M' في استقامية معناه $\overrightarrow{OM}(x;y)$ و $\overrightarrow{OM'}(x';y')$ مرتبطان خطيا أي $xy'+yx'=0$ وهذا يكافئ $IM(z'\overline{z})=0$.	0.75 ن	
	3) لدينا : $(z^2-1)\overline{z}=\lvert z\rvert z-\overline{z}=(x^2+y^2)(x+iy)-(x-iy)$ $=x(x^2+y^2-1)+iy(x^2+y^2+1)$ $\overrightarrow{OM}$ و $\overrightarrow{ON}$ متعامدين يكافئ $\mathrm{Re}((z^2-1)\overline{z})=0$ أي $x(x^2+y^2-1)$ ومنه $x=0$ أو $x^2+y^2=1$. مجموعة النقط M هي اتحاد محور التراتيب مع الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 1	01ن	
	4) لتكن P النقطة ذات اللاحقة $1-\frac{1}{z^2}$ حيث $z\neq 0$. أ) $\left(\frac{1}{z^2}-1\right)\left(\overline{z^2-1}\right)=\left(\frac{1}{z^2}-1\right)\left(\overline{-z^2}\right)\left(\overline{\frac{1}{z^2}-1}\right)=-\overline{z}^2\left\lvert\frac{1}{z^2}-1\right\rvert^2$.	0.75 ن	
	ب) O ، N و P في استقامية تكافئ $IM\left(\left(\frac{1}{z^2}-1\right)\left(\overline{z^2-1}\right)\right)=0$ أي $IM\left(-\overline{z}^2\left\lvert\frac{1}{z^2}-1\right\rvert^2\right)=0$. أي $IM(-\overline{z}^2)=0$ ومنه $2xy=0$ أي $x=0$ أو $y=0$. ومجموعة النقط M هي اتحاد محور الفواصل مع محور التراتيب باستثناء المبدأ O.	0.75 ن	07.5 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـــ: $g(x)=x^2-\ln(x^2)$.

1) دراسة إتجاه تغير الدالة g و تشكيل جدول تغيراتها:

*) الدالة المشتقة: الدالة g قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}^*$ و عبارة دالتها المشتقة هي: $g'(x)=2x-\frac{2}{x}=\frac{2x^2-2}{x}$.

نلاحظ أن إشارة $g'(x)$ من إشارة $x.(2x^2-2)$ و عليه نلخص الإشارة في الجدول التالي: إذن جدول التغيرات يكون:

0.5 ن

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
x		$-$	0	$-$	$\|$	$+$	0	$+$	
$2x^2-2$		$+$	0	$-$	$\|$	$-$	0	$+$	
$g'(x)$		$-$	0	$+$	$\|$	$-$	0	$+$	

0.25 ن

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	$\|$	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$ $+\infty$

0.75 ن

*) النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0}g(x)=+\infty$.

0.25 ن

2) نلاحظ من جدول التغيرات أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم تكون: $g(x)>0$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـــ: $f(x)=\frac{2}{x}+x+\frac{\ln(x^2)}{x}$.

1) أ) حساب النهايات:

*) $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x\left(\frac{2}{x^2}+1+\frac{\ln(x^2)}{x^2}\right)=-\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2}{x^2}=0$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\ln(x^2)}{x^2}=0$

فبوضع: $x^2=t$

هذه الأخيرة تصبح: $\boxed{\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{\ln t}{t}=0}$.

0.5 ن

*) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x^2)}{x}=0$.

ب) حساب النهايات وتفسير النتائج بيانيا:

*) $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0}f(x)=\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0}\left(\frac{2}{x}+x+\frac{\ln(x^2)}{x}\right)=+\infty$ و

0.5 ن

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}f(x)=\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\left(\frac{2}{x}+x+\frac{\ln(x^2)}{x}\right)=-\infty$.

0.25 ن

*) التفسير البياني: المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا عموديا معادلته: $x=0$.

2) أ) بيان أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}^*$ يكون: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$.

الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}^*$ ودالتها المشتقة هي:

0.25 ن

$f'(x)=\frac{-2}{x^2}+1+\frac{2-\ln(x^2)}{x^2}=\frac{x^2-\ln(x^2)}{x^2}$ ، إذن: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$ و هو المطلوب.

ب) دراسة إتجاه تغير الدالة f: نلاحظ أن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ إذن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]0;+\infty[$ و $]-\infty;0[$ وعليه جدول تغيراتها يكون:

0.25 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


	x | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ $f'(x)$ | $+$ | $+$ $f(x)$ | $-\infty \nearrow +\infty$ | $-\infty \nearrow +\infty$	0.25 ن
	ج) برهان أن المستقيم (Δ) مقارب للمنحنى (C_f): أي نحسب: $\lim\limits_{\lvert x\rvert\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=\lim\limits_{\lvert x\rvert\to+\infty}\left[\frac{2}{x}+\frac{\ln(x^2)}{x}\right]=0$ ، إذن: المستقيم (Δ) هو مقارب مائل للمنحنى (C_f).	0.25 ن
	*) دراسة الوضع النسبي: أي ندرس إشارة الفرق $\left[f(x)-x\right]=\frac{2+\ln(x^2)}{x}$. نلخص الإشارة في الجدول التالي:	
	x | $-\infty$ | $-e^{-1}$ | 0 | e^{-1} | $+\infty$ x | $-$ | $-$ | $+$ | 0 | $+$ $2+\ln(x^2)$ | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $-$ | $+$ $f(x)-x$ | $-$ | 0 | $+$ | $-$ | 0 | $+$ الوضعية | (C_f) تحت (Δ) | (C_f) يقطع | (C_f) فوق (Δ) | (C_f) تحت (Δ) | (C_f) يقطع | (C_f) فوق (Δ)	0.25 ن
	3) أ) التحقق أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}^*$ ، $-x\in\mathbb{R}^*$ يكون: $f(x)+f(-x)=0$. لدينا: $f(x)+f(-x)=\frac{2}{x}+x+\frac{\ln(x^2)}{x}-\frac{2}{x}-x-\frac{\ln(x^2)}{x}=0$. إذن و بما أنه من أجل $x\in\mathbb{R}^*$ ، $-x\in\mathbb{R}^*$ و $f(x)+f(-x)=0$ فإن الدالة f فردية و منحناها البياني (C_f) يقبل مبدأ المعلم O كمركز التناظر.	0.25 ن
	ب) باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة نجد أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0,3<\alpha<0,4$. و بما أن الدالة f فردية إذن يوجد حل آخر β محصور بين $-0,4$ و $-0,3$ أي يكون: $-0,4<\beta<-0,3$.	0.25 ن
	4) أ) المنحنى (C_f) يقبل مماسين يوازيان المستقيم (Δ) يعني أن: $f'(x)=1$ ، لنحل في $\mathbb{R}^*$ هذه الأخيرة. لدينا: $\frac{x^2-\ln(x^2)}{x^2}=1$ أي: $\frac{x^2-\ln(x^2)}{x^2}-1=0$ أي تصبح: $\frac{-\ln(x^2)}{x}=0$ أي: $\begin{cases}-\ln(x^2)=0\\ x^2\neq 0\end{cases}$ هذا يكافئ: $x^2=1$ أي: $x=1$ أو $x=-1$ و منه فعلا المنحنى (C_f) يقبل مماسين موازيان للمستقيم (Δ).	0.25 ن
	*) كتابة معادلة المماس (T_1) عند $x_0=1$: $(T_1):y=f'(1)(x-1)+f(1)$ ومنه: $(T_1):y=x+2$.	0.25 ن
	*) كتابة معادلة المماس (T_2) عند $x_0=-1$: $(T_2):y=f'(-1)(x+1)+f(-1)$ ومنه:	0.25 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$(T_2): y = x - 2$.

ب) الإنشاء:



0.75 ن

5) لدينا: $h(x) = \left[\frac{\ln(x+1)^2}{x+1} + (x+1) + \frac{2}{x+1}\right] + 2$ أي يكون: $h(x) = f(x+1) + 2$.

0.25 ن

إذن: يوجد تحويل نقطي يحول المنحني (C_f) إلى (C_h) و هو الإنسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.

6) أ) بيان أن الدالة F أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$:

لدينا: $F'(x) = x + \frac{2}{4} \times \frac{2}{x} \times \ln x^2 + \frac{2}{|x|} = x + \frac{\ln(x^2)}{x} + \frac{2}{|x|}$.

*) إذا كان $x > 0$ فإن: $F'(x) = \frac{2}{x} + x + \frac{\ln(x^2)}{x}$ وإذا كان $x < 0$ فإن:

0.25 ن

$F'(x) = \frac{-2}{x} + x + \frac{\ln(x^2)}{x}$.

ب) الدالة الأصلية للدالة f والتي تنعدم من أجل $x = 1$ هي:

0.25 ن

$F(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}\left[\ln(x)^2\right]^2 + 2\ln|x| - \frac{1}{2}$.

ج) حساب التكامل $I = \int_1^{\lambda} f(x)dx$ مع $\lambda > 1$:

0.25 ن

لدينا: $I = \int_1^{\lambda} f(x)dx = \left[F(x)\right]_1^{\lambda} = F(\lambda) - F(1)$ و منه: $I = F(\lambda)$ لأن: $F(1) = 0$.

0.25 ن

*) التفسير الهندسي: I هي مساحة الحيز المستوي المحصور بالمنحني (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتهما: $x = 1$ و $x = \lambda$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الـدفـاع الوطـــني
أركان الجيش الوطني الشعبي
مديرية مدارس أشبال الأمـــة

السنة الدراسية : 2021 / 2020

المستوى الثالثة رياضيات

التصحيح النموذجي للبكالوريا التجريبي مادة الرياضيات
الموضوع الثاني

محاور الموضوع	عناصـــر الإجـــابة	العلامـــة مجزأة	العلامـــة كاملة
التمرين الأول	1) عدد الحالات الممكنة للسحب : $A_{10}^2=90$.	0.5 ن	04 ن
	2)لتكن A حادثة سحب كريتان من نفس اللون: $P(A)=\frac{A_4^2+A_6^2}{90}=\frac{42}{90}=\frac{7}{15}$.	0.75 ن	
	3) لتكن B حادثة سحب كريتان تحملان رقمان زوجيان : $P(B)=\frac{A_4^2}{90}=\frac{12}{90}=\frac{2}{15}$.	0.75 ن	
	4) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل حالة سحب عدد الكريات البيضاء المسحوبة .		
	أ) قيم X الممكنة : $X(\omega)=\{0;1;2\}$.	0.75 ن	
	قانون احتمال X : $P(X=0)=\frac{A_6^2}{A_{10}^2}=\frac{30}{90}=\frac{1}{3}$. $P(X=1)=\frac{A_4^1\times A_6^1\times C_2^1}{A_{10}^2}=\frac{48}{90}=\frac{8}{15}$. $P(X=2)=\frac{A_4^2}{A_{10}^2}=\frac{12}{90}=\frac{2}{15}$.		
	x_i | 0 | 1 | 2 $P(X=x_i)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{8}{15}$ | $\frac{2}{15}$	0.75 ن	


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثاني	ب) الأمل الرياضياتي: $E(X)=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{8}{15}+2\times\frac{2}{15}=\frac{12}{15}=0,8$.	0.5 ن	04 ن
	1) لدينا $\begin{cases}S(A')=C\\S(C)=B\end{cases}$ يعني $\begin{cases}CB=k\,A'C\\(\overrightarrow{A'C};\overrightarrow{CB})=\theta+2k\pi\end{cases}$ ومنه $\begin{cases}k=\frac{CB}{A'C}=\frac{CB}{AC}=\frac{1}{\sin\frac{\pi}{6}}=2\\\theta=(\overrightarrow{CA'};\overrightarrow{CB})+\pi=-\frac{2\pi}{3}+\pi=\frac{\pi}{3}\end{cases}$.	01.5 ن	
	2) بما أن C مصف $[AA']$ فإن B منتصف $[CD]$.	0.25 ن	
	أ) $C\Omega^2+CB^2=C\Omega^2+\left(\overrightarrow{C\Omega}+\overrightarrow{\Omega B}\right)^2$ $=2C\Omega^2+\Omega B^2-4\times\Omega C\times\Omega C\times\frac{1}{2}=\Omega B^2$ و منه $(C\Omega)$ يعامد (CB)	0.25 ن	
	ب) $A'\Omega^2+A'C^2=A'\Omega^2+\left(\overrightarrow{A'\Omega}+\overrightarrow{\Omega C}\right)^2$ $=2A'\Omega^2+\Omega C^2-4\times\Omega A'\times\Omega A'\times\frac{1}{2}=\Omega C^2$ و منه $(A'\Omega)$ يعامد $(A'C)$	0.25 ن	
	ج) Ω هي تقاطع المستقيم الذي يعامد (BC) في C مع المستقيم الذي يعامد $(A'C)$ في A'.	0.25 ن	
	II. 1) $\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{CA}{AB}$ إذن $CA=AB\times\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}$	0.5 ن	
	و منه $C\left(0;\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ و $A'\left(0;\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$		
	2) بما أن $k=2$ و $\theta=\frac{\pi}{3}+2k\pi$ فإن عبارة S من الشكل $z'=\left(1+i\sqrt{3}\right)z+b$		
	و بما أن $S(A')=C$ فإن $\frac{i\sqrt{3}}{3}=\left(1+i\sqrt{3}\right)\frac{2i\sqrt{3}}{3}+b$ إذن $b=\frac{6-i\sqrt{3}}{3}$ و منه $z_\Omega=\frac{6-i\sqrt{3}}{-3i\sqrt{3}}=\frac{1}{3}+i\frac{2\sqrt{3}}{3}$	0.75 ن	
	3) $\arg\left(z-2i\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=-\frac{\pi}{2}$ يعني $\arg(z-z_{A'})=-\frac{\pi}{2}$ يعني $(\vec{u},\overrightarrow{A'M})=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ و منه مجموعة النقط M هي نصف المستقيم	0.25 ن	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثالث	المفتوح $[A'A)$  1) $x_0 = 3 = 2^1 + 1$ لنفرض أن $x_n = 2^{n+1} + 1$ $n \geq 0$ إذن $x^{n+1} = 2x_n - 1 = 2\left(2^{n+1} + 1\right) - 1 = 2^{n+2} + 2 - 1 = 2^{n+2} + 1$ و منه من أجل كل طبيعي n $x_n = 2^{n+1} + 1$ 2) أ) $p\gcd(x_2; x_3) = p\gcd(7; 17) = 1$ $\text{pgcd}(x_8; x_9) = \text{pgcd}(513; 1025) = 1$ ب) $2x_n - x_{n+1} = 2^{n+2} + 2 - 2^{n+2} - 1 = 1$ و منه حسب بيزو فإن x_n و x_{n+1} أوليان فيما بينهما 3) أ) $2x_0 - y_0 = 6 - 1 = 5$ لنفرض أن $2x_n - y_n = 5$ $2x_{n+1} - y_{n+1} = 2(2x_n - 1) - 2y_n - 3 = 2(2x_n - y_n) - 5 = 2 \times 5 - 5 = 5$ و منه من أجل كل طبيعي n $2x_n - y_n = 5$ ب) $y_n = 2x_n - 5$ يعني $y_n = 2^{n+2} - 3$ ج) لدينا $2 \equiv 2[5]$ $2^2 \equiv 4[5]$ $2^3 \equiv 3[5]$ $2^4 \equiv 1[5]$ و منه من أجل كل p من $\square$ $2^{4p} \equiv 1[5]$ $2^{4p+1} \equiv 2[5]$ $2^{4p+2} \equiv 4[5]$ $2^{4p+3} \equiv 3[5]$ 4) أ) بما أن $2x_n - y_n = 5$ فإن $d_n = 1$ أو $d_n = 5$ 0.5 ب) $d_n = 5$ يكافئ $\begin{cases} x_n \equiv 0[5] \\ y_n \equiv 0[5] \end{cases}$ يعني $\begin{cases} 2^{n+1} + 1 \equiv 0[5] \\ 2^{n+2} - 3 \equiv 0[5] \end{cases}$ يعني $\begin{cases} 2^{n+1} \equiv 4[5] \\ 2^{n+2} \equiv 3[5] \end{cases}$ يعني $n = 4p + 1$ 0.5 y_n و x_n أوليين فيما بينهما إذا و فقط إذا كان $n = 4p + 3$ أو $n = 4p + 2$ أو $n = 4p$		05 ن
		01 ن	
		0.25 ن	
		0.25 ن	
		0.25 ن	
		01 ن	
		0.25 ن	
		01 ن	
		0.25 ن	
		0.5 ن	
		0.25 ن	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الرابع			07 ن
	0.25 ن	I . 1) من أجل كل x من $\mathbb{R}$ $g'(x)=xe^x$	
	0.25 ن	g متناقصة تماما على المجال $]-\infty;0]$ و متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.	
	0.25 ن	$g(0)$ قيمة حدية صغرى و بما أن $g(0)=0$ نستنتج أن g موجبة على $\mathbb{R}$	
	01 ن	II . 1) حساب $I(x)=\int_0^x (x-t)e^t\,dt$ نضع $\left.\begin{matrix}u(t)=x-t\\ v'(t)=e^t\,dt\end{matrix}\right\}$ إذن $\left.\begin{matrix}u'(t)=-dt\\ v(t)=e^t\end{matrix}\right\}$ و حسب قانون التكامل بالتجزئة نجد $I(x)=\left[(x-t)e^t\right]_0^x+\int_0^x e^t\,dt=\left[(x-t)e^t+e^t\right]_0^x=e^x-x-1=e^x-(x+1)$	
	0.5 ن	2) ليكن x حقيقي موجب و t حقيقي من المجال $[0;x]$ معناه $0\le t\le x$ أي $1\le e^t\le e^x$ وبعد الضرب في $(x-t)$ نجد $(x-t)\le e^t(x-t)\le e^x(x-t)$ واخيرا بعد المرور إلى التكامل نصل إلى $\int_0^x (x-t)\,dt\le\int_0^x e^t(x-t)\,dt\le\int_0^x e^x(x-t)\,dt$ يعني $\left[xt-\frac{t^2}{2}\right]_0^x\le I(x)\le\left[e^x\left(xt-\frac{t^2}{2}\right)\right]_0^x$ يعني $\frac{x^2}{2}\le I(x)\le\frac{x^2e^x}{2}$.	
	0.5 ن	3) ليكن x حقيقي سالب و t حقيقي من المجال $[x;0]$ معناه $x\le t\le 0$ أي $e^x\le e^t\le 1$ وبعد الضرب في $(x-t)$ نجد $(x-t)\le e^t(x-t)\le e^x(x-t)$ لأن $(x-t)$ **سالب** واخيرا بعد المرور إلى التكامل نصل إلى $\int_x^0 (x-t)\,dt\le\int_x^0 e^t(x-t)\,dt\le\int_x^0 e^x(x-t)\,dt$ لأن x **حقيقي سالب** يعني $\left[\left(xt-\frac{t^2}{2}\right)\right]_x^0\le -I(x)\le\left[e^x\left(xt-\frac{t^2}{2}\right)\right]_x^0$ يعني $-\frac{x^2e^x}{2}\le -I(x)\le -\frac{x^2}{2}$ و منه $\frac{x^2}{2}\le I(x)\le\frac{x^2e^x}{2}$.	
		4) لدينا مما سبق من أجل كل x موجب أي $\frac{x^2}{2}\le I(x)\le\frac{x^2e^x}{2}$ و منه $\frac{x^2}{2}\le e^x-(1+x)\le\frac{x^2e^x}{2}$ من أجل كل x موجب تماما $\frac{1}{2}\le\frac{e^x-(1+x)}{x^2}\le\frac{e^x}{2}$ و بما أن $\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}$ فإن $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-(1+x)}{x^2}=\frac{1}{2}\ldots(1)$ من أجل كل x سالب $\frac{x^2}{2}\le I(x)\le\frac{x^2e^x}{2}$ أي $\frac{x^2e^x}{2}\le e^x-(1+x)\le\frac{x^2}{2}$ و منه من أجل كل x سالب	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تماما $\frac{1}{2} \leq \frac{e^x-(1+x)}{x^2} \leq \frac{e^x}{2}$ و بما أن $\lim\limits_{x \xrightarrow{<} 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$ فإن

$\lim\limits_{x \xrightarrow{<} 0} \frac{e^x-(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2} \ldots (2)$

من (1) و (2) نستنتج أن $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x-(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}$ 0.5 ن

III . 1) حساب النهايات

$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 0^+$ 0.25 ن

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x}\left(1-e^{-x}\right) = +\infty$ 0.25 ن


2) من السؤال II. 4نجد $\lim\limits_{x \to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x-x-1}{x^2} = \frac{1}{2}$ 0.75 ن

و منه f قابلة للاشتقاق 0 عند و $f'(0) = \frac{1}{2}$.

من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن $f'(x) = \frac{xe^x-e^x+1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$ و منه $f' > 0$ على $\mathbb{R}^*$ 01 ن

. إذن f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

$(T): y = \frac{1}{2}x+1$ 0.5 ن



01 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com