najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية باتنة
ثانوية وادي الماء

الموسم الدراسي : 2020/2019
القسم : 3 ع تج 02

التاريخ : 2019/11/13
المدة : $\ln\left(e^2\right)$ ساعات.

الفرض الثاني للثلاثي الأول في مادة الرياضيات

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على R كمايلي: $f(x)=(-ax^3+bx^2)e^{-x+1}$
و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1) عين العددان الحقيقيان a، b بحيث (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة N ذات الفاصلة 2 و معامل توجيه المماس للمنحني (C_f) عند النقطة N هو $-4e^{-1}$.

نضع $a=1$ و $b=2$.

2) أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=\frac{-x^3}{e^x}e^1+2\frac{x^2}{e^x}e^1$ ثم احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

✓استنتج وجود مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) يطلب تعيين معادلة له.

ج) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=x(x^2-5x+4)e^{-x+1}$.

✓ ثم أستنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها. $\left[f(4)=-32e^{-3}\right]$

3) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2.

4) h الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي : $h(x)=x^2e^{-x+2}-4$.

أ) ادرس اتجاه تغير الدالة h، ثم استنتج اشارة $h(x)$.

ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)-\left[-4e^{-1}(x-2)\right]=(-x+2)e^{-1}\times h(x)$.

و حددّ عندئذ وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (T) على المجال $[0;+\infty[$.

ج) هل المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف ؟برر.

5) ارسم المماس (T) و المنحنى (C_f) على المجال $[0;+\infty[$.

6) ليكن (Δ_m) المستقيم الذي معادلته : $y=mx-2\ln(e)m$ حيث m وسيط حقيقي.

أ) بين أن جميع المستقيمات تشمل النقطة الثابتة $N(2;\ln 1)$.

ب) ناقش، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد نقاط تقاطع المستقيم (Δ_m) والمنحني (C_f).

7) g الدالة العددية والمعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)$.

✓اعتمادا على السؤال رقم (2) شكل جدول تغيرات الدالة g. حيث : $\left(\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0 \text{ و } \lim\limits_{x\to0} g(x)=0\right)$

انتهى

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com