

الدوال الأسية واللوغارتمية
النهايات الشهيرة
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln x}{x}\right)=0$
$\lim_{x\to 0^+} x(\ln x)=0$
$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\ln(x+1)}{x}\right)=1$
$\lim_{x\to 0^+}(\ln x)=-\infty$
$\lim_{x\to+\infty}(\ln x)=+\infty$
$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)}{x^{\alpha}}=0$
$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}=1$
$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^{n}\ln x=0$
$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x}}{x^{n}}=+\infty$
$\lim_{x\to-\infty} x^{n}e^{x}=0$
$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x}}{x}=+\infty$
$\lim_{x\to-\infty} xe^{x}=0$
$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}-1}{x}=1$

النهايات

نهايات الدوال $x \mapsto x^n \; (n \in \mathbb{N}^*)$ و $x \mapsto \sqrt{x}$ و مقلوباتها:

$\lim\limits_{x \to 0} x^n = 0$	$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} \sqrt{x} = 0$
$\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$	$\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$

إذا كان n عددا زوجيا فإن:	إذا كان n عددا فرديا فإن:
$\lim\limits_{x \to +\infty} x^n = +\infty$ $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n = +\infty$ $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} \frac{1}{x^n} = +\infty$ $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ <}} \frac{1}{x^n} = +\infty$	$\lim\limits_{x \to +\infty} x^n = +\infty$ $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n = -\infty$ $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} \frac{1}{x^n} = +\infty$ $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ <}} \frac{1}{x^n} = -\infty$

نهايات الدوال الحدودية و الدوال الجذرية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$:

نهاية حدودية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$ هي نهاية حدها الأكبر درجة	نهاية دالة جذرية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$ هي نهاية خارج حديها الأكبر درجة

نهايات الدوال المثلثية:

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	$\lim\limits_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

نهايات الدوال من النوع: $x \mapsto \sqrt{u(x)}$

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x)$	$\Leftarrow$	$\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt{u(x)}$
$\ell \geq 0$		$\sqrt{\ell}$
$+\infty$		$+\infty$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

النهايات و الترتيب:

$\left.\begin{array}{l} u(x)\le f(x)\le V(x) \\ \lim\limits_{x\to x_0} u(x)=\ell \\ \lim\limits_{x\to x_0} V(x)=\ell \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\ell$	$\left.\begin{array}{l} \lvert f(x)-\ell\rvert \le V(x) \\ \lim\limits_{x\to x_0} V(x)=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\ell$
$\left.\begin{array}{l} u(x)\le V(x) \\ \lim\limits_{x\to x_0} V(x)=-\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=-\infty$	$\left.\begin{array}{l} u(x)\le f(x) \\ \lim\limits_{x\to x_0} u(x)=+\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=+\infty$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

العمليات على النهايات:

نهاية مجموع دالتين:

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$	ℓ	ℓ	ℓ	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$	ℓ'	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$	$\ell+\ell'$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ش غ م

نهاية جداء دالتين:

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$	ℓ	$\ell<0$		$\ell>0$		$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0
$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$	ℓ'	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\times g(x)]$	$\ell\times\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ش غ م

نهاية خارج دالتين:

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$	ℓ	ℓ	$\ell<0$		$\ell>0$		$-\infty$		$+\infty$		0	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$	$\ell'\neq 0$	$\pm\infty$	0^-	0^+	0^-	0^+	0^-	0^+	0^-	0^+	0	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$	$\dfrac{\ell}{\ell'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ش غ م	ش غ م

ملاحظة عامة

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

الدوال اللوغارتمية

الدالة اللوغاريتم النيبري:

تعريف:

دالة اللوغاريتم النيبيري هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ على المجال $]0;+\infty[$ والتي تنعدم في 1

ويرمز لها بالرمز: $\ln$

استنتاجات وخاصيات:

$\ln 1 = 0$	$\ln e = 1$
$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$ $\ln x = \ln y \Leftrightarrow x = y$ $\ln x > \ln y \Leftrightarrow x > y$	
$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in \mathbb{R}$ $\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$	

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$ $\ln xy = \ln x + \ln y$ $\ln x^r = r \ln x \quad (r \in \mathbb{Q})$ $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$ $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$

إذا كان n عددا زوجيا فإن: $\forall x \in \mathbb{R}^* \quad \ln x^n = n \ln |x|$

مجموعة التعريف:

الدالة f معرفة كما يلي	مجموعة تعريفها
$f(x) = \ln x$	$D_f =]0;+\infty[$
$f(x) = \ln[u(x)]$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u \text{ و } u(x) > 0\}$

النهايات:

نهايات أساسية:

$(n \in \mathbb{N}^*)$

$\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$
$\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$
$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$
$\lim\limits_{x \to 0^+} x^n \ln x = 0$
$\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$

استنتاجات:

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \ln[u(x)] = +\infty$
$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0^+ \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \ln[u(x)] = -\infty$
$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\ln[u(x)]}{[u(x)]^n} = 0$
$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0^+ \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} [u(x)]^n \ln[u(x)] = 0$
$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 1 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\ln[u(x)]}{u(x)-1} = 1$
$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\ln[u(x)+1]}{u(x)} = 1$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

الاتصال:

الدالة $x \mapsto \ln x$ متصلة على المجال $]0;+\infty[$

إذا كانت u موجبة قطعا و متصلة على مجال I فإن الدالة $x \mapsto \ln[u(x)]$ متصلة على المجال I

الاشتقاق


الدالة $x \mapsto \ln x$ قابلة للاشتقاق على $]0,+\infty[$

ولدينا: $\forall x \in]0;+\infty[\quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$

إذا كانت u دالة موجبة قطعا و قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة $x \mapsto \ln[u(x)]$ قابلة للاشتقاق على المجال I

ولدينا: $\forall x \in I \quad (\ln[u(x)])' = \frac{u'(x)}{u(x)}$

التمثيل المبياني:



إشارة ln:

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	$-$	0	$+$

الدالة اللوغاريتم للأساس a حيث: $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$

تعريف:

الدالة اللوغاريتم للأساس a هي الدالة التي يرمز لها بالرمز: $\log_a$

حيث: $\forall x \in]0;+\infty[\quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

حالة خاصة: الدالة $\log_{10}$ تسمى دالة اللوغاريتم العشري و يرمز لها كذلك بالرمز: $\log$

استنتاجات و خاصيات:

$\log_a 1 = 0$

$\log_a a = 1$

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall r \in \mathbb{Q}$

$\log_a x = r \Leftrightarrow x = a^r$

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$

$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$

$(r \in \mathbb{Q}) \quad \log_a x^r = r \log_a x$

$\log_a \frac{1}{x} = -\log_a x$

$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

نهايات و متراجحات:

$a > 1$	$0 < a < 1$
$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$	$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$
$\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$	$\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = -\infty$
$\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$	$\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty$

المشتقة:

$\forall x \in]0,+\infty[\quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

الاتصال

الاتصال في نقطة:

تعريف

$$f \text{ متصلة في } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

الاتصال على اليمين – الاتصال على اليسار:

$$f \text{ متصلة على يمين } x_0 \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \to x_0 \\ > }} f(x) = f(x_0)$$

$$f \text{ متصلة على يسار } x_0 \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \to x_0 \\ < }} f(x) = f(x_0)$$

f متصلة على يمين و على يسار x_0 $\Leftrightarrow$ f متصلة في x_0

الاتصال على مجال:

تكون f متصلة على مجال مفتوح $]a,b[$ إذا كانت f متصلة في كل نقطة من المجال $]a,b[$

تكون f متصلة على مجال مغلق $[a,b]$ إذا كانت f متصلة على المجال المفتوح $]a,b[$ و متصلة على يمين a و متصلة على يسار b

العمليات على الدوال المتصلة:

لتكن f و g دالتين متصلتين على مجال I و k عدد حقيقي

- الدوال $f+g$, $f \times g$, kf متصلة على المجال I
- إذا كانت g لا تنعدم على I فإن الدالتين $\frac{1}{g}$ و $\frac{f}{g}$ متصلتين على المجال I

نتائج:

- كل دالة حدودية متصلة على $\mathbb{R}$
- كل دالة جذرية متصلة على مجموعة تعريفها
- الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ متصلة على $\mathbb{R}^+$
- الدالتان $x \mapsto \sin x$ و $x \mapsto \cos x$ متصلتان على $\mathbb{R}$
- الدالة $x \mapsto \tan x$ متصلة على مجموعة تعريفها $\mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\right\}$

اتصال مركب دالتين:

إذا كانت f متصلة على مجال I و g متصلة على مجال J بحيث: $f(I) \subset J$

فإن: $g \circ f$ متصلة على المجال I

صورة مجال بدالة متصلة:

- صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة
- صورة مجال بدالة متصلة هي مجال

حالات خاصة: لتكن f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال I

الجدول التالي يوضح طبيعة المجال $f(I)$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

المجال I	المجال $f(I)$	
	f تزايدية قطعا على I	f تناقصية قطعا على I
$[a,b]$	$[f(a);f(b)]$	$[f(b);f(a)]$
$[a,b[$	$\left[f(a);\lim\limits_{x\to b^-}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to b^-}f(x);f(a)\right]$
$]a,b]$	$\left]\lim\limits_{x\to a^+}f(x);f(b)\right]$	$\left[f(b);\lim\limits_{x\to a^+}f(x)\right[$
$]a,b[$	$\left]\lim\limits_{x\to a^+}f(x);\lim\limits_{x\to b^-}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to b^-}f(x);\lim\limits_{x\to a^+}f(x)\right[$
$[a,+\infty[$	$\left[f(a);\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to+\infty}f(x);f(a)\right]$
$]a,+\infty[$	$\left]\lim\limits_{x\to a^+}f(x);\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to+\infty}f(x);\lim\limits_{x\to a^+}f(x)\right[$
$]-\infty,a]$	$\left]\lim\limits_{x\to-\infty}f(x);f(a)\right]$	$\left[f(a);\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\right[$
$]-\infty,a[$	$\left]\lim\limits_{x\to-\infty}f(x);\lim\limits_{x\to a^-}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to a^-}f(x);\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\right[$
$\mathbb{R}$	$\left]\lim\limits_{x\to-\infty}f(x);\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to+\infty}f(x);\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\right[$

مبرهنة القيم الوسيطية:

إذا كانت f متصلة على مجال $[a,b]$ فإنه لكل عدد حقيقي β محصور بين العددين $f(a)$ و $f(b)$ يوجد على الأقل عدد حقيقي α من المجال $[a,b]$ بحيث: $f(\alpha)=\beta$

نتيجة:

إذا كانت f متصلة على مجال $[a,b]$ و $f(a)\times f(b)<0$
فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل على الأقل حلا α ينتمي إلى المجال $[a,b]$

إذا كانت f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال $[a,b]$ و $f(a)\times f(b)<0$
فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α ينتمي إلى المجال $[a,b]$

طريقة التفرع الثنائي:


لتكن f دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال $[a,b]$ بحيث: $f(a)\times f(b)<0$
وليكن α الحل الوحيد للمعادلة $f(x)=0$ في المجال $[a,b]$

إذا كان: $f(a)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$	إذا كان: $f(b)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$
فإن: $a<\alpha<\frac{a+b}{2}$ و هذا التأطير سعته $\frac{b-a}{2}$	فإن: $\frac{a+b}{2}<\alpha<b$ و هذا التأطير سعته $\frac{b-a}{2}$
يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال $\left[a;\frac{a+b}{2}\right]$	يمكن إعادة هذه الطريقة على المجال $\left[\frac{a+b}{2};b\right]$
للحصول على تأطير أدق للعدد α	للحصول على تأطير أدق للعدد α

ملاحظة: وهكذا دواليك يمكن إعادة هذه الطريقة إلى أن يتم الحصول على تأطير للعدد α سعته مرغوب فيها

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

الفروع اللانهائية



najah213.com · نجاح 213

الأعداد العقدية

مجموعة الأعداد العقدية هي: $\mathbb{C}=\{z=a+ib/(a;b)\in\mathbb{R}^2 \text{ و } i^2=-1\}$

الكتابة الجبرية لعدد عقدي:

ليكن $z=a+ib$ عددا عقديا حيث: $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

- $a+ib$ تسمى الكتابة الجبرية للعدد العقدي z
- العدد a يسمى الجزء الحقيقي للعدد z و يرمز له بالرمز: $\mathrm{Re}(z)$
- العدد b يسمى الجزء التخيلي للعدد z و يرمز له بالرمز: $\mathrm{Im}(z)$

حالتان خاصتان: إذا كان: $\mathrm{Im}(z)=0$ فإن z هو عدد حقيقي

إذا كان: $\mathrm{Re}(z)=0$ فإن z يسمى عددا تخيليا صرفا

تساوي عددين عقديين:

ليكن z و z' عددين عقديين

$z=z' \Leftrightarrow \mathrm{Re}(z)=\mathrm{Re}(z') \text{ و } \mathrm{Im}(z)=\mathrm{Im}(z')$


التمثيل المياني لعدد عقدي:

ليكن المستوى العقدي منسوبا إلى معلم متعامد ممنظم $(o,\vec{e_1},\vec{e_2})$

ليكن $z=a+ib$ عددا عقديا حيث: $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

نربط العدد العقدي z بالنقطة $M(a,b)$


- العدد z يسمى لحق النقطة M و النقطة M تسمى صورة العدد z و نكتب: $M(z)$
- العدد z يسمى كذلك لحق المتجهة $\overrightarrow{OM}$ و نكتب: $\overrightarrow{OM}(z)$ أو $z=\mathrm{Aff}(\overrightarrow{OM})$



مرافق عدد عقدي:

ليكن $z=a+ib$ عددا عقديا حيث: $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

مرافق العدد z هو العدد العقدي: $\bar{z}=a-ib$




$M(z)$ و $M'(\bar{z})$ متماثلان بالنسبة للمحور الحقيقي

$\overline{z+z'}=\bar{z}+\bar{z'}$	$z=\bar{z} \Leftrightarrow z$ عدد حقيقي
$\overline{z\times z'}=\bar{z}\times\bar{z'}$	$z=-\bar{z} \Leftrightarrow z$ عدد تخيلي صرف
$\overline{z^n}=\bar{z}^n \quad (n\in\mathbb{N}^*)$	$z+\bar{z}=2\mathrm{Re}(z)$
$\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)}=\frac{1}{\bar{z'}}$	$z-\bar{z}=2i\,\mathrm{Im}(z)$
$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)}=\frac{\bar{z}}{\bar{z'}} \quad (z'\neq 0)$	$z\bar{z}=[\mathrm{Re}(z)]^2+[\mathrm{Im}(z)]^2$

معيار عدد عقدي:

ليكن $z=a+ib$ عددا عقديا حيث: $(a;b)\in\mathbb{R}^2$


معيار العدد العقدي z هو العدد الحقيقي الموجب: $|z|=\sqrt{z\bar{z}}=\sqrt{a^2+b^2}$



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

$\lvert z\times z'\rvert=\lvert z\rvert\times\lvert z'\rvert$	$\lvert z^n\rvert=\lvert z\rvert^n \quad (n\in\mathbb{N}^*)$
$\lvert\overline{z}\rvert=\lvert z\rvert$	$\lvert -z\rvert=\lvert z\rvert$
$\left\lvert\frac{1}{z'}\right\rvert=\frac{1}{\lvert z'\rvert}$	$\left\lvert\frac{z}{z'}\right\rvert=\frac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert} \quad (z'\neq 0)$

الشكل المثلثي و الكتابة الأسية لعدد عقدي غير منعدم:



ليكن z عددا عقديا غير منعدم صورته M

عمدة العدد العقدي z هو أحد قياسات الزاوية الموجهة: $\left(\vec{e_1},\vec{OM}\right)$ أي θ

و نرمز له بالرمز: $\arg z$

ونكتب: $\arg z=\theta\,[2\pi]$

ليكن z عددا عقديا غير منعدم

نضع $r=\lvert z\rvert$ و $\arg z=\theta\,[2\pi]$

- الشكل المثلثي للعدد العقدي z هو:
$$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=[r,\theta]$$
- الكتابة الأسية للعدد العقدي z هي: $z=re^{i\theta}$

حالات خاصة:

الكتابة المثلثية لعدد حقيقي a غير منعدم

$a>0$	$a<0$
$a=[a,0]$	$a=[-a,\pi]$
$ai=\left[a,+\frac{\pi}{2}\right]$	$ai=\left[-a,-\frac{\pi}{2}\right]$

$\arg(zz')=(\arg z+\arg z')\,[2\pi]$	$[r,\theta]\times[r',\theta']=[rr';\theta+\theta']$	$re^{i\theta}\times r'e^{i\theta'}=rr'e^{i(\theta+\theta')}$
$\arg\overline{z}=-\arg z\,[2\pi]$	$\overline{[r,\theta]}=[r,-\theta]$	$\overline{re^{i\theta}}=re^{-i\theta}$
$-\arg z=(\pi+\arg z)\,[2\pi]$	$-[r,\theta]=[r,\pi+\theta]$	$-re^{i\theta}=re^{i(\pi+\theta)}$
$\arg z^n=n\arg z\;\;[2\pi]$	$[r,\theta]^n=[r^n;n\theta]$	$\left(re^{i\theta}\right)^n=r^ne^{in\theta}$
$\arg\frac{1}{z}=-\arg z\;\;[2\pi]$	$\frac{1}{[r';\theta']}=\left[\frac{1}{r'};-\theta'\right]$	$\frac{1}{r'e^{i\theta'}}=\frac{1}{r'}e^{-i\theta'}$
$\arg\frac{z}{z'}=(\arg z-\arg z')\;\;[2\pi]$	$\frac{[r;\theta]}{[r';\theta']}=\left[\frac{r}{r'};\theta-\theta'\right]$	$\frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}}=\frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$

$$\forall k\in\mathbb{Z}\quad [r,\theta+2k\pi]=[r,\theta]$$

- z عدد حقيقي $\Leftrightarrow \arg z=k\pi$
- z عدد تخيلي صرف $\Leftrightarrow \arg z=\frac{\pi}{2}+k\pi \quad (k\in\mathbb{Z})$

صيغة موافر:

$$\forall n\in\mathbb{N}$$
$$(\cos\theta+i\sin n\theta)^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

صيغتا أولر:

$$\forall\theta\in\mathbb{R}\quad \cos\theta=\frac{1}{2}\left(e^{i\theta}+e^{-i\theta}\right)$$
$$\sin\theta=\frac{1}{2i}\left(e^{i\theta}-e^{-i\theta}\right) \text{ و}$$

حل المعادلة $z^2=a$ حيث $z\in\mathbb{C}$ $(a\in\mathbb{R})$:

المعادلة		مجموعة حلول المعادلة
$z\in\mathbb{C}\quad z^2=a$	$a>0$	$S=\left\{-i\sqrt{a};i\sqrt{a}\right\}$
	$a=0$	$S=\{0\}$
	$a<0$	$S=\left\{-i\sqrt{-a};i\sqrt{-a}\right\}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

حل المعادلة: $az^2+bz+c=0 \quad z\in\mathbb{C}$ حيث: a و b و c أعداد حقيقية $(a\neq 0)$

المعادلة:		مجموعة حلول المعادلة:
$z\in\mathbb{C} \quad az^2+bz+c=0$ $\left(\Delta=b^2-4ac\right)$	$\Delta>0$	$S=\left\{\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a};\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\right\}$
	$\Delta=0$	$S=\left\{\frac{-b}{2a}\right\}$
	$\Delta<0$	$S=\left\{\frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a};\frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right\}$

مفاهيم هندسية و مصطلحات الأعداد العقدية:

المفهوم الهندسي	العلاقة العقدية
المسافة AB	$AB=\lvert z_B-z_A\rvert$
I منتصف القطعة $[A;B]$	$z_I=\frac{z_A+z_B}{2}$
قياس الزاوية $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$	$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)=\arg\left(\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right)[2\pi]$
A و B و C نقط مستقيمية	$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\in\mathbb{R}$
A و B و C و D نقط متداورة	$\frac{z_D-z_A}{z_B-z_A}\times\frac{z_D-z_C}{z_B-z_C}\in\mathbb{R}$ أو $\frac{z_D-z_A}{z_B-z_A}\times\frac{z_B-z_C}{z_D-z_C}\in\mathbb{R}$

العلاقة العقدية	المفهوم الهندسي
$\lvert z-z_A\rvert=r$ $(r>0)$	• $AM=r$ • M تنتمي إلى الدائرة التي مركزها A و شعاعها r
$\lvert z-z_A\rvert=\lvert z-z_B\rvert$	• $AM=BM$ • M تنتمي إلى واسط $[AB]$
$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\left[r;\pm\frac{\pi}{2}\right]$	ABC مثلث قائم الزاوية في A
$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=[1;\theta]$	ABC مثلث متساوي الساقين في A
$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\left[1;\pm\frac{\pi}{2}\right]$	ABC مثلث متساوي الساقين و قائم الزاوية في A
$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\left[1;\pm\frac{\pi}{3}\right]$	ABC مثلث متساوي الأضلاع

تمثيلات عقدية لبعض التحويلات الاعتيادية:

التحويل:	التمثيل العقدي:
الإزاحة: t_u	$z'=z+b$ حيث: b لحق المتجهة $\vec{u}$
التحاكي: $h(\Omega;k)$	$z'-\omega=k(z-\omega)$ حيث: ω لحق النقطة Ω
الدوران: $r(\Omega;\theta)$	$z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)$ حيث: ω لحق النقطة Ω

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

التعداد

رئيسي مجموعة:

تعريف:

رئيسي مجموعة منتهية E هو عدد عناصر المجموعة E ويرمز له بالرمز: $\text{Card}E$

حالة خاصة: $\text{Card}\varnothing = 0$

خاصة:

A و B مجموعتان منتهيتان

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}A + \text{Card}B - \text{Card}(A \cap B)$$

متمم مجموعة:

تعريف:

ليكن A جزءا من مجموعة منتهية E

متمم A بالنسبة للمجموعة E هي المجموعة التي يرمز لها بالرمز: $\overline{A}$

حيث $\overline{A} = \{x \in E / x \notin A\}$

ملاحظات:

- $A \cap \overline{A} = \varnothing$
- $A \cup \overline{A} = E$
- $\text{card}\overline{A} = \text{card}E - \text{card}A$

المبدأ الأساسي للتعداد:

نعتبر تجربة تتطلب نتائجها p اختيارا $(p \in \mathbb{N}^*)$

إذا كان الاختيار الأول يتم ب n_1 كيفية مختلفة

و كان الاختيار الثاني يتم ب n_2 كيفية مختلفة

.....

و كان الاختيار p يتم ب n_p كيفية مختلفة

فإن عدد النتائج الممكنة هو الجداء : $n_1 \times n_2 \times n_3 \times \ldots \times n_p$

الترتيبات بتكرار- الترتيبات بدون بتكرار:

الترتيبات بتكرار:

ليكن n و p عنصرين من $\mathbb{N}^*$ $(p \leq n)$

عدد الترتيبات بتكرار ل p عنصر من بين n عنصر هو: n^p

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

الترتيبات بدون تكرار:

- خاصة:

ليكن n و p عنصرين من $\mathbb{N}^*$ $(p \le n)$
عدد الترتيبات بدون تكرار ل p عنصر من بين n عنصر هو:

$$A_n^p = \underbrace{n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times (n-p+1)}_{p \text{ من العوامل}}$$

- حالة خاصة:

كل ترتيبة بدون تكرار ل n عنصر من بين n عنصر تسمى كذلك تبديلة ل n عنصر
و عددها: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 2 \times 1$

التأليفات:

لتكن E مجموعة منتهية عدد عناصرها n
كل جزء A من E عدد عناصره p $(p \le n)$
يسمى تأليفة ل p عنصر من بين n عنصر
و عدد هذه التأليفات هو: $C_n^p = \dfrac{A_n^p}{p!}$

الأعداد: $n!$ و A_n^p و C_n^p:

$n \in \mathbb{N}^*$ $\quad n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 2 \times 1$
$0! = 1$

$C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$	$A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$
$C_n^n = 1$; $C_n^1 = n$	$C_n^0 = 1$; $C_n^{n-1} = n$
$C_n^p = C_n^{n-p}$	$C_n^p + C_n^{p-1} = C_{n+1}^p$

عدد إمكانيات ترتيب n عنصر:

إذا كان لدينا n عنصر من بينها $(n_1 + n_2 + n_3 = n)$
n_1 عنصر من النوع A
و n_2 عنصر من النوع B
و n_3 عنصر من النوع C
فإن إمكانيات ترتيب هذه العناصر هو: $\dfrac{n!}{n_1! \times n_2! \times n_3!}$

بعض أنواع السحب:

نسحب p عنصر من بين n عنصر $(p \le n)$ و نلخص النتائج في الجدول التالي:

نوع السحب	عدد السحبات الممكنة هو:	الترتيب
آني	C_n^p	غير مهم
بالتتابع و بإحلال	n^p	مهم
بالتتابع و بدون إحلال	A_n^p	مهم

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

الاشتقاق

قابلية الاشتقاق في عدد:

نقول إن دالة f قابلة للاشتقاق في العدد x_0 إذا كانت النهاية: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ منتهية

هذه النهاية تسمى العدد المشتق للدالة f في x_0 ويرمز له بالرمز: $f'(x_0)$

معادل المماس لمنحنى دالة- الدالة التآلفية المماسة لمنحنى دالة:

لتكن f دالة قابلة للاشتقاق في x_0

- معادلة المماس لمنحنى الدالة f في النقطة التي أفصولها x_0 هي: $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$
- الدالة u المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $u(x)=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

تسمى الدالة التآلفية المماسة لمنحنى الدالة f في النقطة التي أفصولها x_0 و هي تقريب للدالة f بجوار x_0

قابلية الاشتقاق على اليمين- قابلية الاشتقاق على اليمين :

- نقول إن دالة f قابلة للاشتقاق على اليمين في x_0 إذا كانت النهاية $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ منتهية

هذه النهاية تسمى العدد المشتق للدالة f على يمين x_0 و يرمز له بالرمز: $f'_d(x_0)$

- نقول إن دالة f قابلة للاشتقاق على يسار x_0 إذا كانت النهاية: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ منتهية

هذه النهاية تسمى العدد المشتق للدالة f على يسار x_0 و يرمز له بالرمز: $f'_g(x_0)$

تكون دالة f قابلة للاشتقاق في x_0 إذا كانت f قابلة للاشتقاق على اليمين و على اليسار في x_0 و $f'_g(x_0)=f'_d(x_0)$

الاشتقاق و الاتصال:

إذا كانت دالة f قابلة للاشتقاق في عدد x_0 فإن f تكون متصلة في x_0

جدول مشتقات بعض الدوال الاعتيادية:

$f(x)$	$f'(x)$	
k	0	$(k\in\mathbb{R})$
x	1	
$\dfrac{1}{x}$	$\dfrac{-1}{x^2}$	
x^r	rx^{r-1}	$(r\in\mathbb{Q}^*-\{1\})$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

العمليات على الدوال المشتقة:

$(u+v)'=u'+v'$	$(u-v)'=u'-v'$	$(k\in\mathbb{R})\quad (ku)'=k(u)'$
$(uv)'=u'v+uv'$		$\left(u^n\right)'=nu'.u^{n-1}$
$\left(\frac{1}{v}\right)'=\frac{-v'}{v^2}$		$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$

مشتقة مركب دالتين- مشتقة دالة الجذر:

$(uov)'=[u'ov]\times v'$	$\left(\sqrt{u}\right)'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}$

الاشتقاق و تغيرات دالة:

لتكن f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I

- $f'(x)\geq 0 \quad \forall x\in I \Leftrightarrow$ f تزايدية على المجال I
- $f'(x)\leq 0 \quad \forall x\in I \Leftrightarrow$ f تناقصية على المجال I
- $f'(x)=0 \quad \forall x\in I \Leftrightarrow$ f ثابتة على المجال I

الاشتقاق و التأويل الهندسي:

النهاية	استنتاج	التأويل الهندسي المنحنى(Cf) يقبل:
$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=a \quad (a\neq 0)$	f قابلة للاشتقاق في x_0	مماسا في النقطة $A(x_0;f(x_0))$ معامله الموجه هو a
$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=0$		مماسا أفقيا في النقطة $A(x_0;f(x_0))$
$\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=a \quad (a\neq 0)$	f قابلة للاشتقاق على يمين x_0	نصف مماس على اليمين في النقطة $A(x_0;f(x_0))$ ؛ معامل الموجه لحامله هو a
$\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=0$		نصف مماس أفقي على اليمين في النقطة $A(x_0;f(x_0))$
$\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=-\infty$	f غير قابلة للاشتقاق على يمين x_0	نصف مماس عمودي على اليمين في النقطة $A(x_0;f(x_0))$ موجه نحو الأسفل
$\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=+\infty$		نصف مماس عمودي على اليمين في النقطة $A(x_0;f(x_0))$ موجه نحو الأعلى
$\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=a \quad (a\neq 0)$	f قابلة للاشتقاق على يسار x_0	نصف مماس على اليسار في النقطة $A(x_0;f(x_0))$ ؛ معامل الموجه لحامله هو a
$\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=0$		نصف مماس أفقي على اليسار في النقطة $A(x_0;f(x_0))$
$\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=-\infty$	f غير قابلة للاشتقاق على يسار x_0	نصف مماس عمودي على اليسار في النقطة $A(x_0;f(x_0))$ موجه نحو الأعلى
$\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=+\infty$		نصف مماس عمودي على اليسار في النقطة $A(x_0;f(x_0))$ موجه نحو الأسفل

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

المعادلات التفاضلية

المعادلة التفاضلية	الحل العام للمعادلة التفاضلية
$y' = ay + b$ $(a \neq 0)$	$y(x) = \alpha e^{ax} - \frac{b}{a}$ $(a \in \mathbb{R})$

المعادلة التفاضلية	معادلتها المميزة	المعادلة المميزة تقبل :		الحل العام للمعادلة التفاضلية
$y'' + ay' + by = 0$	$r^2 + ar + b = 0$ $(\Delta = a^2 - 4b)$	حلين حقيقيين مختلفين r_1 و r_2	$\Delta > 0$	$y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ حيث: $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
		حلا حقيقيا وحيدا r	$\Delta = 0$	$y(x) = (\alpha x + \beta) e^{rx}$ حيث: $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
		حلين عقديين مترافقين: $r_1 = p - iq$ و $r_2 = p + iq$	$\Delta < 0$	$y(x) = (\alpha \cos qx + \beta \sin qx) e^{px}$ حيث: $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

الهندسة الفضائية

في سياق هذا الملخص ليكن الفضاء منسوبا إلى معلم متعامد ممنظم $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

الصيغة التحليلية لـ: الجداء السلمي- منظم متجهة- الجداء المتجهي:

لتكن $\vec{u}(a,b,c)$ و $\vec{v}(a',b',c')$ متجهتين من ϑ_3

- $\vec{u}.\vec{v}=aa'+bb'+cc'$
- $\|\vec{u}\|=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$
- $\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & a & a'\\ \vec{j} & b & b'\\ \vec{k} & c & c'\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b & b'\\ c & c'\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}a & a'\\ c & c'\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}a & a'\\ b & b'\end{vmatrix}\vec{k}$

المسافة:

المسافة بين نقطتين A و B هي:

$$AB=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$$

المسافة بين نقطة M و مستوى (P) معادلته الديكارتية: $ax+by+cz+d=0$ هي:

$$d(M,(P))=\frac{|ax_M+by_M+cz_M+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

المسافة بين نقطة M و مستقيم $\Delta(A,\vec{u})$ هي:

$$d(A,(\Delta))=\frac{\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}$$

معادلة مستوى:

$\vec{n}(a,b,c)\Leftrightarrow(P):ax+by+cz+d=0$ متجهة منظمية على المستوى (P)

إذا كانت A و B و C نقط غير مستقيمة فإن $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ متجهة منظمية على المستوى (ABC)


و في هذه الحالة يمكن تحديد معادلة المستوى (ABC) بالاستعانة بالتكافؤ التالي :

$$M\in(ABC)\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}.\left(\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right)=0$$

معادلة فلكة:

معادلة فلكة مركزها $\Omega(a,b,c)$ و شعاعها R هي:

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$




فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

معادلة فلكة (S) أحد أقطارها $[AB]$ يمكن تحديدها بالاستعانة بالتكافؤ التالي:

$$M \in (S) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$$




ملاحظة: الفلكة (S) مركزها Ω منتصف $[AB]$ و شعاعها $\frac{AB}{2}$

تقاطع فلكة $S(\Omega,R)$ و مستوى $(P): ax+by+cz+d=0$

لتكن H المسقط العمودي للمركز Ω على المستوى (P)

نضع: $d = \Omega H = d(\Omega;(P))$




$d > R$	$d = R$	$d < R$
المستوى (P) لا يقطع الفلكة (S)	المستوى (P) مماس للفلكة (S) في النقطة H	المستوى (P) يقطع الفلكة (S) وفق دائرة (C) مركزها: H شعاعها: $r = \sqrt{R^2 - d^2}$

تقاطع فلكة $S(\Omega,R)$ و مستقيم (Δ):

لتكن H المسقط العمودي للمركز Ω على المستقيم (Δ)

نضع: $d = \Omega H = d(\Omega;(\Delta))$



$d > R$	$d = R$	$d < R$
المستوى (P) و الفلكة (S) لا يتقاطعان	المستقيم (Δ) مماس للفلكة (S) في النقطة H	المستقيم (Δ) يخترق الفلكة (S) في نقطتين مختلفتين

najah213.com · نجاح 213

الدوال الأسية

الدالة الأسية النبيرية

تعريف:

الدالة $x \mapsto e^x$ هي الدالة العكسية للدالة $\ln$ و تسمى الدالة الأسية النبيرية

استنتاجات وخاصيات:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x > 0$	$\forall (x;y) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall r \in \mathbb{Q}$
$\ln e^x = x$	$e^x \times e^y = e^{x+y}$
$\forall x \in]0;+\infty[\quad e^{\ln x} = x$	$(e^x)^r = e^{rx}$
$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in]0;+\infty[$	$\frac{1}{e^x} = e^{-x}$
$e^x = y \Leftrightarrow x = \ln y$	$\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$
$\forall (x;y) \in \mathbb{R}^2 \quad e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$	
$e^x > e^y \Leftrightarrow x > y$	

مجموعة التعريف:

الدالة f معرفة كما يلي	مجموعة تعريفها
$f(x) = e^x$	$D_f = \mathbb{R}$
$f(x) = e^{u(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u\}$

النهايات:

نهايات أساسية:

$\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$
$\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$
$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$
$\lim\limits_{x \to -\infty} x^n e^x = 0$
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$(n \in \mathbb{N}^*)$

استنتاجات:

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} e^{u(x)} = +\infty$
$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = -\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} e^{u(x)} = 0$
$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{e^{u(x)}}{[u(x)]^n} = +\infty$
$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = -\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} [u(x)]^n e^{u(x)} = 0$
$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} = +\infty$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

الاتصال:

الدالة $x \mapsto e^x$ متصلة على $\mathbb{R}$
إذا كانت دالة u متصلة على مجال I فإن الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$ متصلة على المجال I

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الاشتقاق


الدالة $x \mapsto e^x$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$

ولدينا: $\forall x \in \mathbb{R} \quad \left(e^x\right)' = e^x$

إذا كانت دالة u قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة $x \mapsto e^{u(x)}$ قابلة للاشتقاق على المجال I

ولدينا: $\forall x \in I \quad \left(e^{u(x)}\right)' = u'(x) \times e^{u(x)}$

التمثيل المبياني:



الدالة الأسية للأساس a حيث: $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$

تعريف:

الدالة $x \mapsto a^x$ هي الدالة العكسية للدالة $\log_a$ و تسمى الدالة الأسية للأساس a

استنتاجات و خاصيات:

$\forall x \in \mathbb{R} \quad a^x = e^{x \ln a}$	$\forall (x;y) \in \mathbb{R}^2$
$\log_a\left(a^x\right) = x$	$a^x \times a^y = a^{x+y}$
$\forall x \in]0;+\infty[\quad a^{\log_a x} = x$	$(r \in \mathbb{Q}) \quad \left(a^x\right)^r = a^{rx}$
$a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$	$\frac{1}{a^x} = a^{-x}$
$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in]0;+\infty[$	$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
$a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a(y)$	

نهايات و متراجحات:

$a > 1$	$0 < a < 1$
$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$	$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$
$\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$ $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$	$\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = 0$ $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = +\infty$
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	

المشتقة:

$$\left(a^x\right)' = (\ln a) \times a^x$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

متطابقات هامة
مجموعة تعريف دالة عددية

متطابقات هامة.

لكل عددين حقيقيين a و b

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$
$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$
$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

مجموعة تعريف بعض الدوال العددية:

f دالة عددية لمتغير حقيقي x معرفة بما يلي:	مجموعة تعريف الدالة f
$f(x) = P(x)$	$D_f = \mathbb{R}$
$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) \neq 0\}$
$f(x) = \sqrt{P(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / P(x) \geq 0\}$
$f(x) = \frac{P(x)}{\sqrt{Q(x)}}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) > 0\}$
$f(x) = \frac{\sqrt{P(x)}}{\sqrt{Q(x)}}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / P(x) \geq 0 \text{ و } Q(x) > 0\}$
$f(x) = \sqrt{\frac{P(x)}{Q(x)}}$	$D_f = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \text{ و } Q(x) \neq 0\right\}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

التكامل

تكامل دالة متصلة على قطعة:

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a,b]$ و F دالة أصلية للدالة f على المجال $[a,b]$

تكامل الدالة f من a إلى b هو العدد الحقيقي:

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$$

خاصيات:

الخطانية:

$\int_a^a f(x)dx = 0$	$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$
$\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx \quad (k \in \mathbb{R})$	$\int_a^b [f(x)+g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

علاقة شال:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

التكامل و الترتيب:

إذا كان: $\forall x \in [a,b] \quad f(x) \geq 0$	إذا كان: $\forall x \in [a,b] \quad f(x) \leq g(x)$
فإن: $\int_a^b f(x)dx \geq 0$	فإن: $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

القيمة المتوسطة:

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a,b]$

القيمة المتوسطة للدالة على المجال $[a,b]$ هي العدد الحقيقي: $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

المكاملة بالأجزاء:

لتكن f و g دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال $[a,b]$ بحيث تكون f' و g' متصلتين على المجال $[a,b]$


$$\int_a^b [f'(x)\times g(x)]dx = \left[f(x)\times g(x)\right]_a^b - \int_a^b [f(x)\times g'(x)]dx$$

حساب مساحة حيز:

ليكن المستوى منسوبا إلى معلم متعامد $(o,\vec{i},\vec{j})$

وحدة المساحة : u.A هي مساحة المستطيل المحدد بالنقطة o و المتجهتين $\vec{i}$ و $\vec{j}$

$$1.u.A = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$$








لتكن f دالة متصلة على مجال $[a;b]$
مساحة الحيز المحصور بين المنحنى C_f ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=a$ و $y=b$ هي:

$$\left(\int_a^b |f(x)|dx\right).u.A$$

لتكن f و g دالتين متصلتين على مجال $[a;b]$
مساحة الحيز المحصور بين المنحنيين C_f و C_g ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=a$ و $y=b$ هي:

$$\left(\int_a^b |f(x)-g(x)|dx\right).u.A$$


حالات خاصة:

الرسم	ملاحظات	مساحة الحيز الرمادي في الرسم
	f موجبة على المجال $[a,b]$	$\left(\int_a^b f(x)dx\right).u.A$
	f سالبة على المجال $[a,b]$	$\left(\int_a^b -f(x)dx\right).u.A$
	• f موجبة على المجال $[a,c]$ • f سالبة على المجال $[c,b]$	$\left(\int_a^c f(x)dx+\int_c^b -f(x)dx\right).u.A$
	(C_f) يوجد فوق (C_g) على المجال $[a,b]$	$\left(\int_a^b (f(x)-g(x))dx\right).u.A$
	• (C_f) فوق (C_g) على المجال $[a,c]$ • (C_g) فوق (C_f) على المجال $[c,b]$	$\left(\int_a^c (f(x)-g(x))dx+\int_c^b (g(x)-f(x))dx\right).u.A$

حساب حجم:

حجم المجسم المولد بدوران المنحنى (C_f) حول محور الأفاصيل دورة كاملة في مجال $[a,b]$ هو:

$$V=\left[\int_a^b \pi(f(x))^2 dx\right]u.v$$



najah213.com · نجاح 213

الدوال اللوغارتمية

الدالة اللوغاريتم النيبري:

تعريف:

دالة اللوغاريتم النيبري هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ على المجال $]0;+\infty[$ والتي تنعدم في 1

ويرمز لها بالرمز: ln

استنتاجات وخاصيات:

$\ln 1 = 0$	$\ln e = 1$
$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$ $\ln x = \ln y \Leftrightarrow x = y$ $\ln x > \ln y \Leftrightarrow x > y$	
$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in \mathbb{R}$ $\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$	

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$

$\ln xy = \ln x + \ln y$

$\ln x^r = r \ln x \quad (r \in \mathbb{Q})$

$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$

$\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$

إذا كان n عددا زوجيا فإن: $\forall x \in \mathbb{R}^* \quad \ln x^n = n \ln |x|$

مجموعة التعريف:

الدالة f معرفة كما يلي	مجموعة تعريفها
$f(x) = \ln x$	$D_f =]0;+\infty[$
$f(x) = \ln[u(x)]$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u \text{ و } u(x) > 0\}$

النهايات:

نهايات أساسية:

$(n \in \mathbb{N}^*)$

$\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$

$\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$

$\lim\limits_{x \to 0^+} x^n \ln x = 0$

$\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$

استنتاجات:

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \ln[u(x)] = +\infty$

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0^+ \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \ln[u(x)] = -\infty$

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\ln[u(x)]}{[u(x)]^n} = 0$

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0^+ \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} [u(x)]^n \ln[u(x)] = 0$

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 1 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\ln[u(x)]}{u(x)-1} = 1$

$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\ln[u(x)+1]}{u(x)} = 1$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

الاتصال:

الدالة $x \mapsto \ln x$ متصلة على المجال $]0;+\infty[$

إذا كانت u موجبة قطعا و متصلة على مجال I فإن الدالة $x \mapsto \ln\left[u(x)\right]$ متصلة على المجال I

الاشتقاق


الدالة $x \mapsto \ln x$ قابلة للاشتقاق على $]0,+\infty[$

ولدينا: $\forall x \in]0;+\infty[\quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$

إذا كانت u دالة موجبة قطعا و قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة $x \mapsto \ln\left[u(x)\right]$ قابلة للاشتقاق على المجال I

ولدينا: $\forall x \in I \quad \left(\ln\left[u(x)\right]\right)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$

التمثيل المبياني:



إشارة ln:

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	$-$	0	$+$

الدالة اللوغاريتم للأساس a حيث: $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$

تعريف:

الدالة اللوغاريتم للأساس a هي الدالة التي يرمز لها بالرمز: $\log_a$

حيث: $\forall x \in]0;+\infty[\quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

حالة خاصة: الدالة $\log_{10}$ تسمى دالة اللوغاريتم العشري و يرمز لها كذلك بالرمز: $\log$

استنتاجات و خاصيات:

$\log_a 1 = 0$

$\log_a a = 1$

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall r \in \mathbb{Q}$

$\log_a x = r \Leftrightarrow x = a^r$

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$

$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$

$(r \in \mathbb{Q}) \quad \log_a x^r = r \log_a x$

$\log_a \frac{1}{x} = -\log_a x$

$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

نهايات و متراجحات:

$a > 1$	$0 < a < 1$
$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$	$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$
$\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$	$\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = -\infty$
$\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$	$\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty$

المشتقة:

$\forall x \in]0,+\infty[\quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

محور التماثل – مركز التماثل
نقطة الانعطاف

محور التماثل:

يكون المستقيم الذي معادلته $x = a$ محور تماثل للمنحنى (C_f) إذا تحقق الشرطان التاليان:

- $(2a - x) \in D_f \qquad \forall x \in D_f$
- $f(2a - x) = f(x) \qquad \forall x \in D_f$

حالة خاصة: إذا كانت $a = 0$ فإن f دالة زوجية

مركز التماثل:

يكون النقطة $I(a,b)$ مركز تماثل للمنحنى (C_f) إذا تحقق الشرطان التاليان:

- $(2a - x) \in D_f \qquad \forall x \in D_f$
- $f(2a - x) + f(x) = 2b \qquad \forall x \in D_f$

حالة خاصة: إذا كانت $a = b = 0$ فإن f دالة فردية

التقعر- التحدب- نقطة الانعطاف:



يكون منحنى دالة مقعرا على مجال إذا كان يوجد تحت جميع مماساته على هذا المجال

إذا كان: $f''(x) \le 0 \qquad \forall x \in I$


فإن: (C_f) مقعر على المجال I



يكون منحنى دالة محدبا على مجال إذا كان يوجد فوق جميع مماساته على هذا المجال

إذا كان: $f''(x) \ge 0 \qquad \forall x \in I$

فإن: (C_f) محدب على المجال I



نقطة انعطاف منحنى دالة هي نقطة من المنحنى التي عندها يتغير تقعر هذا المنحنى

إذا كانت f'' تنعدم في x_0 مع تغيير الإشارة فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف أفصولها x_0

إذا كانت f' تنعدم في x_0 دون تغيير الإشارة فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف أفصولها x_0

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

الدوال الأصلية

الدوال الأصلية لدالة متصلة على مجال:

تعريف:

لتكن f دالة عددية معرفة على مجال I

نقول أن F هي دالة أصلية للدالة f على المجال I

إذا تحقق الشرطان التاليان:

- F قابلة للاشتقاق على المجال I
- $\forall x \in I \quad F'(x) = f(x)$

خاصيات:

كل دالة متصلة على مجال تقبل دالة أصلية على هذا المجال

لتكن f دالة عددية معرفة على مجال I

إذا كانت F دالة أصلية للدالة f على المجال I فإن:

جميع الدوال الأصلية للدالة f معرفة على I بما يلي:

$$x \mapsto F(x) + k \qquad (k \in \mathbb{R})$$

لتكن f دالة عددية تقبل دالة أصلية على مجال I

وليكن x_0 عنصرا من I و y_0 عنصرا من $\mathbb{R}$

توجد دالة أصلية وحيدة F للدالة f على المجال I تحقق الشرط البدئي:

$$F(x_0) = y_0$$

الدوال الأصلية: لمجموع دالتين- لجداء دالة و عدد حقيقي:

خاصية:

لتكن f و g دالتين عدديتين معرفتين على مجال I و k عددا حقيقيا

إذا كانت F و G دالتين أصليتين للدالتين f و g على المجال I على التوالي فإن:

- $F+G$ دالة أصلية للدالة $f+g$ على المجال I
- kF دالة أصلية للدالة kf على المجال I

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

جدول الدوال الأصلية لبعض الدوال الاعتيادية:

$f(x)$	$F(x)$	
$a \in \mathbb{R}$	$ax+k$	
x	$\frac{1}{2}x^2+k$	
$\frac{1}{x^2}$	$\frac{-1}{x}+k$	
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}+k$	
x^r	$\frac{x^{r+1}}{r+1}+k$	$(r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\})$
$\sin x$	$-\cos x+k$	
$\cos x$	$\sin x+k$	
$1+\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x+k$	
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert+k$	
e^x	e^x+k	

استعمال صيغ الاشتقاق لتحديد بعض الدوال الأصلية:

$f(x)$	$F(x)$	
$u'(x)+v'(x)$	$u(x)+v(x)+k$	
$a\,u'(x)$	$a\,u(x)+k$	$(a \in \mathbb{R})$
$u'(x)\times v(x)+u(x)\times v'(x)$	$u(x)\times v(x)+k$	
$\frac{-v'(x)}{[v(x)]^2}$	$\frac{1}{v(x)}+k$	
$\frac{u'(x)\times v(x)-u(x)\times v'(x)}{[v(x)]^2}$	$\frac{u(x)}{v(x)}+k$	
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$	$2\sqrt{u(x)}+k$	
$u'(x)\times[u(x)]^r$	$\frac{[u(x)]^{r+1}}{r+1}+k$	$(r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\})$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln\lvert u(x)\rvert+k$	
$u'(x)\times e^{u(x)}$	$e^{u(x)}+k$	
$\cos(ax+b)$	$\frac{1}{a}\sin(ax+b)+k$	$(a \neq 0)$
$\sin(ax+b)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax+b)+k$	$(a \neq 0)$ $(k \in \mathbb{R})$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

الاحتمالات

مصطلحات

المصطلح الاحتمالي	معناه
تجربة عشوائية	كل تجربة تقبل أكثر من نتيجة
Ω كون الإمكانيات	هي مجموعة الإمكانيات الممكنة لتجربة عشوائية
حدث A	A جزءا من كون الإمكانيات Ω
حدث ابتدائي	كل حدث يتضمن عنصرا وحيدا
تحقق الحدث $A \cap B$	إذا تحقق الحدثان A و B في آن واحد
تحقق الحدث $A \cup B$	إذا تحقق A أو B أو هما معا
الحدث المضاد للحدث A	هو الحدث $\overline{A}$ $\left(A \cap \overline{A} = \varnothing \text{ و } A \cup \overline{A} = \Omega\right)$
A و B حدثان غير منسجمين	$A \cap B = \varnothing$

استقرار حدث - احتمال حدث:

تعريف:

ليكن Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية

- عندما يستقر احتمال حد ث ابتدائي $\{\omega_i\}$ في قيمته p_i نقول أن احتمال الحدث $\{\omega_i\}$ هو: p_i

ونكتب: $P(\{\omega_i\}) = p_i$

- احتمال حدث هو مجموع الاحتمالات الابتدائية التي تكون هذا الحدث

أي إذا كان $A = \{\omega_1; \omega_2; \omega_3; \ldots; \omega_n\}$ حدثا من Ω فإن احتمال الحدث A هو:

$$p(A) = p(\omega_1) + p(\omega_2) + p(\omega_3) + \ldots + p(\omega_n)$$

خاصيات:

ليكن Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية

- $p(\varnothing) = 0$ و $p(\Omega) = 1$
- $0 \le p(A) \le 1$ لكل حدث A من Ω
- احتمال اتحاد حدثين:

لكل حدثين A و B من Ω

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$ إذا كان A و B غير منسجمين

- احتمال الحدث المضاد:

لكل حدث A من Ω هو: $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$

فرضية تساوي الاحتمالات:

تعريف:

إذا كانت جميع الأحداث الابتدائية متساوية الاحتمال في تجربة عشوائية كون إمكانيتها Ω

فإن احتمال كل حدث A من Ω هو: $p(A) = \dfrac{\text{card}A}{\text{card}\Omega}$

الاحتمال الشرطي- استقلالية حدثين:

تعريف:

ليكن A و B حدثين مرتبطين بنفس التجربة العشوائية بحيث: $p(A) \neq 0$

احتمال حدث B علما أن الحدث A محقق هو العدد: $p_A(B) = p\left(B/A\right) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(A)}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

نتيجة:

لكل حدثين A و B مرتبطين بنفس التجربة العشوائية بحيث: $p(A)\times p(B)\neq 0$

لدينا: $p(A\cap B)=p(A)\times p\left(\frac{B}{A}\right)=p(B)\times p\left(\frac{A}{B}\right)$

تعريف:

لكل حدثين A و B مرتبطين بنفس التجربة العشوائية

$p(A\cap B)=p(A)\times p(B)\Leftrightarrow$ A و B حدثان مستقلان

خاصية:

ليكن Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية و Ω_1 و Ω_2 تجزيئا لـ Ω

$(\Omega_1\cap\Omega_2=\varnothing$ و $\Omega_1\cup\Omega_2=\Omega)$

لكل حدث A من Ω:

$$p(A)=p(\Omega_1)\times p\left(\frac{A}{\Omega_1}\right)+p(\Omega_2)\times p\left(\frac{A}{\Omega_2}\right)$$

قانون احتمال متغير عشوائي:

ليكن X متغيرا عشوائيا على Ω كون إمكانيات تجربة عشوائية

لتحديد قانون احتمال المتغير العشوائي X نتبع المرحلتين التاليتين:

- تحديد $X(\Omega)=\{x_1;x_2;x_3;...;x_n\}$: مجموعة القيم التي يأخذها المتغير X
- نحسب الاحتمال $p(X=x_i)$ لكل i من المجموعة $\{1;2;...;n\}$

الأمل الرياضي- المغايرة- الانحراف الطرازي لمتغير عشوائي:

ليكن X متغيرا عشوائيا قانونه معرف بالجدول التالي:

x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_n
$p(X=x_i)$	p_1	p_2	p_3	...	p_n

تعاريف:

الأمل الرياضي للمتغير X	$E(X)=x_1\times p_1+x_2\times p_2+x_3\times p_3+...+x_n\times p_n$
المغايرة للمتغير X	$V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$
الانحراف الطرازي للمتغير X	$\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$

القانون الجدائي:

ليكن p احتمال حدث A في تجربة عشوائية

نعيد هذه التجربة n مرة

المتغير العشوائي X الذي يربط كل نتيجة بعدد المرات التي يتحقق فيها الحدث A يسمى توزيعا جدائيا وسيطاه n و p

ولدينا: $\forall k\in\{0;1;2;...;n\}\quad p(X=k)=C_n^k\times p^k\times(1-p)^{n-k}$

و $E(X)=n\times p$

و $V(X)=np(1-p)$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

دالة الجذر من الرتبة n $\left(n\in\mathbb{N}^*\right)$
القوى الجذرية

خاصية وتعريف:

الدالة : $x\mapsto x^n$ المعرفة على $\mathbb{R}^+$ تقبل دالة عكسية تسمى دالة الجذر من الرتبة n

ويرمز لها بالرمز: $\sqrt[n]{\ }$

$$\sqrt[n]{\ }:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$$
$$x\mapsto\sqrt[n]{x}$$

$$\forall(x;y)\in\mathbb{R}_+^2 \qquad \sqrt[n]{x}=y\Leftrightarrow x=y^n$$

حالات خاصة:

- $\sqrt{x}=\sqrt[2]{x}$
- العدد: $\sqrt[3]{x}$ يسمى الجذر المكعب لـ x

خاصيات:

$$\forall(x;y)\in\mathbb{R}_+^2 \qquad \forall n\in\mathbb{N}^*$$
$$\sqrt[n]{x^n}=x$$
$$\left(\sqrt[n]{x}\right)^n=x$$
$$\sqrt[n]{x}=\sqrt[n]{y}\Leftrightarrow x=y$$
$$\sqrt[n]{x}>\sqrt[n]{y}\Leftrightarrow x>y$$

$$\forall(x;y)\in\mathbb{R}_+^2 \qquad \forall(m;n)\in\left(\mathbb{N}^*\right)^2$$
$$\sqrt[n]{x}\times\sqrt[n]{y}=\sqrt[n]{x\times y}$$
$$\left(\sqrt[n]{x}\right)^m=\sqrt[n]{x^m}$$
$$\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}=\sqrt[n]{\frac{x}{y}} \qquad (y\neq 0)$$
$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}}=\sqrt[n\times m]{x}$$

ملاحظة هامة:

$$\sqrt{x}-\sqrt{y}=\frac{x-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$$

$$\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}=\frac{x-y}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y}+\sqrt[3]{y^2}}$$

مجموعة التعريف:

الدالة f معرفة كما يلي:	مجموعة تعريفها:
$f(x)=\sqrt[n]{x}$	$D_f=[0;+\infty[$
$f(x)=\sqrt[n]{u(x)}$	$D_f=\{x\in\mathbb{R}/x\in D_u \text{ و } u(x)\geq 0\}$

النهايات:

$\lim\limits_{x\to x_0} u(x)$	$\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[n]{u(x)}$
$\ell\geq 0$	$\sqrt[n]{\ell}$
$+\infty$	$+\infty$

هذه النهايات تبقى صالحة عند x_0 على اليمين أو عند x_0 على اليسار أو عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الاتصال:

الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ متصلة على $\mathbb{R}^+$
إذا كانت u دالة موجبة و متصلة على مجال I فإن الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ متصلة على المجال I

الاشتقاق:

الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ قابلة للاشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ ولدينا: $\forall x \in]0;+\infty[\quad \left(\sqrt[n]{x}\right)' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$
إذا كانت u دالة موجبة قطعا و قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ قابلة للاشتقاق على المجال I ولدينا: $\forall x \in I \quad \left(\sqrt[n]{u(x)}\right)' = \frac{u'(x)}{n\sqrt[n]{[u(x)]^{n-1}}}$

حل المعادلة: $x^n = a \quad x \in \mathbb{R} \quad (a \in \mathbb{R})$

	n عدد فردي	n عدد زوجي
$a > 0$	$S = \left\{\sqrt[n]{a}\right\}$	$S = \left\{-\sqrt[n]{a};\sqrt[n]{a}\right\}$
$a = 0$	$S = \{0\}$	$S = \{0\}$
$a < 0$	$S = \left\{-\sqrt[n]{-a}\right\}$	$S = \varnothing$

القوى الجذرية لعدد حقيقي موجب قطعا:

ليكن $r = \frac{p}{q}$ عددا جذريا غير منعدم حيث: $p \in \mathbb{Z}^*$ و $q \in \mathbb{N}^*$

$\forall x \in]0,+\infty[\quad x^r = x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$

ملاحظات:

- $\forall x \in]0;+\infty[\quad \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$
- مجموعة تعريف دالة عددية f لمتغير حقيقي x معرفة كما يلي: $f(x) = [u(x)]^r \quad (r \in \mathbb{Q}^*)$ هي: $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u \text{ و } u(x) > 0\}$
- $\left(\sqrt[n]{u(x)}\right)' = \left((u(x))^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n} \times u'(x) \times [u(x)]^{\frac{1}{n}-1}$

لكل عنصرين x و y من $\mathbb{R}_+^*$ ولكل عنصرين r و r' من $\mathbb{Q}^*$

$\left(x^r\right)^{r'} = x^{r \times r'} \qquad x^r \times x^{r'} = x^{r+r'}$

$\left(\frac{x}{y}\right)^r = \frac{x^r}{y^r} \qquad (x \times y)^r = x^r \times y^r$

$\frac{1}{x^{r'}} = x^{-r'} \qquad \left(\frac{x^r}{y^{r'}}\right) = x^{r-r'}$

المتتاليات العددية

المتتالية الحسابية – المتتالية الهندسية

	لمتتالية حسابية	لمتتالية هندسية
تعريف	$u_{n+1}=u_n+r$ r هو الأساس	$u_{n+1}=q\times u_n$ q هو الأساس
الحد العام	$u_n=u_p+(n-p)r$ $(p\le n)$	$u_n=u_p\times q^{n-p}$ $(p\le n)$
مجموع حدود متتابعة	$u_p+\ldots+u_n=(n-p+1)\times\left(\frac{u_p+u_n}{2}\right)$	$u_p+\ldots+u_n=u_p\times\left(\frac{q^{n-p+1}-1}{q-1}\right)$ $(q\neq 1)$
a و b و c ثلاثة حدود متتابعة	$2b=a+c$	$b^2=a\times c$

المتتالية المكبورة – المتتالية المصغورة:

لتكن $(u_n)_{n\in I}$ متتالية عددية

- $u_n\le M$ $\quad\Leftrightarrow\quad \forall n\in I$ $\quad (u_n)_{n\in I}$ مكبورة بالعدد M
- $u_n\ge m$ $\quad\Leftrightarrow\quad \forall n\in I$ $\quad (u_n)_{n\in I}$ مصغورة بالعدد m
- $(u_n)_{n\in I}$ مكبورة و مصغورة $\Leftrightarrow$ $(u_n)_{n\in I}$ محدودة

رتابة متتالية عددية:

لتكن $(u_n)_{n\in I}$ متتالية عددية

- $u_{n+1}\le u_n$ $\quad\Leftrightarrow\quad \forall n\in I$ $\quad (u_n)_{n\in I}$ تناقصية
- $u_{n+1}\ge u_n$ $\quad\Leftrightarrow\quad \forall n\in I$ $\quad (u_n)_{n\in I}$ تزايدية
- $u_{n+1}=u_n$ $\quad\Leftrightarrow\quad \forall n\in I$ $\quad (u_n)_{n\in I}$ ثابتة

ملاحظة:

لتكن $(u_n)_{n\in I}$ متتالية عددية حدها الأول: u_p

- إذا كانت $(u_n)_{n\in I}$ تناقصية فإن: $u_n\le u_p$ $\quad\forall n\in I$
- إذا كانت $(u_n)_{n\in I}$ تزايدية فإن: $u_n\ge u_p$ $\quad\forall n\in I$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

نهاية متتالية:

نهاية المتتالية (n^α) حيث: $\alpha \in \mathbb{Q}^*$:

$\alpha > 0$	$\alpha < 0$
$\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = +\infty$	$\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = 0$

نهاية المتتالية الهندسية (q^n) حيث: $q \in \mathbb{R}$:

$q > 1$	$q = 1$	$-1 < q < 1$	$q \le -1$
$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$	المتتالية (q^n) ليس لها نهاية

مصادیق التقارب:

- كل متتالية تزايدية و مكبورة هي متتالية متقاربة
- كل متتالية تناقصية و مصغورة هي متتالية متقاربة

$$\left.\begin{array}{l} v_n \le u_n \le w_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell \\ \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = \ell$$

$$\left.\begin{array}{l} |u_n - \ell| \le v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = \ell$$

$$\left.\begin{array}{l} u_n \le v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$$

$$\left.\begin{array}{l} u_n \ge v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$

متتالية من النوع $u_{n+1} = f(u_n)$:

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

حيث f دالة متصلة على مجال I بحيث $f(I) \subset I$ و a عنصرا من I

إذا كانت (u_n) متقاربة فإن نهايتها ℓ حل للمعادلة $f(x) = x$

najah213.com · نجاح 213

إشارة حدانية
إشارة و تعميل ثلاثية الحدود

إشارة الحدانية: $ax+b$ $(a\neq 0)$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax+b$	عكس إشارة a		إشارة a

إشارة و تعميل ثلاثية الحدود: ax^2+bx+c $(a\neq 0)$

نضع : $P(x)=ax^2+bx+c$

المميز	حل المعادلة: $x\in\mathbb{R}\quad P(x)=0$	إشارة $P(x)$	تعميل $P(x)$
$\Delta<0$	$S=\phi$	x | $-\infty$ ... $+\infty$; $P(x)$ | إشارة a	غير ممكن بواسطة حدانيتين
$\Delta=0$	$S=\left\{\frac{-b}{2a}\right\}$	x | $-\infty$ ... $\frac{-b}{2a}$ ... $+\infty$; $P(x)$ | إشارة a | إشارة a	$P(x)=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2$
$\Delta>0$	$S=\{x_1,x_2\}$ حيث: $x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$	x | $-\infty$ ... x_1 ... x_2 ... $+\infty$; $P(x)$ | إشارة a | عكس إشارة a | إشارة a	$P(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$

$\Delta=b^2-4ac$

إذا كان x_1 و x_2 حلي المعادلة: $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)\ x\in\mathbb{R}$

فإن: $x_1+x_2=\frac{-b}{a}$ و $x_1\times x_2=\frac{c}{a}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com