najah213.com · نجاح 213

ثانوية عبد الكريم هالي ـ قمـــار ـ
المستـوى : 3 علـــوم تجريبيـــة


تاريخ الإجراء : الثّلاثاء 14 ماي 2019
مـدّة الاختبـار : 4 ســاعات ونصف

اختبار بكالوريا تجريبية في مادة علوم الطّبيعة والحياة

على الطّـالب أن يختار أحد الموضوعين التّاليـن :

الموضوع الأوّل (عدد الصّفحات 3)

التّمـرين الأول (5 نقاط) : يتـمّ على مستوى الخليـة الحيّة في الظّروف الهوائية تحويل الطّـاقة الكيميـائية الكامنة في المـادّة العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال في مختلف النّشاطات ، تتمثّل في جزيئات الـ ATP .
نريد في هذا التّمرين التّعرف على بعض مرحل هذا التّحـول الطاقـوي .
تبيّن الوثيقة أدناه بعض المؤشّرات لمراحل هذا التّحول الطاقوي ، على مستوى عضيّة الميتـوكوندري .



1 ـ حـدّد الخـاصّية البنيـوية للميتـوكوندري ، وسـمّ المـراحل المشـار إليهـا بالحـروف (أ ، ب ، ج) وكـذا المـركبين (A) و (B) .

2 ـ اعتمادا على ما تبرزه الوثيقة ومعلوماتك ، وضّح طبيعة العلاقة بين المرحلة (ج) والمرحلتين (أ ، ب) ، ثمّ بيّـن مجمل التّفاعلات المميّزة للمرحلة (ج) برسم تخطيطي وظيفي .

التّمـرين الثاني (7 نقاط) : تلعب البروتينـات دورا هامّا في حياة خلايا الكائنات الحية ، حيث تسـاهم في حمـاية الجسم من العناصر الدّخيلة (اللاّذات) والّتي يمكنها الإخلال بالوظائف الحيوية وبالتّـالي الموت .

الجـزء الأول : لفهم آلية نقل الدّم بين الأفراد نجري الدّراسة التّـالية :
يقـدّم الشّكل (أ) من الوثيقة 1 نتائج معاملة عيّنات من الدّم لمجموعة من الأفراد ، باستعمال المصل أو كريـات دم حمراء معروفة الزّمرة ، أمّا الشّكل (ب) فيبيّن نتائج اختبارات وراثية لتحديد أليلات الذّات لنفس المجموعة من الأفراد .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الاختبارات	باستعمال المصل			باستعمال كريات الدّم الحمراء (ك د ح)	
الأفراد	ضد A	ضد B	ضد D	ك د ح A	ك د ح B
ب	–	–	+		
س			–	–	+
ع			–	+	+
ص	+	–	–		

الشّكل (أ)

ـ : عدم التراص ، + : تراص

رقم الأليلات في المورثة	الشّخص	أليلات الذّات		
		A	B	DR
	ب	1	7	1
		2	27	11
	س	1	7	1
		28	8	11
	ع	1	7	1
		12	27	11
	ص	9	3	21
		5	10	6

الشّكل (ب)


الوثيقة 1

1 ـ أكمل جدول الشّكل (أ) بعد نقله ، مبيّنا المعيار المستخدم للوصول إلى هذه النّتائج (+ ، ـ) .

2 ـ باستغلال نتـائج الشّكل (ب) حدّد الفرد المتطوّع الأنسب للشّخص (ب) ، مع التّعليل .

<u>الجـزء الثّـاني</u> : يستهدف فيـروس الالتهاب الكبـدي (ج) ، و الّذي يـرمز له بـ HCV خلايا الكبد ويـؤدي بعد سنـوات إلى تشمّعه مما يسبّب الفشل الكبدي أو سرطان الكبد ، وهو ما ينتهي عادة بنزيف دموي شديد ثمّ الموت .

نقتـرح الشّكليـن (أ) و (ب) من الوثيقـة 2 ، حيث الشّكل (أ) يمثّل رسما تخطيطيا لآلية الاصـابة بـ HCV بينما يمثّل الشّكل (ب) رسما تخطيطيا مكبّر لمنطقة التّمـاس بين الخلية الكبدية والفيروس .



رسم تخطيطي لمراحل الإصابة بفيروس HCV

الوثيقة 2

اعتماد على الوثيقة 2 ، وباستدلال علمي :

1 ـ بيّن طريقة إصابة الخلايا الكبديـة بـفيروس HCV .

2 ـ اشرح المراحل المؤدية إلى تخريب الخلايا الكبدية المصابة بـفيروس HCV .

<u>التّمـرين الثالث (8 نقاط)</u> : الإنـزيم وسيط ذو طبيعـة بروتينية اكتسب بنية فراغية ثلاثيـة الأبعـاد ، نتيجة للإنطواءات التي طرأت علية ، إضافة الى تشكّل روابط كيميائية مختلفة بين أحماض أمينية محـدّدة.

<u>الجـزء الأول</u> : كربوكسيبيتيـداز إنـزيم هضمي ، يحطّـم الرّوابط البيبتيـدية على مستـوى البـروتين . بعض الأشخاص يملكون إنـزيم طافر غير نشط ، لا يستطيع تحفيز التّفاعلات الكيميائية .

باستعمـال برنامج الـ Anagene أجريت مقارنة بين جزأين من السّلسلة البيبتيدية لكلّ من الإنـزيمين الطّبيـعي والطّافر ، كما سمـح برنـامج الـ Rastop بعرض شكل الموقـع الفعّال للإنزيم السّابق ، مع قياس المسافة بين الحمضين الأمينييـن رقم 69 ورقم 248 .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

النّتــائج التّجريبيــة ممثّلــة في الشّكلين (أ) و (ب) من الوثيقة 1 .


65 70 245 250

الإنزيم الطّافر : Ile Trp Ile Asp Leu Gly Ile Gly Ser Arg.....Ile Thr Thr Ile Gly Gln Ala Ser

الإنزيم الطّبيعي : _ _ _ _ _ _ _ His _ _ ..... _ _ _ _ Tyr _ _ _

الشّكل (أ)

الشّكل (ب)	المسافة بين الحمضين الأمينيين بالأنغستروم
وجود الإنزيم الطبيعي فقط .	Tyr 248 - His 69 15.19
الإنزيم الطبيعي + مادة التفاعل .	Tyr 248 - His 69 7.22
الإنزيم الطافر + مادة التفاعل .	Gly 248 - Gly 69 17.54



الوثيقة 1

1 ـ ما هي أهمية اكتساب الإنزيم لبنية فراغية خاصّة به ؟


2 ـ اعتمادا على الشّكل (ب) ، ناقش تأثير النّتائج الّتي يوضّحها الشّكل (أ) على نشاط الإنزيم.

<u>الجـزء الثّـاني</u> : لإثبات أهمية حمض أميني محدّد على مستوى الإنـزيم الهضمي أميلاز ، تمّ قيـاس سرعة النّشاط الإنزيمي لهذا الإنزيم ، والنّتـائج المحصل عليها مبيّنة في الشّكل (أ) من الوثيقة 2 .

الشّكـل (ب) من الوثيقة 2 يبيّن نمذجة لنشاط الموقع الفعّال لإنزيم الأميلاز ، أثناء حـدوث التّفـاعل .

موقــع الطّفـــرة	سرعة النّشاط الإنزيمي (وحدة اعتبارية)
إنـــزيم أميلاز طبيعي	1
إنـــزيم أميلاز طـافر (تغير الحمض الأميني Asp 197)	1 / 1200000
إنـــزيم أميلاز طـافر (تغير الحمض الأميني Thr 52)	1
إنـــزيم أميلاز طـافر (تغير الحمض الأميني Asp 300)	1 / 4900

الشّكل (أ)



الشّكل (ب)

الوثيقة 2

1 ـ سمّ العناصر المرقّمة من 1 إلى 4 في الشّكل (ب) من الوثيقة 2 .


2 ـ ما هي المعلومات التي يقدّمها لك الشّكل (أ) من الوثيقة 2 .

<u>الجـــزء الثّالث</u> : اعتمـادا على معلـوماتك المكتسبة حول بنية المـوقع الفعّال للإنزيم ، اشرح كيفيـة الانتقـال من الحالـة (أ) الى الحالـة (د) للشّكل (ب) من الوثيقة 2 .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


الموضـــــوع الثّــاني (عـدد الصّفحـات 3)

<u>التّمـرين الأول (5 نقاط)</u> : أكّدت نظـرية تكتونية الصّفائح بالاستناد على أدلة علميــة ان القشرة الأرضية تتكون من مجموعة صفائح ، تتحرك على مستوى الحدود الفاصلة بينها بفضل طاقة منبثقة من باطن الأرض .
تمثّل الوثيقــة أدناه تمثيلا تخطيطيا لجزء من القشــرة الأرضية ، تحدث على مستواه حركات للصّفائح ، حيث تمثّل تفاصيل المنطقتين المؤطّرتين دراستان تثبتان حدوث هذه الحركات .



1 ـ أكتب البيانات المرقّمة ، ثمّ صنّف الحركات التّكتـونية المدروسة ، مبرزا الدّليل على ذلك من معطيات الوثيقة .
2 ـ أكتب نصا علميا تبيّن فيه أن الطّـاقة المتسرّبة من باطن الأرض تسمح بتغيير ملامح الكرة الأرضيــة ، دون أن يتغيّــر حجمهــا .

<u>التّمـرين الثاني (7 نقاط)</u> : تقوم الخلايا اليخضورية بتحـويل الطّاقة الضّوئية إلى طاقة كيميــائية كامنة في المادّة العضوية ، اعتمادا على آليات تتضمّن جملة من التّفاعلات تتطلب وجود الضّوء وغاز CO_2 .
<u>الجـزء الأول</u> : وُضع طحلب أخضر وحيــد الخلية (الكلوريلا) في وعاء شفّاف ضمن محلــول غني بـ CO_2 في شروط ثابتة من الحرارة والإضاءة كما هو موضّح في الشّكل (أ) من الوثيقة 1 . يحقن معلق الطّحلب بـ $^{14}CO_2$ المشع على فترات زمنية متتالية ، ثم ينجز الفصل الكروماتوغرافي ذو البعدين متبوعا بالتّصوير الإشعـاعي الذاتي لمستخلص الطّحلب . النّتــائج المحصّل عليها ممثّلة في الشّكل (ب) من الوثيقة 1 .



الوثيقة 1

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

1ـ مستعينا بمعلوماتك ومعطيات الوثيقة 1 ، علّل البــروتوكول التّجــريبي .


2 ـ بيّن بأن دراسة معطيــات الشّكل (ب) من الوثيقــة 1 تسمح لك باستخـراج معلــومة أســاسية حول التّسلسل الزّمني لتشكّل مختلف المواد العضوية ، ثمّ اقترح فرضيات لتفسير مصدر حمض الفوسفو غليسيريك (APG) .

<u>الجـزء الثّـاني</u> : للتّحقق من صحة أحدى الفرضيات ، تمّ انجاز التّجربتين التّاليتين على طحلب الكلوريلا .


التّجــربة 1 : أجريت في وجود الضّوء ووجود $^{14}CO_2$ المشع ، ثمّ في غيابه .

التّجــربة 2 : أجريت في وجود $^{14}CO_2$ المشع ووجود الضّوء ، ثمّ في غيابه .

قياس إشعاع الجزيئات العضوي المركبة مكّن من الحصول على الشّكلين (1) و (2) من الوثيقــة 2 .



الشكل (1)



الشكل (2)

الوثيقة 2


1 ـ بيّن أن التّحليل المقــارن لنتــائج التّجــربتين (1) و (2) يسمــح لك بالتّحقق من صحة إحــدى الفرضيــات المقترحة سابقا ، حول مصدر حمض الفوسفوغليسريك . دعّم إجــابتك بمخطط بسيط .

2 ـ عبّــر عن مرحلتي الظّاهرة المدروسة بمعادلتين كيميائيتين ، ثمّ اقترح رسما تخطيطيا لإبراز العلاقة بينهما .


<u>التّمــرين الثالث (8 نقاط)</u> : لتحديــد دور البروتينات الغشائية في حدوث بعض الآليــات الخاصة بالاتّصال العصبي نقترح الدّراسة التّــالية .

<u>الجــزء الأول</u> : يمثّــل الشّكل (أ) من الوثيقــة 1 اتصــال للعصبونيــن N_1 و N_2 بالعصبــون N_3 ، حيث سمــح التّنبيه الفعّال لأحد العصبونين بتسجيل كمون عمل على مستوى المنطقة SI من العصبون N_3 ، بينما التّنبيه الفعّال للعصبونين N_1 و N_2 في آن واحد فقد مكّن من تسجيل كمون راحة في مستوى المنطقة SI من العصبون N_3 .

تمّ عــزل قطع من الغشاءين (س) و (ع) للعصبون N_3 باستعمال تقنية Patch - Clamp ، ثمّ وضعت القطــع في ظروف تجريبية متماثلة ، مع حقن كمية من الأستيل كولين . قياس التّيارات الكهربائية باستخدام القطع الغشائية (س) و (ع) مكّن من الحصول على الشّكلين (ب) و (ج) على التّــرتيب .


الشكل (ا)


الشكل (ج)



الشكل (ب)

الوثيقة 1

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

1 ـ أدرس النّتائج المسجّلة في الشّكلين (ب) و (ج) .

2 ـ قدّم فرضيـة تسمـح بتفسيـر النّتـائج التّجـريبية المتحصّل عليهـا ، على مستـوى العصبون N_3 بعـد تنبيـه العصبــونين N_1 و N_2 .


<u>الجـزء الثّـاني</u> : تعزل بروتينات الغشـاءين (س) و (ع) ، ونحقّق على كل منهما المراحل التّجريبية التّـالية :

المرحلة 1 : نفصل بروتينات الغشاء بتقنية التّسجيل الكروماتوغرافي على الورق .

المرحلة 2 : تعالج أوراق الفصل الكروماتوغرافي بثلاث سوائل تحتوي على مبلّغات كيميائية مختلفة .

المرحلة 3 : تمثّل النّتيجة بعد التّخلص من البروتينات ، الّتي لم ترتبط بالمبلّغات العصبية .

المراحل والنّتـائج المحصل عليها بالنّسبة للغشاءين (س) و (ع) مبيّنة في الوثيقة 2 .



أستيل كولين : Ach ، أسبارتات : Asp ، غاما أمينو بوتيريك : GABA

الوثيقة 2

1 ـ بيّن كيف تسمح لك نتائج الوثيقة 2 بالتّأكد من صحّة الفرضية المقدّمة .

ـ نطبّق في E_1 تنبيها فعّـالا ونسجّل الكمون الغشائي على مستوى جهاز الأسيلوسكوب O_1 ، فيسجّل هذا الجهـاز انتقـال للرّســالة العصبية .

2 ـ مثّل بيانيا الظّــاهرة الكهربائية المسجّلــة في O_1 .

3 ـ اشرح آلية انتقال الرّسالة العصبية في المنطقة D ، إثر احداث تنبيه فعّال في E_1 .

<u>الجـزء الثّـالث</u> : على ضوء المعلــومات المتوصّل إليها ومكتسباتك ، ضع جدولا تبيّن فيه أنواع ودور البروتينات المتدخّلة في نشأة الرّسالــة العصبية وانتقــالها .

إذا لم تخطّط لأهدافك ، ليس من حقّك أن تندم على عدم تحقيقها

.أستاذا المادة : شّفاح وسقني يتمنيان لكم النّجاح في شهادة البكالوريا .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الحل النموذجي لامتحان البكالوريا التجريبية - 2019 -

المـــــوضوع الأوّل

التّمــرين الأول (5 نقاط) :


1 - * الخاصية البنيوية للميتوكوندري : الميتوكوندري ذات بنية حجيرية ، لوجود الفراغ بين الغشاءين والحشوة **0.5**

*** تسمية المـــراحل :**


المرحلة (أ) : الخطوة التحضيرية ، **المرحلة (ب) :** حلقة كريبس ، **المرحلة (ج) :** الفسفرة التأكسدية ..... **0.25 × 3**

*** تسمية المركبين : المركب A :** حمض البيروفيك ، **المركب B :** أستيل مرافق الأنزيم (أ) .....**0.25 × 2**

2 - * توضيح طبيعة العلاقة : توجد علاقة (تكامل) ازدواجية بين تفاعلات الفسفرة التأكسدية والخطوة التحضيرية وحلقة كريبس ، حيث نواتج الخطوة التحضيرية وحلقة كريبس ($FADH_2 + NADH.H^+$) هي شروط للفسفرة التأكسدية ، ونواتج هذه الأخيرة ($FAD + NAD^+$) هي شروط للخطوة التحضيرية وحلقة كريبس **1.25**



*** رسم تخطيطي وظيفي لتفاعلات الفسفرة التأكسدية :** **2**



التّمــرين الثانى (7 نقاط) :

الجـزء الأول :

1 - * إكمـــال جدول الشّكـل (أ) : .....**0.25 × 8**

الاختبارات	باستعمال المصل			باستعمال كريات الدّم الحمراء (ك د ح)	
الأفراد	ضد A	ضد B	ضد D	ك د ح A	ك د ح B
ب	–	–	+	⊕	⊕
س	⊕	⊖	–	–	+
ع	⊖	⊖	–	+	+
ص	+	–	–	⊖	⊕

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

*** تبيين المعيار المستخدم للوصول إلى النّتائج :**

- يؤدي التّكامل البنيوي بين مؤشر الزّمرة الدموية وموقع تثبيت الجسم المضاد إلى حدوث ارتصاص **0.25**

- بتطبيق هذا المعيار على جميع الأفراد نجد ما يلي :

*** الفرد (ب) :** الزمرة الدموية هي O^+ ، فالغشاء الهيولي للكريات الحمراء لا يحمل المؤشرين A و B ويحمل المستضد D وتحتوي البلازما على ضد A + B **0.5**

- **الفردين (س + ص) :** الزمرة الدموية هي A^- ، فالغشاء الهيولي للكريات الحمراء يحمل المؤشر A و لا يحمل المؤشرين B و D ، وتحتوي البلازما على ضد B فقط **0.5**

- **الفـرد (ع) :** الزّمـرة الدّمـوية هي O^- ، فالغشـاء الهيولي للكريات الحمراء لا يحمل المؤشرات A ، B و D وتحتوي البلازما على ضد A + B **0.5**

2 ـ تحديد الفرد المتطوع ، مع التّعليل : بمقارنة أليلات الفرد (ب) مع بقية الأفراد نجد أن الفـرد (ع) جميع أليلاته مماثلة للفرد (ب) ما عدى أليل واحد فقط ، وعليه فالفرد (ع) هو أنسب متطوع للفرد (ب) **0.5**

الجـزء الثّـاني :

1 ـ تبيين طريقة الإصـابة : يؤدي التكـامل البنيوي بين البروتينات الغشائية لخلية الكبد وتلك الموجودة على محفظة الفيروس إلى دخول الفيروس الى الخلية و إصابتها **0.25**

2 ـ شرح المراحل المؤدية إلى تخريب الخلايا الكبدية المصابة :

- تتعـرف البلاعم على الخلايا الكبديـة المصابة ، بعرضهـا لمعقـد ببتيد **HCV** مثبت على **HLA1** ، ثمّ تنتقل إلى أقـرب عقدة لمفاوية **0.25**

- تعرض البلاعم ببتيد **HCV** مثبت على **HLA1** و **HLA2** ، كما تفرز **IL1** **0.25**

- تحت تأثير **IL1** يحدث ما يلي : .....**0.5 × 2**

* تنجذب نسائل **LT4** ، فتنتقاء إحداها بالتعرف المزدوج على ببتيد **HCV** المثبت على **HLA2** ، ثم تشكل مستقبلات **IL2** وتحفـز ذاتيا على إفراز **IL2** ، الذي ينشطها على التكاثر والتمايز إلى **LTh** مفرزة لـ **IL2** .

* تنجذب نسائل **LT8** ، فتنتقاء إحداهـا بالتعـرف المـزدوج على ببتيـد **HCV** المثبت على **HLA1** ، كما تتعرف **LT8**

- بتحفيز من **IL2** تتكاثر **LT8** المحسسة وتتمايز إلى **LTC** **0.25**

- تتعرف الخلايا **LTC** على الخلايا الكبدية تعرفا مزدوجا ، فتفرز البرفورين والغرانزيم **0.25**

- يتثبت البرفورين على غشاء الخلية الكبدية المصابة مشكلا ثقوب تسمح بنفاذ الغرانزيم ، الماء والشوارد إلى هيولى الخلايا الكبدية فيتخرب محتواها وتنفجر بالصدمة الحلولية **0.5**

التّمـرين الثالث (8 نقاط) :

الجـزء الأول :

1 ـ أهمية اكتساب الإنزيم لبنية فراغية : البنية الفراغية تسمح بتقارب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية فيكتسب الإنزيم موقعا فعالا ، يكسبه تخصصا وظيفيا تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل **0.5**

2 ـ مناقشة تأثير النتائج :

- **الشّكل (أ) :** يوجـد فرق بين الإنـزيم الطبيعي والإنـزيم الطافر ، حيث استبدل الحمضين الأمينيين His 69 و Tys 248 بالحمضين الأمينيين Gly 69 و Gly 248 على الترتيب. **0.5**

- **الشّكل (ب) :**

* **في حالة الإنزيم الطّبيعي :** في غياب مادة التفاعل يكون الحمضين الأمينيين His 69 و Tys 248 متباعدين ، ويتقاربا في وجود مادة التفاعل لتشكل المعقد ES **0.5**

* **في حالة الإنزيم الطّافر :** في وجود مادة التفاعل يكون الحمضين الأمينيين Gly 69 و Gly 248 متباعدين ، فلا يتشكـل المعقـد ES **0.5**

- في حالة الإنـزيم الطبيعي يتم التكامل بالتحفيز ، وهذا ما يسمح للمجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل بالتموضع في المكان المناسب لحدوث نشاط إنزيمي (تثبيت الركيزة وتحفيز التفاعل). **0.75**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

ـ في حالة الإنزيم الطافر أدى استبدال بعض الأحماض الأمينية إلى عدم القدرة على احداث التكامل بالتحفيز ، وعليه فالنشاط الإنزيمي مرتبط بالموقع الفعال ، وطبيعة الأحماض الأمينية المكونة له **0.75**

الجـزء الثّـانـي :

1 ـ تسمية العناصر المرقمة : ..... **0.25 × 4**

1 + 1َ- إنزيم ، **2 ـ** الركيزة ، **3 ـ** موقع فعال ، **4 ـ** ناتج التفاعل .

2 ـ المعلومة التي يقدمها الشكل (أ) : ..... **0.5 × 4**

ـ السرعة الأعظمية لنشاط إنزيم الأميلاز تساوي 1 (و . إ) .

ـ في حالة استبدال الحمض الأميني Asp 197 ينعدم النشاط الإنزيمي ، فهذا الحمض الأميني تابع للموقع الفعال.

ـ في حالة استبدال الحمض الأميني Thr 52 يكون النشاط الإنزيمي أعظمي ، فهذا الحمض الأميني يقع خارج الموقع الفعال .

ـ في حالة استبدال الحمض الأميني Asp300 يكون النشاط الإنزيمي ضعيف ، فهذا الحمض الأميني ينتمي إلى الموقع

الجـزء الثّـالث:

ـ شـرح كيفية الانتقـال من الحالة (أ) إلى الحالة (د) :

*** الحـــــالة (أ) :** في غياب الركيزة (مادة التفاعل) يكون شكل الموقع الفعال غير متكامل بنيويا معها ، فأحماضه الأمينية متباعدة عن بعضها. **0.25**

*** من الحالـــة (ب) إلى الحالـــة (ج) :** في وجود الركيزة تغير الشّكل الفراغي للموقع الفعال ، فأصبح متكاملا معها بسبب تقارب الأحماض الأمينية نحو الركيزة **0.5**

تتشكل روابط انتقالية (ضعيفة) بين جزء من الرّكيزة والموقع الفعّال ، فينتج المعقد التحفيزي ES **0.25**

*** من الحالة (ج) إلى الحالة (د) :** يتمّ تحفيز تفاعل الإماهة ، فتتفكك الركيـزة إلى نواتج (P_1 ، P_2) تتحرر من الموقـع الفعال لإنزيم **0.5**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضـــوع الثّـــاني

التّمــرين الأول (5 نقاط) :

1 ـ * كتابة البيانات المرقمة : ..... **0.25 × 7**

1 ـ قشرة محيطية ، **2 ـ** قشرة قاريـة ، **3 ـ** ظهرة وسط محيطية ، **4 ـ** خندق محيطي ، **5 ـ** سلسلـة جبلية قارية ، **6 ـ** تيـارات الحمل ، **7 ـ** فالق تحويلي .

*** تصنيف الحركات التكتونية ، مع الدليل :**

ـ حركة التباعد بين الصفيحتين المحيطيتين 1 و 1َ **0.25**

الدّليل : تناوب مغنطة أشرطة البازلت بشكل تناظري ، على جانبي الظهرة الفاصلة بين الصفيحيتين 1 و 1َ **0.5**

ـ حركة تقارب بين الصفيحة المحيطية 1 والصفيحة القارية 2 . ..... **0.25**

الدّليل : غوص الصّفيحـة المحيطية 1 تحت الصفيحة القارية ، فيتشكـل خندق محيطي بينهما وتهـدم الصفيحـة الغائصة في العمق ، مما يتسبب في حدوث زلازل يزداد عمق بؤرها كلما اتجهنا نحـو القـارة حسب ما يظهره مستوى بينيوف **0.5**

2 ـ نص علمي يبين دور الطاقة المتسربة في تغيير ملامح الكرة الأرضية دون أن تغير حجمها :

المقدمـــــة : **0.25**

أكدت نظرية تكتونية الصّفـــائح بأن القشرة الأرضية تتكون من عدة صفائح دائمة الحـركة ، وأن تضاريس القشرة الأرضية متغيرة عبر الزمن الجيولوجي بسبب الطّاقة الداخلية المتسربة ، ومع ذلك فإن حجم الأرض بقي ثابت .

ـ ما هو دور الطاقة المتسربة في تغيير تضاريس القشرة الأرضية ، وكيف يتحقق ثبات حجم الكرة الأرضية ؟

العـرض :

ـ تؤدي الطـاقة المتسربة من باطن الأرض نحو السّطح بشكل تيارات حمل صاعدة وساخنة إلى اندفاع الماغمـا على مستوى منطقة الخسف ، وينتج عن تبردها قشرة محيطية جديدة وتشكل ظهرة وسط محيطية **0.5**

ـ باستمرار اندفاع الماغما يستمر توسع المحيط ، فتصبح القشرة المحيطية البعيدة عن محور الظهرة أكثر كثافة **0.25**

ـ في الحدود المقابلة لمنطقة التباعد تتقارب صفيحة محيطية مع أخرى قارية حتى تصطدم معها **0.25**

ـ الصفيحة المحيطيـة ذات الكثافة العالية نتيجة انخفاض درجة الحرارة ، تغوص في شكل تيـارات حمل بـــاردة ونـازلة تحت الصفيحة القارية ، وتذوب في العمق (تتهدم) بسبب ارتفاع درجة الحرارة **0.25**

الخاتمة : الطاقة المتسربة على شكل تيارات حمل تحرك الصفائح ، حيث كل حركة تباعد تؤدي إلى بناء قشرة محيطية جديدة وتشكل ظهرة وسط محيطية ، يقابلها حركة تقارب تؤدي إلى هدم القشرة المحيطية القديمة وتشكل خندق محيطي ، موشور الترسيب وسلاسل جبلية حديثة ، وبذلك تكون الطاقة المتسربة قد غيرت شكل القشرة الأرضية دون تغير حجمها **0.25**

التّمــرين الثّـــاني (7 نقاط) :

الجـزء الأول :

1 ـ تعليل البروتوكول التجريبي :

ـ يسمح CO_2 المشع بتتبع نواتج تثبيته ، والمركبات الناتجة عن ذلك **0.25**

ـ الهدف من تمرير مستخلص الكلوريلا في الميثانول المغلى هو توقيف التفاعلات الحيوية ، واستخلاص المكونات وذلك بقتل الكلوريلا بعد فترات زمنية محددة **0.25**

ـ التّسجيل الكروماتوغرافي ذو البعدين ، والمتبوع بالتصوير الاشعاعي الذاتي يسمح بفصل النواتج والتّعرف عليها **0.25**

2 ـ * دراسة معطيات الشكل (ب) من الوثيقة 1 :

ـ بعد 2 ثانية : ظهر APG مشع بكمية كبيرة و TP بكمية قليلة **0.25**

ـ بعد 5 ثانية : ظهر HP مشع وتناقصت كمية الاشعاع في APG وازدادت في الـ TP **0.25**

ـ بعد 15 ثانية : ظهر RDP مشع وزادت كمية الاشعاع في HP ، كما تناقصت الكمية في APG والـ TP **0.25**

إذا : انطلاقا من CO_2 تشكلت عدة مركبات حسب التسلسل التالي : APG ⟶ TP ⟶ HP ⟶ RDP **0.25**

*** الفرضيات المقترحة لتفسير مصدر الـ APG :**


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

1 - ينتج الـ APG من تكاثف 3 جزيئات من CO_2 . ..... **0.25**
2 - ينتج الـ APG من تفاعل CO_2 مع مركب ثنائي الكربون (C_2). **0.25**
3 - ينتج الـ APG من تفاعل CO_2 مع مركب (C_5) ، فينتج مركب (C_6) ينشطر إلى جزيئتين من الـ APG **0.25**

الجـزء الثّـاني :

1 - * التحليل المقارن لنتائج التجربتين :

- التّجربة 1 : تمثل المنحنيات دور CO_2 في تغير تراكيز الـ APG والـ Rudip **0.25**
*** في وجود CO_2 والضوء :** تركيز APG والـ Rudip ثابت ، مما يدل على تركيبهما وتحولهما بنفس الكمية **0.25**
*** في وجود الضوء وغياب CO_2 :** ارتفـع تركيز Rudip وتناقص تركيز APG ، مما يدل على استمرار تركيب Rudip دون تحويله والعكس بالنسبة للـ APG **0.25**
- التّجربة 2 : تمثل المنحنيات دور الضوء في تغير تراكيز الـ APG والـ Rudip **0.25**
*** في وجود CO_2 والضوء :** تركيز APG والـ Rudip ثابت ، أما تركيز الهكسوزات فهو يزداد **0.25**
*** في وجود CO_2 وغياب الضوء :** ارتفـع تركيز APG وتناقص تركيز Rudip ، مما يدل على استمـرار تركيب APG دون تحويله والعكس بالنسبة للـ Rudip . أما الهكسوزات فيستمر تزايد تركيزها ثم يثبت **0.25**
إذن : الـ APG والـ Rudip يتحولان إلى بعضهما ضمن حلقة تنتج عنها هكسوزات ، وتتم في وجود CO_2 والضوء ، حيث Rudip يتحول إلى APG بعد تثبيته لـ CO_2 والـ APG يجدد Rudip باستعمال نواتج المرحلة الكيموضوئية **0.25**
وعليه فالفرضية 3 المقترحة في الجواب 1 من الجزء الأول هي الصحيحة **0.25**
*** مخطط يوضع العلاقة بين الـ APG والـ Rudip :** **0.5**




2 - * المعادلتين الخاصتين بمرحلتي التركيب الضوئي : ..... **2 × 0.5**
- معـــادلة المرحلة الكيموضوئيـــة :

$$12\,H_2O + 12\,NADP^+ + 18\,ADP + 18\,Pi \xrightarrow{\text{ضوء - كبيسات}} 12NADPH.H^+ + 18\,ATP + 6\,O_2$$

- معـــــادلة المرحلة الكيموحيويـــة :

$$6\,CO_2 + 12\,NADPH.H^+ + 18\,ATP \xrightarrow{\text{حشوة}} C_6H_{12}O_6 + 12\,NADP^+ + 18\,ADP + 18\,Pi + 6\,H_2O$$

*** رسم تخطيطي يبرز العلاقة بين مرحلتي التركيب الضوئي :** **1**



- كتابة البيانات المرقمة :

1 - $NADP^+$. **2 -** $NADPH.H^+$.
3 - PGal . **4 -** RuDP .
5 - غلوكوز **6 -** CO_2 .
7 - ADP + Pi **8 -** ATP .
9 - الحشوة **10 -** تجويف الكبيس .
11 - مرحلة كيموضوئية **12 -** مرحلة كيموحيوية
13 - PS_2 **14 -** نواقل الإلكترونات .
15 - غشاء الكبيس **16 -** PS_1 .
17 - كرية مذنبة . **18 -** APG .
19 - ADPG .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التّمـرين الثالث (8 نقاط) :

الجـزء الأول :

1 ـ دراسة النتائج المسجلة في الشّكلين (ب) و (ج) :

ـ الشّكل (ب) : اثر حقن 2 ميكرومول من الأستيل كولين في وجود الغشاء (س) ، المنتمي إلى المشبك S_1 سُجلت نبضات لتيار أيوني داخلي بنفس السّعة ، سببها ميز شواد Na^+ بعد انفتاح القنوات الكيميائية الخاصة بها **0.5**

ـ الشّكل (ج) : اثر حقن 2 ميكرومول من الأستيل كولين في وجود الغشاء (ع) ، المنتمي إلى المشبك S_2 لم تسجل نبضات لتيار أيوني ، نتيجة لعدم انفتاح القنوات الكيميائية التي تسمح بميز شواد Na^+ **0.5**

ومنه فالمستقبلات القنوية للمشبك S_1 مبلغها هو الأستيل كولين ، أما المشبك S_2 فله مبلغ آخر **0.5**

2 ـ تقديـــم الفرضيـــة : المشبك S_1 منبه ، أما المشبك S_2 فهو مثبط . التنبيه المتزامن للعصبونين N_1 و N_2 نتج عنه تجميع فضائي لـ PPSE و PPSI ، فكانت المحصلة في SI أقل من عتبة زوال الاستقطاب فسجل كمون راحة **1**

الجـزء الثّـاني :


1 ـ تبيان صحّة الفرضيـــة السابقة :

ـ يدخل في بناء الغشاء (س) بروتينات نوعية (مستقبلات قنوية) ، ارتبط بها المبلغ الأستيل كولين على مستوى المشبك S_1 وبالتالي فإن تنبيه العصبون N_1 ينتج عنه تسجيل PPSE على مستوى العصبون N_3 ..... **0.5**

ـ يدخل في بناء الغشاء (ع) بروتينات ، ارتبط بها المبلغ GABA على مستوى المشبك S_2 وبالتالي فإن تنبيه العصبون N_2 ينتج عنه تسجيل PPSI على مستوى العصبون N_3 ..... **0.5**

ـ الـ PPSI الناتج عن نشاط المشبك التثبيطي قلل من سعة PPSE عند حدوث التجميع الفضائي ، بسبب التنبيه المتزامن لكل من العصبونين N_1 و N_2 فسجل كمون راحة على مستوى العصبون N_3 ، وعليه فالفرضية صحيحة **1**

2 ـ التمثيل البياني للظاهرة الكهربائية المسجل في O_1 : **0.5**



3 ـ شرح آلية انتقال الرسالة العصبية في المنطقة D : **0.5**

ـ المنطقة D تمثل جزء من المحور الاسطواني للعصبون بعد مشبكي (N_3) .

ـ يتولد في SI للعصبون بعد مشبكي PPSE سعته تصل أو تفوق العتبة ، بسبب الميز الداخلي لـ Na^+ عبر القنوات الكيميائية.

ـ تحتوي المنطقة D على قنوات فولطية خاصة بـ Na^+ و K^+ ، والتي تتنبه تباعا مولدة تواتر كمون عمل أي رسالة عصبية وانتشارها من نقطة إلى أخرى .

الجـزء الثّـالث: جدول يبيّن أنواع ودور البروتينات المتدخّلة في نشأة الرّسالة العصبية وانتقالها . ..... **0.5 × 5**

نوع البـــروتين	الـــدّور
قنوات تسرب Na^+ و K^+	مصدر كمون الراحة ، الذي يكسب الغشاء خاصية التنبه
مضخة Na^+ / K^+	المحافظة على ثبات قيمة كمون الراحة
قنوات Na^+ الكيميائية	مصدر PPSE ، الذي ينبه للقنوات الفولطية Na^+ في SI
القنوات الفولطية لـ Na^+	مصدر زوال الاستقطاب في SI ، وانتشاره على طول المحور الاسطواني
القنوات الفولطية لـ K^+	مسؤولة على عودة الاستقطاب والاستقطاب المفرط

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com