najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: **2017**

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة الطرائق) — المدة: **04 سا و30د**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

I- 1) مركب عضوي (X) صيغته العامة من الشكل: $C_nH_{2n}O_2$ عند إحراق 0,70 g منه أعطى 1,25 g من ثاني أكسيد الكربون CO_2 .

أ) اكتب معادلة تفاعل الاحتراق التام للمركب (X) بدلالة n.

ب) جد الصيغة المجملة للمركب (X) .

جـ) عيّن الصيغ نصف المفصلة الممكنة لهذا المركب.

يعطى:

$H = 1\ g/mol$ ، $C = 12\ g/mol$ ، $O = 16\ g/mol$

2) لمعرفة صيغة المركب (X) نجري سلسلة التفاعلات الأتية:

1) $C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{Pd} A$

2) $A + O_3 \longrightarrow B$

3) $B + H_2O \longrightarrow 2C + H_2O_2$

4) $C + CH_3\text{-}MgCl \longrightarrow D$

5) $D + H_2O \longrightarrow E + MgCl(OH)$

6) $E \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} F$

7) $F + CH_3\text{-}OH \underset{}{\overset{H_2SO_4}{\rightleftharpoons}} X + H_2O$

– اكتب الصيغ نصف المفصلة للمركبات: (A) ، (B) ، (C) ، (D) ، (E) ، (F) ، (X) .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

II- الدراسة الحركية لتفاعل تفكك المركب N_2O_5 إلى NO_2 و O_2 أثبتت أنّه تفاعل من الرتبة الأولى.

إذا علمت أنّ التركيز الابتدائي: $[N_2O_5]_0 = 0,1mol/L$، وثابت السرعة: $k = 5\times10^{-3}\ min^{-1}$

1) اكتب معادلة التفاعل الحادث.

2) احسب زمن نصف التفاعل $(t_{1/2})$.

3) احسب سرعة التفاعل (V) بعد مرور زمن قدره ساعة واحدة.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

I- لتحديد قرينة الحموضة (I_a) لزيت الزيتون استخدمنا:

المواد	الأدوات
– كحول إيثيلي (95°) – محلول البوتاس KOH (0,1 mol/L) – كاشف فينول فتالين – ماء مقطر	– سحاحة سعتها ($10\ cm^3$) – أرلن ماير ($250\ cm^3$) – ماصة ($10\ cm^3$) – ميزان حساس

باعتبار أنّ كتلة العيّنة (زيت الزيتون) $m_E=5g$ قد تفاعلت مع 1,5ml من محلول KOH (0,1mol/L)

المطلوب:

1) ما دور الكحول الإيثيلي في التجربة؟


2) جد عبارة قرينة الحموضة (I_a).

3) احسب قيمة (I_a) وهل هي متطابقة مع المواصفات الدولية حيث: $I_a = (0,6 - 2)$ (

يعطى:

$H = 1\ g/mol$ ، $O = 16\ g/mol$ ، $K = 39\ g/mol$

II- ثلاثي ببتيد Glu-Cys-Ala ذو الصيغة الكيميائية الآتية:



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1) أعط الصيغ الكيميائية للأحماض الأمينية المكونة لثلاثي الببتيد، ثم صنفها.

2) اكتب الصيغ الأيونية للحمض الأميني الغلوتاميك (Glu) عند تغير الـ pH من 1 إلى 12 ،

ثم أحسب قيمة pH_i له.

تعطى قيم pKa للحمض الأميني الغلوتاميك (Glu):

$$pKa_1 = 2,19 \quad ، \quad pKa_R = 4,25 \quad ، \quad pKa_2 = 9,67$$

3) أكمل التفاعلات الأتية:

1) Ala $\xrightarrow{\Delta}$ ..... + ...

2) 2Cys $\underset{+\,2H^+}{\overset{-\,2H^+}{\rightleftharpoons}}$ .....

3) Glu + HNO_2 $\longrightarrow$ ..... + ... + ...

التمرين الثالث: (06 نقاط)

1) احتراق حمض البنزويك الصلب عند 25°C وفق التفاعل الأتي :

$$C_6H_5\text{-}COOH_{(s)} + ...O_{2(g)} \longrightarrow ....CO_{2(g)} + ...H_2O_{(\ell)}$$

أ) وازن معادلة التفاعل.

ب) احسب الأنطالبي المعياري (ΔH_f^0) لتشكل حمض البنزويك الصلب.

يعطى:

$$\Delta H^0_{comb} = -3227 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H^0_f(CO_{2\,(g)}) = -393 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H^0_f(H_2O_{\,(\ell)}) = -286 \text{ kJ/mol}$$

2) احسب أنطالبي احتراق (ΔH^0_{comb}) حمض البنزويك الصلب عند 50°C حيث:

المركب	$C_6H_5\text{-}COOH_{(g)}$	$CO_{2(g)}$	$H_2O_{(\ell)}$	$O_{2(g)}$
C_p ($J.mol^{-1}.K^{-1}$)	146,7	37,58	75,29	29,36

3) احسب أنطالبي انصهار حمض البنزويك (ΔH_{fus}).

علما أنّ: $\Delta H^0_f(C_6H_5\text{-}COOH_{(\ell)}) = -362,4 \text{ kJ/mol}$

4) احسب كمية الحرارة (Q) اللازمة لانصهار 24,4 g من حمض البنزويك.

يعطى:

$$H = 1 \text{ g/mol} \quad ، \quad C = 12 \text{ g/mol} \quad ، \quad O = 16 \text{ g/mol}$$

انتهى الموضوع الأول

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

مركب عضوي مغنزيومي (A) صيغته R-MgCl ، كتلته المولية 74,5 g/mol ، حيث (R) جذر ألكيلي.

1) جد الصيغة نصف المفصلة للمركب (A).

يعطى:

$Cl = 35,5\ g/mol$ ، $Mg = 24\ g/mol$ ، $H = 1\ g/mol$ ، $C = 12g/mol$

2) اكتب التفاعلات الكيميائية التي تسمح بالحصول على المركب (A) انطلاقا من الميثانول وكواشف أخرى.

3) نجري انطلاقا من المركب (A) سلسلة التفاعلات الكيميائية الأتية:

1) $A + H_3C-C\equiv N \longrightarrow B$

2) $B + 2H_2O \longrightarrow C + MgCl(OH) + NH_3$

3) $C + H_2 \xrightarrow{Ni} D$

4) $D + SOCl_2 \longrightarrow E + SO_2 + HCl$

5) $E + Mg \xrightarrow{ROR} F$

6) $F + CO_2 \xrightarrow{H_2O} G + MgCl(OH)$

7) $G + D \underset{}{\overset{H_2SO_4}{\rightleftharpoons}} H_3C-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-\underset{O}{\underset{||}{C}}-O-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3 + H_2O$

أ) جد الصيغ نصف المفصلة للمركبات: (B) ، (C) ، (D) ، (E) ، (F) ، (G) .

ب) استنتج مردود التفاعل (7) علما أن المزيج الابتدائي متساوي المولات.

جـ) يتشكل عند التوازن 0,3mol من الأستر .

- احسب عدد المولات الابتدائية لكل من المركبين (G) و (D) .

4) إرجاع المركب (G) بواسطة $LiAlH_4$ المتبوع بالإماهة يؤدي إلى مركب (H)

- نزع الماء من المركب (H) في وجود H_2SO_4 عند 170°C يعطي مركب (I)
- بلمرة المركب (I) تؤدي إلى بوليمير (J)

أ) اكتب الصيغة نصف المفصلة لكل من المركبين (H) و (I) .

ب) أعط الصيغة العامة للبوليمير (J) .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثاني: (06 نقاط)

I - ثلاثي غليسريد متجانس (TG) يدخل في تركيبه حمض دهني (A) رمزه : $C\ 16:1\ \Delta^9$




1) اكتب الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الغليسريد المتجانس (TG).

2) اكتب تفاعل ثلاثي غليسريد (TG) مع اليود (I_2) ، ثم أحسب قرينة اليود (I_i) له.

يعطى:

$C = 12\ g/mol$، $H = 1\ g/mol$ ، $O = 16\ g/mol$ ، $I = 127\ g/mol$

II- لديك الأحماض الأمينية الأتية:

الحمض الأميني	حمض الغلوتاميك Glu	فنيل ألانين Phe	أرغنين Arg
السلسلة الجانبية(R-)			

1) صنّف هذه الأحماض الأمينية.

2) احسب pH_i للحمض الأميني فينيل الانين Phe إذا علمت أنّ $pKa_1 = 1,83$ ، $pKa_2 = 9,13$

3) اكتب الصيغ الأيونية للحمض الأميني فينيل الانين Phe عند تغير الـ pH من 1 إلى 12 .

4) نضع مزيج الأحماض الأمينية السابقة في جهاز الهجرة الكهربائية عند $pH = 5,48$

– وضّح بالرسم مواقع هذه الأحماض الأمينية على شريط الهجرة الكهربائية.

يعطى:

$pH_{i\,(Glu)} = 3,22$ و $pH_{i\,(Arg)} = 10,76$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثالث: (06 نقاط)

I- يحترق البوتـ −1− ن الغازي $C_4H_{8(g)}$ عند درجة حرارة 25°C وضغط 1atm احتراقا تاما.

1) اكتب معادلة تفاعل احتراق البوتـ −1− ن الغازي .

2) احسب أنطالبي احتراق البوتـ −1− ن الغازي.

يعطى:

المركب	$CO_{2(g)}$	$H_2O_{(\ell)}$	$C_4H_{8(g)}$
$\Delta H_f^0(kJ.mol^{-1})$	-393	-286	-0,4


3) أ) مثّل مخطط تشكل البوتـ −1− ن الغازي.

ب) احسب أنطالبي التصعيد للكربون الصلب $\Delta H_{sub}^0(C_{(s)})$.

يعطى:

الرابطة	H-H	C-H	C-C	C=C
$\Delta H_{diss}^0(kJ.mol^{-1})$	436	413	348	612

II- لديك البيان $P = f(V)$ الذي يمثل انتقال غاز مثالي من الحالة الابتدائية ① إلى الحالة النهائية ② :



1) ما نوع كل من التحولين (a) و (b) ؟

2) احسب العمل W لكل تحوّل.

يعطى:

$1atm = 1,013.10^5\ Pa$

انتهى الموضوع الثاني

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول: (08 نقاط)		
I- 1)		**2,25**
أ) كتابة معادلة الاحتراق التام بدلالة n		
$C_nH_{2n}O_2 + \frac{3n-2}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + nH_2O$	**0,5**	
ب) إيجاد الصيغة المجملة للمركب X:		
من المعادلة لدينا :		
$1mol\,(x) \rightarrow n\,mol\,(CO_2)$	**0,5**	
$M_X=(14n+32)\,g \rightarrow n \times 44\,g$ $0,7\,g \rightarrow 1,25\,g$	**0,25**	
$1,25 \times (14n+32) = 0,70 \times 44 \times n \Rightarrow n=3$		
ومنه المركب X :		
$C_3H_6O_2$	**0,25**	
ج) الصيغ الممكنة للمركب X :		
$CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$ ، $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_3$ ، $H-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_3$	**0,25×3**	
2) كتابة الصيغ نصف المفصلة للمركبات :		**3,25**
A : $H_2C=CH_2$ B : $H_2C\langle \overset{O}{} \rangle CH_2$ (O-O)	**0,5×6**	
C : $H-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$ D : $CH_3-CH_2-OMgCl$		
E : CH_3-CH_2-OH F : $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$		
X : $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_3$	**0,25**	
II-1) كتابة معادلة التفاعل :		**0,25**
$N_2O_5 \longrightarrow 2NO_2 + \frac{1}{2} O_2$	**0,25**	
2)حساب زمن نصف التفاعل $(t_{1/2})$: $t_{1/2}=\frac{\ln 2}{k}$	**0,5**	**0,75**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	0,25	$t_{1/2} = \frac{0,69}{5\times10^{-3}} = 138 \text{ min}$
1, 5		3)حساب سرعة التفاعل V :
	0,5	$V = k\times[N_2O_5]$
		- حساب $[N_2O_5]$:
	0,5	$\ln\frac{[N_2O_5]}{[N_2O_5]_0} = -kt$
		$[N_2O_5] = [N_2O_5]_0 \times e^{-kt}$
	0,25	$[N_2O_5] = 0.1\times e^{-5\times10^{-3}\times60}$
		$[N_2O_5] = 0,074 \text{ mol/L}$
		تطبيق عددي:
	0,25	$V = 5\times10^{-3} \times 0,074$
		$V = 0,37 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$
0,25		**التمرين الثاني: (06 نقاط)**
	0,25	**I -** 1- دور الكحول الإيثيلي : مذيب عضوي للمادة الدهنية.
1		2) إيجاد عبارة قرينة الحموضة I_a:
	0,25	$RCOOH + KOH \longrightarrow RCOO^-,K^+ + H_2O$
		$1\text{mol} \longrightarrow 1\text{mol}$
		$m_E(g) \longrightarrow m_{KOH}.10^{+3} \text{ (mg)}$
	0,25	$1(g) \longrightarrow I_a$
		$I_a = \frac{m_{KOH}.10^{+3}}{m_E}$
	0,25	$m_{KOH} = C.V(\ell).M_{KOH}$
	0,25	$I_a = \frac{C.V(\ell).M_{KOH}.10^{+3}}{m_E}$
0,5		3) تطبيق عددي

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

	0,25	$I_a = \frac{0,1.1,5.10^{-3}.56.10^{+3}}{5}$ $I_a = 1,68$
	0 ,25	- حسب المقاييس الدولية نستنتج أن هذه القيمة $I_a = 1,68$ مطابقة للمواصفات المعمول بها.
1,5		**-II**
	0,25×6	1) كتابة الصيغ الكيميائية لكل حمض أميني مع التصنيف :

الحمض الأميني	الصنف
$H_2N-\underset{\underset{(CH_2)_2}{\vert}}{\underset{\vert}{CH}}-COOH$ $\vert$ $COOH$	حمض أميني حامضي
$H_2N-\underset{\underset{SH}{\vert}}{\underset{\vert}{CH_2}}-CH-COOH$	حمض أميني كبريتي
$H_2N-\underset{\underset{CH_3}{\vert}}{CH}-COOH$	حمض أميني ذو سلسلة كربونية بسيطة

1,5		2) كتابة الصيغ الأيونية للحمض الأميني (Glu) عند تغير الـ pH من 1 إلى 12
	0,25×4	$1 \quad pka_1=2.19 \quad pH_i \quad pka_R=4.25 \quad pka_2=9.67 \quad 12 \quad pH$ $H_3N^+-\underset{\underset{(CH_2)_2}{\vert}}{\underset{\vert}{CH}}-COOH \underset{+H}{\overset{+OH^-}{\rightleftharpoons}} H_3N^+-\underset{\underset{(CH_2)_2}{\vert}}{\underset{\vert}{CH}}-COO^- \underset{+H}{\overset{+OH^-}{\rightleftharpoons}} H_3N^+-\underset{\underset{(CH_2)_2}{\vert}}{\underset{\vert}{CH}}-COO^- \underset{+H}{\overset{+OH^-}{\rightleftharpoons}} H_2N-\underset{\underset{(CH_2)_2}{\vert}}{\underset{\vert}{CH}}-COO^-$
		- حساب pH_i لحمض الغلوتاميك (Glu) :
	0,25×2	$pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_R}{2} = \frac{2,19 + 4,25}{2} = 3,22$

najah213.com · نجاح 213

1,25		3) إتمام التفاعلات :
	0,5	1) $H_2N-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-COOH \longrightarrow H_2N-CH_2-CH_3 + CO_2$
	0,25	2) $2\,H_2N-\underset{\displaystyle CH_2-SH}{\underset{|}{CH}}-COOH \underset{+\,2\,H^+}{\overset{-\,2\,H^+}{\rightleftharpoons}} H_2N-\underset{\displaystyle CH_2-S-S-CH_2-CH-COOH}{\underset{|}{CH}}-COOH$
	0,5	3) $H_2N-\underset{\displaystyle (CH_2)_2-COOH}{\underset{|}{CH}}-COOH + HNO_2 \longrightarrow HO-\underset{\displaystyle (CH_2)_2-COOH}{\underset{|}{CH}}-COOH + N_2 + H_2O$
		التمرين الثالث: (06 نقاط)
2,25		1) أ) موازنة معادلة التفاعل:
	0,25×3	$C_6H_5\text{-}COOH_{(S)} + \frac{15}{2}\,O_{2\,(g)} \longrightarrow 7\,CO_{2\,(g)} + 3\,H_2O_{(\ell)}$
		ب) حساب الأنطالبي المعياري لتشكل حمض البنزويك الصلب:
	0,5	$\Delta H^0_{comb} = \sum \Delta H^0_f(\text{produits}) - \sum \Delta H^0_f(\text{réactifs})$
	0,5	$\Delta H^0_{comb} = 7\Delta H^0_f(CO_{2(g)}) + 3\Delta H^0_f(H_2O_{(\ell)}) - \Delta H^0_f(C_6H_5COOH_{(s)}) - \frac{15}{2}\cancel{\Delta H^0_f(O_{2(g)})}$
	0,25	$\Delta H^0_f(C_6H_5COOH_{(s)}) = 7\Delta H^0_f(CO_{2(g)}) + 3\Delta H^0_f(H_2O_{(\ell)}) - \Delta H^0_{comb}$
		$\Delta H^0_f(C_6H_5COOH_{(s)}) = 7(-393) + 3(-286) - (-3227)$
	0,25	$\Delta H^0_f(C_6H_5COOH_{(s)}) = -\,382\ kJ.mol^{-1}$
1,75		2) حساب أنطالبي احتراق حمض البنزويك الصلب عند 50°C: بتطبيق علاقة كيرشوف
	0,5	$\Delta H^0_T = \Delta H^0_{T_0} + \int_{T_0}^{T} \Delta C_p.dT$
	0,25	$\Delta H^0_T = \Delta H^0_{T_0} + \Delta C_p(T-T_0)$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

	0,25	$\Delta C_p = \sum C_p(\text{produits}) - \sum C_p(\text{réactifs})$
	0,25	$\Delta C_p = 7C_p(CO_{2(g)}) + 3C_p(H_2O_{(\ell)}) - C_p(C_6H_5COOH_{(s)}) - \frac{15}{2}C_p(O_{2(g)})$
	0,25	$\Delta C_p = 7(37,58) + 3(75,29) - (146,7) - \frac{15}{2}(29,36) = 122,03\ J.mol^{-1}.K^{-1}$
		$\Delta H^0_{323} = \Delta H^0_{298} + \Delta C_p(323-298)$
	0,25	$\Delta H^0_{323} = (-3227) + 122,03\times10^{-3}(25)$
		$\Delta H^0_{323} = -3223,95\ kJ.mol^{-1}$
1		3) حساب انطالبي انصهار حمض البنزويك (ΔH_{fus}):
	0,25	$C_6H_5COOH_{(s)} \xrightarrow{\Delta H^0_{fus}(C_6H_5COOH)} C_6H_5COOH_{(\ell)}$
	0,5	$\Delta H^0_{fus} = \Delta H^0_f(C_6H_5COOH_{(\ell)}) - \Delta H^0_f(C_6H_5COOH_{(s)})$
		$\Delta H^0_{fus} = (-362,4) - (-382)$
	0,25	$\Delta H^0_{fus} = 19,6\ kJ.mol$
1		4) حساب كمية الحرارة اللازمة لانصهار 24.4 g من حمض البنزويك:
		- الكتلة المولية لحمض البنزويك C_6H_5-COOH
		$M = (7\times12) + (2\times16) + (6\times1)$
	0,25	$M = 122\ g/mol$
		$1mol\ (C_6H_5\text{-}COOH) \rightarrow 19,6\ kJ$
	0,5	$122\ g \rightarrow 19,6\ kJ$ $24,4\ g \rightarrow Q$ $Q = \frac{19,6 \times 24,4}{122}$
	0,25	$Q = 3,92\ kJ$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

التمرين الأول: (08 نقاط)

1- إيجاد الصيغة نصف المفصلة للمركب A: — **1**

$M(C_nH_{2n+1}MgCl) = 14n + 1 + 24 + 35,5 = 74,5$ — **0, 5**

$14\,n = 74,5 - 60,5 = 14$

$n = 1$

$A : CH_3\text{-}MgCl$ — **0,5**

2- كتابة التفاعلات الكيميائية : — **1**

$CH_3{-}OH + PCl_5 \longrightarrow CH_3{-}Cl + POCl_3 + HCl$ — **0,5**

$CH_3{-}Cl + Mg \xrightarrow{ROR} CH_3{-}MgCl$ — **0,5**

ملاحظة : تقبل إجابة أخرى (استعمال $SOCl_2$ في المرحلة الأولى)

3- أ- إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات : — **4, 5**

(B) : $CH_3\text{-}\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}{=}NMgCl$

(C) : $CH_3{-}\overset{\overset{O}{||}}{C}{-}CH_3$

(D) : $CH_3\text{-}\overset{\overset{OH}{|}}{CH}{-}CH_3$ — **0,5x6**

(E) : $CH_3{-}\overset{\overset{Cl}{|}}{CH}{-}CH_3$

(F) : $CH_3{-}\overset{\overset{MgCl}{|}}{CH}{-}CH_3$

(G) : $\begin{matrix} & & CH_3 \\ & \diagdown & \\ CH_3 & - & CH-COOH \end{matrix}$

ب- استنتاج مردود التفاعل : بما أنّ الكحول(D) ثانوي فإنّ:

$R = 60\%$ (المردود) — **0, 5**

ج- حساب عدد المولات الابتدائية لكل من G و D :


$$R = \frac{n_{ester}}{n_0} \times 100$$

$$n_0 = \frac{n_{ester}}{R} \times 100$$ — **0, 5**

$$n_0 = n_D = n_G$$

	0,25	$n_0 = \frac{0,3}{60} \times 100 = 0,5mol$
	0,25	$n_0 = n_D = n_G = 0,5mol$
1,5		4- أ- الصيغة نصف المفصلة لكل من H و I :
	0, 5x2	H: $H_3C-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_2-OH$ I: $H_3C-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH_2$
		ب- الصيغة العامة للبوليمير J :
	0,5	$\left[CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}-CH_2 \right]_n$
		التمرين الثاني: (06 نقاط)
0,5		I – 1- كتابة الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الغليسريد المتجانس :
	0,5	$H_2C(O-C(=O)-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_5-CH_3)-HC(O-C(=O)-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_5-CH_3)-H_2C(O-C(=O)-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_5-CH_3)$
1,75		I – 2- كتابة معادلة تفاعل ثلاثي الغليسريد مع اليود I_2 :
	0,25x3	$H_2C(O-C(=O)-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_5-CH_3)-HC(O-C(=O)-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_5-CH_3)-H_2C(O-C(=O)-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_5-CH_3) + 3I_2 \longrightarrow$

najah213.com · نجاح 213



– حساب قرينة اليود I_i لثلاثي الغليسريد:

0,25 $M_{TG}= 800g/mol$

$1mol\ (TG) \longrightarrow 3mol\ (I_2)$

0,5

$$\left.\begin{array}{l} M_{TG} \longrightarrow 3 \times M\ (I_2) \\ 100\ g \longrightarrow I_i \end{array}\right\} \quad I_i = \frac{3 \times 254 \times 100}{800}$$

0,25 $I_i = 95,25$

1,5

II-1- تصنيف الأحماض الأمينية:

0,5x3

Glu: حمض أميني خطي حامضي

Phe: حمض أميني حلقي عطري


Arg: حمض أميني خطي قاعدي

0,75 2- حساب PH_i للحمض الأميني Phe:

0,5
$$pH_i = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{1,83+9,13}{2}$$

0,25 $pH_i = 5,48$

0,75 3- كتابة الصيغ الأيونية لـ Phe عند تغير الـ PH من 1 إلى 12 :




0,25x3

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

4- توضيح مواقع الأحماض الأمينية على شريط الهجرة الكهربائية: **0,75**



0,25x3

التمرين الثالث: (06 نقاط)

I-1- كتابة معادلة إحتراق البوتـ -1- ن : **0,75**

$$C_4H_{8\,(g)} + 6O_{2(g)} \longrightarrow 4CO_{2\,(g)} + 4H_2O_{(\ell)}$$ **0,25x3**

2- حساب أنطالبي إحتراق البوتـ -1- ن : **0,75**

$$\Delta H^{\circ}_{Comb} = \sum \Delta H^{\circ}_{f\,(Produits)} - \sum \Delta H^{\circ}_{f\,(Reactifs)}$$


$$\Delta H^{\circ}_{Comb} = \left[4\Delta H^{\circ}_{f(CO_{2(g)})} + 4\Delta H^{\circ}_{f(H_2O_{(\ell)})}\right] - \left[\Delta H^{\circ}_{f(C_4H_{8(g)})} + 6\Delta H^{\circ}_{f(O_{2(g)})}\right]$$ **0,25x3**

$$\Delta H^{\circ}_{Comb} = 4\times(-393) + 4\times(-286) - (-0,4) - 6\times 0$$

$$\Delta H^{\circ}_{Comb} = -2715,6 kJ/mol$$

2,5

3- أ - مخطط تشكل البوتـ -1- ن الغازي : **0 ,25**



0,25x5

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

		ب – حساب أنطالبي التصعيد للكربون الصلب :
	0,5	$\Delta H^{\circ}_{f(C_4H_{8\,(g)})}=4\Delta H^{\circ}_{sub(C_{(S)})}+4\Delta H^{\circ}_{diss(H-H)}-8\Delta H^{\circ}_{diss(C-H)}-2\Delta H^{\circ}_{diss(C-C)}-\Delta H^{\circ}_{diss(C=C)}$
	0,25	$\Delta H^{\circ}_{sub(C_{(S)})}=\dfrac{\Delta H^{\circ}_{f(C_4H_{8\,(g)})}+8\Delta H^{\circ}_{diss(C-H)}+2\Delta H^{\circ}_{diss(C-C)}+\Delta H^{\circ}_{diss(C=C)}-4\Delta H^{\circ}_{diss(H-H)}}{4}$
		$\Delta H^{\circ}_{sub(C_{(S)})}=\dfrac{-0,4+8\times413+2\times348+612-4\times436}{4}$
	0,25	$\Delta H^{\circ}_{sub(C_{(S)})}=716,9\ kJ/mol$
1		II – 1 – نوع التحولين :
	0,5	– التحول (a) : تحول الحجم الثابت (isochore)
	0,5	– التحول (b) : تحول الضغط الثابت (isobare)
1		2 – حساب العمل عند كل تحول :
	0,25	$W_{(a)}=0$
	0,5	$W_{(b)}=-p\Delta V=-p(V_2-V_1)$
		$W_{(b)}=-10\times1,013\times10^{5}\times(2,4-12)\times10^{-3}$
	0,25	$W_{(b)}=9724,8\ J=9,7248\ kJ$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com