najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ثانوية الشيخ أمود - تمنراست — السنة الدراسية: 2017/2016
الشعبة :علوم تجريبية — المستوى : السنة الثالثة — المدة: ســــــــــاعتــان

إختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول (04 نقاط):

هذا التمرين هو إستبيان متعدد الإجابات ،لكل سؤال،إقتراح واحد صحيح ، حدد الإجابة الصحيحة مع التبرير:

الأسئلة	أ	ب	ج
$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x^2-4}$ تساوي	$\dfrac{2}{3}$	$\dfrac{1}{6}$	$\dfrac{1}{24}$
2)اذا كانت $f'(x)=\dfrac{1}{x^2+3}$ و كانت $h(x)=f(3x)$	$h'(x)=\dfrac{1}{3x^2-1}$	$h'(x)=-\dfrac{1}{3x^2+1}$	$h'(x)=\dfrac{1}{3x^2+1}$
3) حلول المعادلة $2[\ln(x)]^2-5\ln(x)+2=0$	$\begin{cases}x=2\\ x=\dfrac{1}{2}\end{cases}$ او	$\begin{cases}x=e^2\\ x=\sqrt{e}\end{cases}$ او	$\begin{cases}x=2\\ x=1\end{cases}$ او
4)أحسن تقريب تالفي للدالة : $x\mapsto\ln(x)$ بجوار 2 هو	$\dfrac{1}{2}x+\ln 2-1$	$\dfrac{1}{2}x+\ln 2+1$	$\dfrac{1}{2}x+\ln 2$

التمرين الثاني (4 نقاط) :

1) حل المعادلة التفاضلية (I).....$2y'+y=0$ ثم عين الحل الخاص f الذي يحقق $f'(0)=1$.
2) نعتبر المعادلة التفاضلية (II).....$2y'+y=x^2+3x$.
بين ان الدالة g على $\mathbb{R}$ بـ $g(x)=x^2-x+2$ هي حل للمعادلة التفاضلية (II).
3) بين انه تكون الدالة h حل للمعادلة التفاضلية (II) إذا وفقط إذا كان $h-g$ حل للمعادلة التفاضلية (I)
استنتج حلا للمعادلة التفاضلية (II)

التمرين الثالث (5 نقاط):

f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بالعبارة : $f(x)=x+\dfrac{ax+b}{(x-2)^2}$ حيث a ; b عددان حقيقيان و بجدول تغيراتها التالي :

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖		$+$		
$f(x)$		↗	1	↘	‖		1	↗	

و (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

1.باستعمال جدول تغيرات و عبارة الدالة f أوجد العددين الحقيقيين a ; b ثم إستنتج أن : $f(x)=\dfrac{x^3-4x^2+3x+1}{(x-2)^2}$

2. أحسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها . ثم أكمل جدول تغيراتها .

3.بين أن المعادلة : $f(x)=0$ تقبل 3 حلول على المجموعة $\mathbb{R}-\{2\}$.

4. أثبت أن: $f'(x)=\dfrac{x^3-6x^2+13x-8}{(x-2)^3}$

5. بين أنه يوجد مماس للمنحنى (C) موازي للمستقيم ذو المعادلة $y=x$.

التمرين الثالث : (08 نقاط)

I - نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=4xe^{2x}+1$

1- أوجد نهايات الدالة g عند حدود مجموعة تعريفها

2- احسب $g'(x)$ ، أدرس إتجاه تغير g ثم شكل جدول التغيرات g.

3- استنتج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x)>0$.

II - نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+(2x-1)e^{2x}$

ليكن $\mathcal{C}_f$ المنحني الممثل للدالة f في معلم متعامد و متجانس.

1- أ) تحقق أنه لأجل كل x من $\mathbb{R}$ أن : $f'(x)=g(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f.

ب) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم شكل جدول تغيرات f.

2- أ) بين أن المستقيم (d) ذو المعادلة $y=x$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحني $\mathcal{C}_f$.

ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى $\mathcal{C}_f$ و المستقيم (d).

3- بين أن المنحنى يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α تحقق $0{,}40 \prec \alpha \prec 0{,}41$.

4- اكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

5- أنشئ المماس (Δ) المستقيم (d) والمنحنى $(\mathcal{C}_f)$.

اساتذة المادة – بالتوفيق للجميع

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تصحيح الاختبار الثلاثي الاول شعبة الثالثة علوم التجريبية

التمارين	عناصر الإجابة	التنقيط مجزأة	التنقيط كاملة
التمرين الاول	1) الاجابة (ج) : $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x^2-4}=\dfrac{1}{24}$ لدينا $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x^2-4}$ حالة عدم التعيين لنزيل هذه الحالة نضرب في المرافق فنجد $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x^2-4}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\left(\sqrt{x+7}-3\right)\left(\sqrt{x+7}+3\right)}{\left(x^2-4\right)\left(\sqrt{x+7}+3\right)}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{\left(\sqrt{x+7}+3\right)(x+2)(x-2)}$ $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x^2-4}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{\left(\sqrt{x+7}+3\right)(x+2)}=\dfrac{1}{24}$. 2) اذا كانت $f'(x)=\dfrac{1}{x^2+3}$ و كانت $h(x)=f(3x)$ الاجابة (ج) : لأن $h'(x)=3f'(3x)=\dfrac{3}{(3x)^2+3}=\dfrac{3}{9x^2+3}=\dfrac{1}{3x^2+1}$ 3) حلول المعادلة : $2[\ln(x)]^2-5\ln(x)+2=0$ هي الاجابة (ب) $\begin{cases}x=e^2\\ x=\sqrt{e}\end{cases}$ او نضع $X=\ln(x)$ تصبح المعادلة $2[\ln(x)]^2-5\ln(x)+2=0$ كما يلي $2X^2-5X+2=0$ نحسب المميز $\Delta=9$ للمعادلة حلين هما $\begin{cases}X=\dfrac{1}{2}\\ X=2\end{cases}$ او أي ان $\begin{cases}\ln(x)=\dfrac{1}{2}\\ \ln(x)=2\end{cases}$ او يكافئ $\begin{cases}x=e^{\frac{1}{2}}\\ x=e^2\end{cases}$ او يكافئ $\begin{cases}x=\sqrt{e}\\ x=e^2\end{cases}$ او . 4) أحسن تقريب تالفي للدالة : $x\mapsto\ln(x)$ بجوار 2 هو (أ) $\dfrac{1}{2}x+\ln 2-1$ $f(x)=\ln(x)$ ومنه $f'(x)=\dfrac{1}{x}$ التقريب التألفي للدالة f بجوار 2 هو $f(x)\approx f'(2)(x-2)+f(2)$ أي ان $f(x)\approx\dfrac{1}{2}(x-2)+\ln(2)$ و منه $f(x)\approx\dfrac{1}{2}x+\ln(2)-1$.	(0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5)	4
التمرين الثاني	1) حل المعادلة التفاضلية (I).....$2y'+y=0$ تكافئ $y'=-\dfrac{1}{2}y$ حلها العام هو $y=Ce^{-\frac{1}{2}x}$ حيث C ثابت حقيقي . الحل الخاص f الذي يحقق $f'(0)=1$. أي ان $f(x)=Ce^{-\frac{1}{2}x}$, ومنه $f'(x)=-\dfrac{1}{2}Ce^{-\frac{1}{2}x}$ بالتعويض بـ 0 نجد $f'(0)=-\dfrac{1}{2}C$ و $f'(0)=1$ و منه $-\dfrac{1}{2}C=1$ إذن $C=-2$ وبالتالي نجد $f(x)=-2e^{\frac{1}{2}x}$.	(0,5) (0,5)	4

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

	2) نعتبر المعادلة التفاضلية (II) ..... $2y'+y=x^2+3x$. لدينا $g(x)=x^2-x+2$ و $g'(x)=2x-1$ و منه $2g'(x)+g(x)=4x-2+x^2-x+2=x^2+3x$ أي أن $2g'(x)+g(x)=x^2+3x$ إذن g حل للمعادلة (II).	(1)	
	3) إثبات انه تكون الدالة h حل للمعادلة التفاضلية (II) إذا وفقط إذا كان $h-g$ حل للمعادلة التفاضلية (I) - إذا كان $h-g$ حل للمعادلة التفاضلية (I) يكافئ $2(h-g)'(x)+(h-g)(x)=0$ و منه $2h'(x)+h(x)=2g'(x)+g(x)$ و بما $2g'(x)+g(x)=x^2+3x$ فإن $2h'(x)+h(x)=x^2+3x$ و منه h حل للمعادلة (II). - إذا كان h حل للمعادلة (II) يعني أن $2h'(x)+h(x)=x^2+3x$ و لدينا $2g'(x)+g(x)=x^2+3x$ بطرح المعادلتين نجد $2(h-g)'(x)+(h-g)(x)=0$ و منه $h-g$ حل للمعادلة التفاضلية (I).	(1)	
	استنتاج حلا للمعادلة التفاضلية (II) $h(x)-g(x)=Ce^{\frac{-1}{2}x}$ و منه $h(x)=g(x)+Ce^{\frac{-1}{2}x}$ أي ان $h(x)=x^2+3x+Ce^{\frac{-1}{2}x}$.	(1)	
التمرين الثالث	1) من جدول التغيرات لدينا $f(1)=1$ $f(3)=1$;اي ان $1+a+b=1$ و $3+3a+b=1$ اي ان $a=-b$ و $3a+b=-2$ و منه بالتعويض نجد $-3b+b=-2$ و منه $b=1$ و $a=-1$ بالتعويض في العبارة نجد $f(x)=x+\frac{-x+1}{(x-2)^2}$ بتوحيد المقامات نجد $f(x)=\frac{x(x-2)^2-x+1}{(x-2)^2}=\frac{x(x^2-4x+4)-x+1}{(x-2)^2}=\frac{x^3-4x^2+4x-x+1}{(x-2)^2}$ $f(x)=\frac{x^3-4x^2+3x+1}{(x-2)^2}$	$(0,25)\times 2$ $(0,5)$	5
	2. حساب النهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها: $\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^3}{x^2}\right)=+\infty$ و $\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^3}{x^2}\right)=-\infty$ $\lim_{x\to2}f(x)=\lim_{x\to2}\frac{-1}{(x-2)^2}=-\infty$.	$(0,25)\times 2$ $(0,5)$	
	جدول تغيرات الدالة f	$(0,5)$	
	3.تبيين أن المعادلة : $f(x)=0$.....(1) تقبل 3 حلول على المجموعة $\mathbb{R}-\{2\}$. لدينا : - f دالة متزايدة و مستمرة على المجال $]-\infty;1]$ و تأخذ صورها في المجال $]-\infty;1]$ أي انها تغير إشارتها على المجال $]-\infty;1]$ فحسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة (1) تقبل حلا في المجال $]-\infty;1]$. - f دالة متناقصة و مستمرة على المجال $]1;2]$ و تأخذ صورها في المجال $]-\infty;1]$ أي	$(0,5)$ $(0,5)$	

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖		$+$		
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$-\infty$	‖	$-\infty$	↗	$-\infty$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

		انها تغير إشارتها على المجال $]1;2[$ فحسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة (1) تقبل حلا في المجال $]1;2[$. f – دالة متزايدة و مستمرة على المجال $]2;+\infty[$ و تأخذ صورها في المجال $]-\infty;+\infty[$ أي انها تغير إشارتها على المجال $]2;+\infty[$ فحسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة (1) تقبل حلا في المجال $]2;+\infty[$.مما سبق نستنتج ان للمعادلة (1) ثلاثة حلول على مجموعة تعريفها . 4. إثبات أن: $f'(x)=\frac{x^3-6x^2+13x-8}{(x-2)^3}$ لدينا $f(x)=x+\frac{-x+1}{(x-2)^2}$ و منه $f'(x)=1+\frac{-(x-2)^2-2(x-2)(-x+1)}{(x-2)^4}=1+\frac{(x-2)[-x+2+2x-2]}{(x-2)^4}=1+\frac{x}{(x-2)^3}$ $f'(x)=\frac{(x-2)^3+x}{(x-2)^3}=\frac{x^3-6x^2+12x-8+x}{(x-2)^3}=\frac{x^3-6x^2+13x-8}{(x-2)^3}$. 5. إثبات أنه يوجد مماس للمنحنى (C) موازي للمستقيم ذو المعادلة $y=x$ اي ان المعادلة $f'(x)=1$ تقبل حلا $f'(x)=1$ يكافئ $\frac{x^3-6x^2+13x-8}{(x-2)^3}=1$ يكافئ $x^3-6x^2+13x-8=(x-2)^3$ و $x\neq 2$ أي أن $x^3-6x^2+13x-8=x^3-6x^2+12x-8$ يكافئ $x=0$ و منه المنحنى (C) يقبل مماسا عند النقطة $A\left(0;\frac{1}{4}\right)$ موازيا للمنصف الأول ذو المعادلة $y=x$	(0,5) (0,5) (0,5)	
التمرين الرابع	I - نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=4xe^{2x}+1$ 1- النهايات الدالة g عند حدود مجموعة تعريفها $\lim_{x\to+\infty}g(x)=\lim_{x\to+\infty}4xe^{2x}=+\infty$. و $\lim_{x\to-\infty}g(x)=1$ (لأن $\lim_{x\to-\infty}4xe^{2x}=0$) 2- حساب $g'(x)$: $g(x)=4e^{2x}+8xe^{2x}=4(1+2x)e^{2x}$ إشارتها من إشارة $(1+2x)$ و منه g متزايدة على المجال $\left[-\frac{1}{2};+\infty\right[$ و متناقصة على المجال $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$. شكل جدول التغيرات g : 3- استنتاج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x)>0$ مما سبق لاحظنا من جدول تغيرات الدالة تقبل قيمة حدية صغرى هي $g\left(-\frac{1}{2}\right)=1-\frac{2}{e}$ عدد موجب تماما و منه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x)>0$. II - نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+(2x-1)e^{2x}$ ليكن $\mathcal{C}_f$ المنحني الممثل للدالة f في معلم متعامد و متجانس.	(0,25)×2 (0,25) (0,25) (0,5) (0,25)	7

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$		-	0	+	
$g(x)$	1	↘	$-2e^{-1}+1$	↗	$+\infty$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1- أ) التحقق أنه لأجل كل x من $\mathbb{R}$ أن : $f'(x)=g(x)$: (0,25)

$f'(x)=1+2e^{2x}+2(2x-1)e^{2x}=1+2e^{2x}+4xe^{2x}-2e^{2x}=1+4xe^{2x}=g(x)$. و منه (0,25)

الدالة f متزايدة على $\mathbb{R}$ لان g موجبة على $\mathbb{R}$.

ب) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x)=-\infty$ لأن (0,25)×2

$\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-1)e^{2x}=0$.

جدول تغيرات f : (0,5)

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2

2- أ) إثبات أن المستقيم (d) ذو المعادلة $y=x$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحني $\mathcal{C}_f$: (0,5)

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-x]=\lim\limits_{x\to-\infty}(2x-1)e^{2x}=0$ و منه (d) مستقيم مقارب مائل للمنحني $\mathcal{C}_f$.

ب) دراسو وضعية المنحنى $\mathcal{C}_f$ بالنسبة للمستقيم (d) لدينا $[f(x)-x]=(2x-1)e^{2x}$ (0,25)

إشارة الفرق من إشارة $(2x-1)$:


x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
إشارة $2x-1$		$-$	0	$+$	
الوضعية	(C_f) يقع تحت (d)		(C_f) يقطع (d)		(C_f) يقع فوق (d)

(0,5)

3- إثبات أن المنحنى يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α تحقق $0,40\prec\alpha\prec0,41$. بما أن f مستمرة و متزايدة على $\mathbb{R}$ و $f(0,40)=-0,04511$ و $f(0,41)=0,00131$ فحسب نظرية القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α. (1)

4- كتابة معادلة للمماس (Δ) للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 : $y=x-1$ (0,5)

5- أنشئ المماس (Δ) المستقيم (d) والمنحنى $(\mathcal{C}_f)$. (1)



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com