

طريقك نحو البكالوريا

الشعب:

علوم تجريبية | رياضيات | تقني رياضي | تسيير وإقتصاد

تمرين شامل مع الحل في
المتتاليات العددية

10

إعداد الأستاذ:

قويسم إبراهيم الخليل

آخر تحديث:

2021 / 04 / 14

التمريـــــن

نعتبر (u_n) المتتالية العددية المعرفة بحدها الأول u_0، ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} = \frac{\alpha u_n}{u_n + 1}$$

مع $\alpha \in \mathbb{R}^*$

I) نفرض أن: $u_0 = 1$ و $\alpha = 1$.

1. أحسب u_1، u_2 و u_3.
2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n > 0$.
3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة.
4. نعتبر المتتالية(v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$v_n = \frac{1}{u_n}$$

① بين أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0.

② اكتب بدلالة n عبارة الحد العام للمتتالية (v_n) ثم استنتج عبارة (u_n) بدلالة n .

③ احسب نهاية المتتالية (u_n).

5. اكتب بدلالة n المجموع S_n حيث:

$$S_n = v_{n+2021} + v_{n+2022} + \cdots + v_{2n}$$

II) نضع $u_0 = 6$ و $\alpha = 4$:

1. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 3$.
2. (w_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$w_n = \frac{u_n - 3}{u_n}$$

① بين أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$، يطلب تعيين حدها الأول.

② اكتب عبارة (w_n) بدلالة n، ثم استنتج عبارة (u_n) بدلالة n.

③ احسب نهاية المتتالية (u_n).

3. اكتب بدلالة n ما يلي:

$$A_n = w_0 + w_1 + w_2 + \cdots + w_n$$
$$B_n = w_0^2 + w_1^2 + w_2^2 + \cdots + w_n^2$$
$$C_n = \sqrt{w_0} + \sqrt{w_1} + \sqrt{w_2} + \cdots + \sqrt{w_n}$$
$$D_n = \frac{1}{w_0} + \frac{1}{w_1} + \frac{1}{w_2} + \cdots + \frac{1}{w_n}$$
$$E_n = w_0 + 2w_1 + 4w_2 + \cdots + 2^n w_n$$

الخليل للرياضيات

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

$$F_n = w_1 + w_3 + w_5 + \cdots + w_{2n-1}$$
$$G_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \cdots + \frac{1}{u_n}$$
$$H_n = w_0 \times w_1 \times w_2 \times \ldots \times w_n$$
$$I_n = \ln(w_0) + \ln(w_1) + \ln(w_2) + \cdots + \ln(w_n)$$

III) نفرض أنّ: $u_0 = \alpha$:

نضع من أجل كل عدد طبيعي n:

$$t_n = \frac{u_n - (\alpha - 1)}{u_n}$$

1 بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$t_{n+1} = \frac{1}{\alpha} t_n$$

2 اكتب عبارة u_n بدلالة n و α

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

حل التمريـــن

I)

❶ حساب u_1، u_2 و u_3:

$$u_{0+1} = \frac{\alpha u_0}{u_0 + 1} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{1+1}$$
$$\Rightarrow \boxed{u_1 = \frac{1}{2}}$$

$$u_{1+1} = \frac{\alpha u_1}{u_1 + 1} \Rightarrow u_2 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+1}$$
$$\Rightarrow \boxed{u_2 = \frac{1}{3}}$$

$$u_{2+1} = \frac{\alpha u_2}{u_2 + 1} \Rightarrow u_3 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+1}$$
$$\Rightarrow \boxed{u_3 = \frac{1}{4}}$$

❷ البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n > 0$:

- من أجل $n = 0$ لدينا:

$$u_0 = 1 > 0 \ldots (*)$$

- نفرض أن $[u_n > 0]$ ونثبت أن $[u_{n+1} > 0]$:

لدينا:

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 1}$$
$$= \frac{u_n + 1 - 1}{u_n + 1}$$
$$= 1 - \frac{1}{u_n + 1}$$

ولدينا:

$$u_n > 0 \Rightarrow u_n + 1 > 1$$
$$\Rightarrow \frac{1}{u_n + 1} < 1$$
$$\Rightarrow -\frac{1}{u_n + 1} > -1$$

الخليل للرياضيات

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{u_n + 1} > 0$$
$$\Rightarrow u_{n+1} > 0 \ldots (**)$$

حسب مبدأ البرهان بالتراجع: من $(*)$ و $(**)$ نجد أن: $(u_n > 0)$

❸ دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{u_n + 1} - u_n$$
$$= \frac{u_n - (u_n)^2 - u_n}{u_n + 1}$$
$$= \frac{-(u_n)^2}{u_n + 1}$$

بما أن $u_n > 0$ فإن $u_n + 1 > 0$ ومنه الإشارة من $-(u_n)^2$

وعليه $u_{n+1} - u_n < 0$

إذن (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

- استنتاج أن (u_n) متقاربة:

بما أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$ ومحدودة من الأسفل بـ 0 فهي متقاربة

❹

① تبيين أن المتتالية (v_n) حسابية :

لدينا:

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}}$$
$$= \frac{u_n + 1}{u_n}$$
$$= 1 + \frac{1}{u_n}$$

ولدينا:

$$v_0 = \frac{1}{u_0} = 1$$

ومنه المتتالية (v_n) حسابية أساسها 1 وحدها الأول 1.

② كتابة بدلالة n عبارة الحد العام للمتتالية (v_n):

$$v_n = v_0 + rn \Rightarrow \boxed{v_n = 1 + n}$$

- استنتاج عبارة (u_n) بدلالة n :

$$v_n = \frac{1}{u_n} \Rightarrow u_n = \frac{1}{v_n}$$

الخليل للرياضيات

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

$$\Rightarrow \boxed{u_n = \frac{1}{1+n}}$$

③ حساب نهاية المتتالية (u_n):

$$\lim_{n\to+\infty}(u_n) = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n+1}\right) = \boxed{0}$$

❺ كتابة بدلالة n المجموع S_n :

$$\begin{aligned} S_n &= v_{n+2021} + v_{n+2022} + \cdots + v_{2n} \\ &= \frac{2n-n-2021+1}{2}\left(\underbrace{1+2n}_{v_{2n}} + \underbrace{1+n+2021}_{v_{n+2021}}\right) \\ &= \frac{(n-2020)(2n+2023)}{2} \end{aligned}$$

II) من أجل $u_0 = 6$ و $\alpha = 4$ لدينا:

$$u_{n+1} = \frac{4u_n}{u_n+1}$$

❶ برهان أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 3$:

- من أجل $n = 0$ لدينا:

$$u_0 = 6 > 3 \ldots (*)$$

- نفرض أن $[u_n > 3]$ ونثبت أن $[u_{n+1} > 3]$:

لدينا:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{4u_n}{u_n+1} \\ &= \frac{4u_n+4-4}{u_n+1} \\ &= \frac{4(u_n+1)-4}{u_n+1} \\ &= 4 - \frac{4}{u_n+1} \end{aligned}$$

ولدينا حسب فرض التراجع:

$$\begin{aligned} u_n > 3 &\Rightarrow u_n + 1 > 4 \\ &\Rightarrow \frac{1}{u_n+1} < \frac{1}{4} \\ &\Rightarrow -\frac{1}{u_n+1} > -\frac{1}{4} \\ &\Rightarrow 4 - \frac{1}{u_n+1} > \frac{15}{4} \end{aligned}$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

$$\Rightarrow u_{n+1} > \frac{15}{4}$$
$$\Rightarrow u_{n+1} > 3 \dots (**)$$

حسب مبدأ البرهان بالتراجع: من $(*)$ و $(**)$ نجد أن: $(u_n > 3)$

❷

① تبيين أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$:

لدينا:

$$w_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}}$$
$$= \frac{\frac{4u_n}{u_n + 1} - 3}{\frac{4u_n}{u_n + 1}}$$
$$= \frac{4u_n - 3u_n - 3}{4u_n}$$
$$= \frac{u_n - 3}{4u_n}$$
$$= \frac{1}{4}\left(\frac{u_n - 3}{u_n}\right)$$
$$= \frac{1}{4}w_n$$

ولدينا:

$$w_0 = \frac{u_0 - 3}{u_0} = \frac{6 - 3}{6} = \frac{1}{2}$$

ومنه (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها الأول $\frac{1}{2}$.

② كتابة عبارة (w_n) بدلالة n:

$$\boxed{w_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

- استنتاج عبارة (u_n) بدلالة n:

$$w_n = \frac{u_n - 3}{u_n} \Rightarrow u_n w_n - u_n = -3$$
$$\Rightarrow u_n(w_n - 1) = -3$$
$$\Rightarrow u_n = -\frac{3}{w_n - 1}$$
$$\Rightarrow u_n = -\frac{3}{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n - 1}$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

$$\Rightarrow \boxed{u_n = \frac{3}{1-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n}}$$

③ احسب نهاية المتتالية (u_n):

$$\lim_{n\to+\infty}(u_n) = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{1-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n}\right) = \boxed{3}$$

لأن:

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\left(\frac{1}{4}\right)^n\right) = 0$$

3

$$A_n = w_0 + w_1 + w_2 + \cdots + w_n$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{4}}\right)$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{\frac{3}{4}}\right)$$
$$= \boxed{\frac{2}{3}\left(1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)}$$

$$B_n = w_0^2 + w_1^2 + w_2^2 + \cdots + w_n^2$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{2(n+1)}}{1-\left(\frac{1}{4}\right)^2}\right)$$
$$= \frac{1}{4}\left(\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{2(n+1)}}{\frac{15}{16}}\right)$$
$$= \boxed{\frac{4}{15}\left(1-\left(\frac{1}{4}\right)^{2(n+1)}\right)}$$

$$C_n = \sqrt{w_0} + \sqrt{w_1} + \sqrt{w_2} + \cdots + \sqrt{w_n}$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

$$= \boxed{\sqrt{\frac{1}{2}}\left(\frac{1-\left(\sqrt{\frac{1}{4}}\right)^{n+1}}{1-\sqrt{\frac{1}{4}}}\right)}$$

$$D_n = \frac{1}{w_0} + \frac{1}{w_1} + \frac{1}{w_2} + \cdots + \frac{1}{w_n}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{2}}\left(\frac{1-\left(\frac{1}{\frac{1}{4}}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{\frac{1}{4}}}\right)$$

$$= 2\left(\frac{1-(4)^{n+1}}{1-4}\right)$$

$$= \boxed{\frac{2}{3}((4)^{n+1}-1)}$$

$$E_n = w_0 + 2w_1 + 4w_2 + \cdots + 2^n w_n$$

لدينا:

$$2^n w_n = 2^n\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{4}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)\left(2\times\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

ومنه $(2^n w_n)$ متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $2^0 w_0 = \frac{1}{2}$

$$E_n = w_0 + 2w_1 + 4w_2 + \cdots + 2^n w_n$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}\right)$$

$$= \boxed{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}$$

$$F_n = w_1 + w_3 + w_5 + \cdots + w_{2n-1}$$

$$= w_1\left(\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{2n-1-1+1}}{1-\frac{1}{4}}\right)$$

الخليل للرياضيات

$$= \frac{1}{8}\left(\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{2n-1}}{\frac{3}{4}}\right)$$
$$= \boxed{\frac{1}{6}\left(1-\left(\frac{1}{4}\right)^{2n-1}\right)}$$

$$G_n = \frac{1}{u_0}+\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}+\cdots+\frac{1}{u_n}$$
$$= \frac{1-w_0}{3}+\frac{1-w_1}{3}+\frac{1-w_2}{3}+\cdots+\frac{1-w_n}{3}$$
$$= \frac{1}{3}(1-w_0+1-w_1+1-w_2+\cdots+1-w_n)$$
$$= \frac{1}{3}\left(1\times(n+1)-\underbrace{(w_0+w_1+w_2+\cdots+w_n)}_{A_n}\right)$$
$$= \boxed{\frac{1}{3}\left(n+1-\frac{2}{3}\left(1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)\right)}$$

$$H_n = w_0\times w_1\times w_2\times\ldots\times w_n$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^0\times\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^1\times\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^2\times\ldots\times\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\times\left(\frac{1}{4}\right)^{0+1+2+\cdots n}$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\right)^{\left(\frac{n+1}{2}n\right)}$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{2\left(\frac{n+1}{2}n\right)}$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{(n+1)+(n+1)n}$$
$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{(n+1)^2}$$

$$I_n = \ln(w_0)+\ln(w_1)+\ln(w_2)+\cdots+\ln(w_n)$$
$$= \ln(w_0\times w_1\times w_2\times\ldots\times w_n)$$
$$= \ln(H_n)$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

$$= \ln\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{(n+1)^2}\right)$$
$$= (n+1)^2 \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$
$$= -(n+1)^2 \ln(2)$$

(III

❶ تبيين أنه من أجل كل عدد طبيعي n $t_{n+1} = \frac{1}{\alpha} t_n$:

$$t_{n+1} = \frac{u_{n+1} - (\alpha - 1)}{u_{n+1}}$$
$$= \frac{\frac{\alpha u_n}{u_n + 1} - (\alpha - 1)}{\frac{\alpha u_n}{u_n + 1}}$$
$$= \frac{\alpha u_n - (\alpha - 1)(u_n + 1)}{\alpha u_n}$$
$$= \frac{\alpha u_n - \alpha u_n - \alpha + u_n + 1}{\alpha u_n}$$
$$= \frac{u_n - (\alpha - 1)}{\alpha u_n}$$
$$= \frac{1}{\alpha}\left(\frac{u_n - (\alpha - 1)}{u_n}\right)$$
$$= \frac{1}{\alpha} t_n$$

❷ كتابة عبارة u_n بدلالة n و α:

لدينا:

$$t_{n+1} = \frac{1}{\alpha} t_n$$

ولدينا:

$$t_0 = \frac{u_0 - (\alpha - 1)}{u_0}$$
$$= \frac{\alpha - (\alpha - 1)}{\alpha}$$
$$= \frac{1}{\alpha}$$

ومنه t_n متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{\alpha}$ و حدها الأول $\frac{1}{a}$.

أي:

الخليل للرياضيات

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

$$t_n = \frac{1}{\alpha}\left(\frac{1}{\alpha}\right)^n \Rightarrow \boxed{t_n = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{n+1}}$$

ولدينا:

$$t_n = \frac{u_n - (\alpha - 1)}{u_n} \Rightarrow t_n u_n - u_n = -(\alpha - 1)$$
$$\Rightarrow u_n(t_n - 1) = -(\alpha - 1)$$
$$\Rightarrow u_n = -\frac{\alpha - 1}{t_n - 1}$$
$$\Rightarrow u_n = \frac{\alpha - 1}{1 - t_n}$$
$$\Rightarrow \boxed{u_n = \frac{\alpha - 1}{1 - \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{n+1}}}$$

◄ بالتوفيق في شهادة البكالوريا ►

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com