najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية : عيسى زريمش (حمام دباغ) يوم : 04 /12/ 2017

المستوى : الثانية تسيير واقتصاد المدة : ساعتان

اختبارالثلاثي الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول (04 نقاط) :

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير :

1 / عندما يرتفع سعر منتوج بنسبة 25% ثم ينخفض بنسبة 20% فإن هذا السعر لن يتغير .

2 / زيادة مقدار بنسبة 100% يعني ضرب هذا المقدار في 2 .

3 / إذا كان المعامل الضربي الموافق لتطور ما أصغر من 1 فإن التطور عبارة عن تخفيض .

4 / المتتالية (u_n) المعرفة بحدها العام : $u_n = 5n+3$ هي متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 5$ و أساسها $r = 3$.

التمرين الثاني (04 نقاط):

إذا علمت أن سعر منتوج هو x_0 و بعد تطوره أصبح x_1 ، وأن a هي النسبة المئوية لهذا التطور و k هو المعامل الضربي له .

أكمل الجدول التالي :

x_0	x_1	a	k
212		25%	
	110.4		0.92
425	833		
330		–30%	

التمرين الثالث (07 نقاط):

(u_n) متتالية معرفة بحدها الأول $u_0 = 2$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

لتكن (v_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ : $v_n = u_n + 3$

1 / أحسب : u_1 ، u_2 .

2 / بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها q و حدها الأول ، استنتج اتجاه تغير (u_n).

3 / أكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n , ثم استنتج u_n بدلالة n.

4 / ليكن $S_n = v_0 + v_1 + \ldots\ldots + v_n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \ldots\ldots + u_n$

عين عبارة S_n بدلالة n ثم استنتج عبارة S'_n بدلالة n.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

التمرين الرابع (05 نقاط):

الجدول الموالي يمثل توزيع علامات 39 تلميذ في السنة الثانية تسيير و اقتصاد في الرياضيات :

الفئات	[4;7[	[7;10[	[10;13[	[13;17[	[17;19[
التكرارات	6	9	12	8	4

1 / احسب الوسط الحسابي $\bar{X}$ لهذه السلسلة .

2 / احسب التباين V و الانحراف المعياري σ لهذه السلسلة .

3 / أنشئ المضلع التكراري لهذه السلسلة

** بالتوفيـــــق **

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الأول :

1 / صحيح لأن :

المعامل الضربي الإجمالي لهذا التطور هو $k=\left(1+\frac{25}{100}\right)\left(1-\frac{20}{100}\right)=1$ ومنه فإن هذا السعر لن يتغير

2 / صحيح لأن :

المعامل الضربي لهذا التطور هو $k=\left(1+\frac{100}{100}\right)=2$

وهو ما يعني ضرب هذا المقدار في 2 .

3 / صحيح لأن :

ليكن k المعامل الضربي و a النسبة المئوية لتطور ما .

$k<1$ تكافئ $1+\frac{a}{100}<0$ معناه $a<0$

ومنه فإن التطور عبارة عن تخفيض .

و منه من أجل كل عدد طبيعي n لدينا : $u_{n+1}-u_n>0$.

4 / خطأ لأن :

المتتالية (u_n) المعرفة بحدها العام : $u_n=5n+3$ هي متتالية حسابية حدها الأول $u_0=3$ و أساسها $r=5$.

التمرين الثاني :

x_0	x_1	a	k
212	265	25%	1.25
120	110.4	−8 %	0.92
425	833	96 %	1.96
330	231	−30%	0.7

التمرين الثالث :

لدينا $u_0=2$ و من أجل كل عدد طبيعي n :

$u_{n+1}=2u_n+3$ و $v_n=u_n+3$

1 / حساب u_1 ، u_2 :

$u_1=2u_0+3=7$ ، $u_2=2u_1+3=17$

2 / تبيان أن المتتالية (v_n) هندسية و تعيين أساسها q و حدها الأول :

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا :

$$v_{n+1}=u_{n+1}+3=2u_n+3+3$$
$$=2\left(u_n+3\right)=2v_n$$

ومنه المتتالية (v_n) هي متتالية هندسية أساسها $q=2$ و حدها الأول : $v_0=u_0+3=5$

*** استنتاج اتجاه تغير (v_n) :**

لدينا $u_0>0$ و $q=2$ ومنه $q>1$ و

ومنه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على .

3 / كتابة بدلالة n عبارة الحد العام v_n

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا : $v_n=v_0\cdot q^n$

ومنه $v_n=5\cdot 2^n$

*** استنتاج u_n بدلالة n :**

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا : $u_n=v_n-3$

ومنه $u_n=5\cdot 2^n-3$

4 / عين عبارة S_n بدلالة n :

$$S_n=v_0+v_1+.....+v_n=v_0\frac{q^{n+1}-1}{q-1}=5\times\frac{2^{n+1}-1}{2-1}$$

ومنه $S_n=5\cdot 2^{n+1}-5$

*** استنتاج عبارة S'_n بدلالة n :**

$$S'_n=u_0+u_1+.....+u_n$$
$$=\left(v_0-3\right)+\left(v_1-3\right)+.....+\left(v_n-3\right)$$
$$=S_n-3\left(n+1\right)$$
$$=5\cdot 2^{n+1}-3n-8$$

التمرين الرابع:

الفئات	[4;7[	[7;10[	[10;13[	[13;17[	[17;19[
التكرارات n_i	6	9	12	8	4
أطوال الفئات a_i	3	3	3	4	2
الارتفاع $\frac{n_i}{a_i}\times 2$	4	6	8	4	4

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

1 / حساب الوسط الحسابي $\bar{X}$ للسلسلة :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{5} X_i}{N}$$

$$= \frac{5.5\times 6 + 8.5\times 9 + 11.5\times 12 + 15\times 8 + 18\times 4}{39}$$


$$= \frac{439.5}{39} = 11.26$$

2 / حساب التباين V و الانحراف المعياري σ لهذه السلسلة :

$$V = \frac{\sum_{i=1}^{n} n_i X_i^2}{N} - \bar{X}^2 = \frac{5514.75}{39} - 126.99 = 14.41$$

$$\sigma = \sqrt{V} = 3.796$$

3 / إنشاء المضلع التكراري لهذه السلسلة



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com