najah213.com · نجاح 213

Etablissement privé d'éducation et d'enseignement - L'Opiniâtre

المؤسسة الخاصة للتربية و التعليم - أوبينياتر

المستوى: الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد	جانفي 2021
الفرض الثاني للثلاثي الأول في الرياضيات	المدة: 1 سا

تمرين:

لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{4}$.

1) احسب الحدود u_1، u_2 و u_3.

2) أبرهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_n < 2$.

3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n - 2$.

أبيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدها الأول.

باكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 2 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

جما هي نهاية المتتالية (u_n)؟

4) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ واستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 3\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2n - 2$.

بالتوفيق

الأستاذ زوبير عبد الرحيم

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التصحيح النموذجي

الحل :

لدينا: (u_n) متتالية عددية معرفة بـ $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{4} \end{cases}$

معناه: $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{4}$ $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + \frac{2}{4}$

1) حساب الحدود u_1، u_2 و u_3:

$$u_1 = \frac{3}{4}u_0 + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}(1) + \frac{2}{4} = \frac{3+2}{4} = \frac{5}{4}$$

$$u_2 = \frac{3}{4}u_1 + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}\left(\frac{5}{4}\right) + \frac{2}{4} = \frac{15+8}{16} = \frac{23}{16}$$

$$u_3 = \frac{3}{4}u_2 + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}\left(\frac{23}{16}\right) + \frac{2}{4} = \frac{69+32}{64} = \frac{101}{64}$$

2) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن، $u_n < 2$:

نسمي هذه الخاصية بـ $P(n)$

المرحلة **01**: من أجل $n = 0$

لدينا: $u_0 = 1 < 2$ إذن: $P(0)$ صحيحة.

المرحلة **02**:

- نفرض صحة الخاصية $P(n)$ أي: $u_n < 2$ (فرضية التراجع)
- ونبرهن صحة الخاصية $P(n+1)$ أي: $\boxed{u_{n+1} < 2}$

البرهان: حسب فرضية التراجع، لدينا: $u_n < 2$

ومنه: $\frac{3}{4}u_n < \frac{6}{4}$

وعليه: $\frac{3}{4}u_n + \frac{2}{4} < \frac{6}{4} + \frac{2}{4}$

أي: $\boxed{u_{n+1} < 2}$

وبالتالي: $P(n+1)$ صحيحة.

إذن: حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع من اجل كل عدد طبيعي n، $u_n < 2$.

3) لدينا: (v_n) متتالية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n - 2$.

لتبيان أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدها الأول:

نكتب v_{n+1} بدلالة v_n.

لدينا: $v_n = u_n - 2$، ومنه:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{3}{4}u_n + \frac{2}{4} - 2 = \frac{3}{4}u_n - \frac{6}{4} = \frac{3}{4}u_n - \frac{3\times2}{4} = \frac{3}{4}(u_n - 2) = \frac{3}{4}v_n$$

أي: $\boxed{v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n}$.

إذن: (v_n) متتالية هندسية أساسها $\boxed{q = \frac{3}{4}}$ وحدها الأول $\boxed{v_0 = u_0 - 2 = 1 - 2 = -1}$.

بكتابة عبارة v_n بدلالة n:

لدينا: $v_n = v_0 \times q^n$ ومنه: $\boxed{v_n = -\left(\frac{3}{4}\right)^n}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 2 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$:

لدينا: $v_n = u_n - 2$ إذن: $\boxed{u_n = -\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2}$.

جـ حساب نهاية المتتالية (u_n):

لدينا: $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$ لأن $-1 < \frac{3}{4} < 1$، إذن: $\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 2}$.

4) حساب بدلالة n المجموع S_n حيث $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$:

لدينا: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0\left(\frac{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n-0+1}}{1-\frac{3}{4}}\right) = -\left(\frac{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{\frac{1}{4}}\right)$

ومنه: $S_n = -4\left(1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) = 3\left(\frac{3}{4}\right)^n - 4$.

استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن، $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 3\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2n - 2$:

لدينا: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 + 2) + (v_1 + 2) + \cdots + (v_n + 2)$

ومنه: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) + 2(n - 0 + 1)$

وعليه: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = S_n + 2n + 2 = 3\left(\frac{3}{4}\right)^n - 4 + 2n + 2 = 3\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2n - 2$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com