najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — **مديرية التربية لولاية غرداية**

اختبار الثلاثي الثالث — **متقن القرارة و ثانوية بيوض**

الشعبة : الثالثة علوم تجريبية — **2017/05/09**

امتحان البكالوريا التجريبية في مادة : علوم الطبيعة والحياة — **المدة :04 سا و30د**


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

التمرين الأول: (05 نقاط)

بعد تركيبها تأخذ البروتينات بنيات فراغية مختلفة ترجع في الأصل إلى الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها.

I- يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1) البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد لجزيئة بروتينية ، مدعمة بالشكل (ب) الذي يعرض التفاصيل الجزيئية للجزء المؤطر منها.



الوثيقة (1)

- يمثل الجدول الموالي السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية المتدخلة في ثبات بنية الجزء المؤطر من الشكل (أ) من الوثيقة (1).

Gly	Ala	Ser	Asp	Ileu	Gln	Cys	Lys
H	CH_3	CH_2OH	CH_2 – COO^-	$HC(CH_3)-CH_2-CH_3$	$CH_2-CH_2-C(=O)-NH_2$	CH_2 – SH	$CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-NH_3^+$

الجدول (1)

1- سمّ البنيات 1 ، 2 ، 3 في الشكل (أ).

2- مثّل بالرسم أنواع الروابط التي تضمن استقرار كل من البنيتين 2 و 3 منه.

3- أذكر أنواع الروابط الممثلة بالأحرف في الشكل ب.

4- بناء على المعطيات السابقة ، حدّد المستوى البنيوي للجزيئة الكاملة الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثاني: (07 نقاط)


تساهم العصبونات بتدخل بروتيناتها الغشائية ، في استقبال وإرسال الإشارات الكهروكيميائية التي تضمن وظائف الاتصال والتنظيم في العضوية.

I- سمحت تقنية Patch-Clamp بعزل قطعة صغيرة من غشاء الليف العصبي، تخضع هذه القطعة إلى كمون مفروض (0mV) ثم نقيس التيارات الغشائية في حالات مختلفة ممثلة في الوثيقة (1).

تمثل الوثيقة 1(أ) الشروط التجريبية ، بينما توضح الوثيقة 1(ب) النتائج المتحصل عليها :

التجربة	الشروط التجريبية
أ	الوسط خارج خلوي عادي
ب	الوسط خارج خلوي يحتوي على إنزيم البروناز

الوثيقة 1(أ)



الوثيقة 1(ب)


1- قدم تحليلا مقارنا لنتائج التسجيلات أ وب من الوثيقة 1(ب) ، ماذا تستنتج؟

2- مثّل تسجيل تغير الكمون الغشائي المتوقع في الحالتين أوب.

3- ماذا تستنتج حول الآليات المتسببة في تغير الكمون الغشائي؟

II- نسجل على مستوى العصبونات تغيرات الاستقطاب التي تتعرض لها تحت تأثير مختلف المبلغات العصبية.













ننجز التجارب التالية على التركيب التجريبي الممثل في الوثيقة (2).



الوثيقة (2)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التجارب	التسجيل في م1	التسجيل في م2	التسجيل في م3
تجربة 1: نحدث تنبيها معزولا للعصبون A بشدة I_1			
تجربة 2: نحدث تنبيها معزولا للعصبون A بشدة I_2 ($I_2>I_1$)			
تجربة 3: نحدث تنبيهين متقاربين للعصبون A بشدة I_2			
تجربة 4: نحدث تنبيهين في آن واحد للعصبون A ثم B بشدة I_2			

1- أ- من خلال معلومات التجربة 1 والتسجيل A1، استنتج خاصيةً لليف العصبي.

ب- حلل نتائج التجربتين 1 و2 مستنتجا:

* خاصية ثانية لليف العصبي
* طبيعة المشبك S1.

2- أ- حلل التسجيلات C1 ، C2 و C3 مستنتجا طبيعة المشبك S2.

ب- فسر التسجيل D2 مستنتجا:

* وظيفة العصبون C
* طبيعة المشبك S3.


3- انطلاقا من معارفك والمعلومات المستخلصة من التجارب السابقة فسر التسجيل D3.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يمثل النشاط الإنزيمي مثالا جيدا عن الأدوار الوظيفية التي تؤديها الجزيئات البروتينية أين تتجسد قدرتها في سيرورة التفاعلات الكيميائية بناء على ما تفرضه متطلبات الخلية أو العضوية.

I- خلال هذه الدراسة نسعى إلى التعرف على بعض الجوانب المتعلقة بنشاط إنزيمات الأكسدة الحلقية المعروفة اختصارا بـ COX الذي يرتبط نشاطها بالاستجابة الالتهابية . يمثل البروستاغلاندين أحد الوسائط الالتهابية المركبة خلال الرد الالتهابي حيث يتسبب إفرازه في توسيع الأوعية الدموية وارتفاع نفاذيتها وهو ما يترجم إلى ظهور أعراض غير مرغوب فيها (آلام موضعية في مستوى منطقة الإصابة).



الشكل (1)	الشكل (2)	الشكل (3)

الوثيقة (1)

1- معتمدا على معطيات الشكل (1) للوثيقة (1) ما هي المعلومات التي تقدمها مقارنتك للتفاعلين1مع 4 ثم 2 مع 3، ثم استنتج الخاصية المدروسة المميزة للنشاط الإنزيمي.

2- قدم معادلة كيميائية تترجم التفاعل المبين في الشكل (2) للوثيقة (1) ، مبرزا نوعه.

3- معتمدا على معطيات الشكل (3) للوثيقة (1) :

أ- قارن بين الموقع الفعال لكل من إنزيم COX1 و COX2.


ب-كيف تبرر إجابتك في (4-أ) التأثير النوعي المستهدف من خلال التفاعلين 2 و 3.

II- يمثل الجدول المبين في الشكل (1) من الوثيقة (2) معطيات تجريبية متعلقة بالنشاط الإنزيمي لإنزيم COX2 بينما يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة تطور الأنشطة الإنزيمية لكل من إنزيم COX1 و COX2 ضمن أوساط تتضمن تراكيز متزايدة لمركب كيميائي ذو تأثير علاجي يتمثل في دواء Ibuprofène في وجود تلراكيز معتبرة لمادة التفاعل (حمض أراشيدونيك).

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الخـــلل الجـــيني	1- طفرة مست الحمضين الأمينيين Tyr 385 و Arg 120	2- طفـرة مسـت الحمضين الأمينيين His 90و Arg 513
خصائص وسط التفاعل	تركيز عال لجزيئات COX2 الحرة + غياب البروستغلاندين	تركيز منخفض لجزيئات COX2 الحـرة + غياب البروستغلاندين

الشكـــل (1)



الشكـــل (2)

الوثيقة (2)


1- من خلال تحليلك للنتائج التجريبية لجدول الشكل (1) من الوثيقة (2) ، فسر خصائص أوساط التفاعل في الحالتين.

2- ماهي المعلومة المستخلصة من خلال هذه الدراسة؟

3- حلل نتائج الشكل (2) للوثيقة (2). ماذا تستنتج؟

4- اقترح فرضية يمكن من خلالها تفسير تأثير مركب Ibuprofène.

III- باستعمال برنامج Rastop تم الحصول على الشكلين (1 و 2) للوثيقة (3) والتي تمثل نماذج جزيئية لإنزيم COX1 بوجود الركيزة الطبيعية (حمض أراشيدونيك) ودواء Ibuprofène تبرز حيز الارتباط في كل حالة.



الشكـــل (2) الشكـــل (1)

الوثيقة (3)

1- أ- هل تؤكد معطيات الشكلين (1و2) صحة فرضيتك السابقة المقترحة في II-4؟ علّل إجابتك.

ب- نمذج النشاط الإنزيمي لإنزيم COX1 (في حالة وجود Ibuprofène وفي حالة غيابه).

جـ- اشرح كيف يؤثر دواء Ibuprofène على اختفاء الأعراض الالتهابية (التقليل من حدة الآلام الموضعية خلال الرد الالتهابي).

2- إذا علمت أن دواء Aspirine يمتلك نفس الخصائص العلاجية مع Ibuprofène. ما هي الخصائص الجزيئية التي تبرز هذه الحالة .

3- بالاعتماد على مكتسباتك بين كيف تساهم القيم المثلى لكل من pH ودرجة الحرارة في بلوغ ذروة كفاءة التحفيز الإنزيمي.


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

التمرين الأول : (05 نقاط)

يخضع بناء البروتينات في خلايا العضوية لآليات دقيقة تكسبها تخصصا وظيفيا عاليا، ولمعرفة إحدى مراحل تركيب البروتين نقترح عليك الرسم التخطيطي الموضح في الوثيقة (1).



الوثيقة (1)

1- ضع البيانات حسب الترقيم الممثّل في الوثيقة (1).

2- سمّ الظاهرة التي سمحت بالحصول على العنصر رقم 5.


3- حدد عدد الروابط الفوسفاتية الغنية بالطاقة اللازم إماهتها لتركيب هذا الجزء من البروتين. علّل إجابتك.

4- أكتب نصا علميا تشرح من خلاله الخطوات الأساسية لهذه المرحلة من تركيب البروتين.

التمرين الثاني : (07 نقاط)

لدراسة بعض مظاهر الاستجابة المناعية الموجهة ضد فيروس EBV الذي يصيب 90% من سكان العالم ، وهو يستهدف نوعيا اللمفاويات B ، نقترح الدراسة التالية :

I- مكن تتبع تطور كمية الأجسام المضادة في دم شخص مصاب ب EBV من الحصول على **الوثيقة (1)**.



الوثيقة (1)

1- انطلاقا من تحليلك لمنحنيي **الوثيقة (1)**:

أ- حدد نمط الاستجابة المناعية المتدخلة ضد EBV .

ب - حدد نوع الخلايا المناعية المسؤولة عن هذه الاستجابة المناعية .

2- أ- علل إنتاج نوعين من الأجسام المضادة (ضد VCA وضد EBNA)، وماذا تستنتج حول خصائص هذه الاستجابة المناعية.

ب- اقترح فرضية تفسر بقاء الأجسام المضادة الموجهة ضد هذا الفيروس في الجسم لعدة سنوات.

EBNA و VCA : ببتيدات تنتمي لفيروس EBV

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

II- 1- للتأكد من صحة الفرضية المقترحة نقترح المعطيات والتجارب الممثلة **بالوثيقة (2أ)**.

	اللمفاويات B	اللمفاويات B الذاكرة
حالة فيروس EBV داخل اللمفاويات	نشيطة	غير نشيطة
عرض المحددات المستضادية للفيروس	نعم	لا
تركيب فيروسات جديدة وتحريرها في الدم	نعم	لا

الوثيقة (2 أ)

أ- هل تسمح لك معطيات **الوثيقة (2أ)** بالتأكد من صحة الفرضية المقترحة ؟ وضح ذلك.

2-


- تم زرع لمفاويات B و T (تتميز بنفس مؤشر الذات) أخذت من أشخاص سليمين أو مصابين بـ EBV أو بفيروس آخر، في أوساط زرع ملائمة . ويلخص جدول **الوثيقة (2ب)** الظروف التجريبية والنتائج المحصل عليها:

الأوساط	محتوى الوسط	نسبة تخريب اللمفاويات B
1	لمفاويات B مصابة ب EBV لمفاويات T استخلصت من شخص مصاب ب EBV	% 100
2	لمفاويات B غير مصابة ب EBV لمفاويات T استخلصت من شخص مصاب ب EBV	% 0
3	لمفاويات B ذاكرة مصابة ب EBV لمفاويات T استخلصت من شخص مصاب ب EBV	% 0
4	لمفاويات B مصابة بفيروس مختلف عن EBV لمفاويات T استخلصت من شخص مصاب ب EBV	% 0
5	لمفاويات B مصابة ب EBV لمفاويات T استخلصت من شخص غير مصاب ب EBV	% 0

الوثيقة (2 ب)

- مكنت الملاحظة بالمجهر الإلكتروني للخلايا المتواجدة بالوسط 1 من الحصول على الصورتين الممثلتين **بالوثيقة (2ج)**.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com



الوثيقة (2ج)

أ- حدد نوع الخلايا LT الممثلة في صورتي **الوثيقة (2ج)**.

ب- حدد نمط الاستجابة المناعية المتدخلة ضد فيروس EBV.

ج- ما هي المعلومات المستخلصة من مقارنتك لنتائج الأوساط 2 ، 3 ، 4 ، 5 مع الوسط 1.


3- انطلاقا مما سبق ومعلوماتك، أنجز رسمًا تخطيطيا وظيفيا توضح فيه مراحل الاستجابة المناعية المؤدية إلى إقصاء الفيروس EBV.

التمرين الثالث : (08 نقاط)

تقوم الخلايا بهدم المواد العضوية قصد استخلاص الطاقة الكيميائية الكامنة فيها وتحويلها إلى ATP. لفهم كيف يتم ذلك نقترح عليك في هذه الدراسة بعض آليات هذا التحويل الطاقوي.

I- لتحديد العلاقة بين تفاعلات استهلاك ثنائي الأكسجين وتركيب ATP على مستوى الميتوكندري ، نقدم المعطيات التجريبية الآتية :

التجربة الأولى : وضعت ميتوكوندريات معزولة من خلايا حية في وسط ملائم مشبع بثنائي الأوكسجين (O_2) ، ثم تم تتبع تطور تركيز كل من ثنائي الأوكسجين المستهلك و ATP المنتجة في هذا الوسط . تقدم **الوثيقة (1)** الظروف التجريبية والنتائج المحصل عليها .



الوثيقة (1)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1- حلل معطيات الوثيقة (1) ، ثم استنتج العلاقة بين استهلاك ثنائي الأوكسجين وإنتاج ATP على مستوى الميتوكندري.

2- على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكندري توجد مجموعة من المركبات الناقلة للإلكترونات .

- وضح برسم تخطيطي تموضع هذه المركبات على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

-II

<u>التجربة الثانية</u> : بعد عزل ميتوكندريات من خلايا حية ، تمت إزالة الأغشية الخارجية لهذه العضيات ، ثم وضعت في محلول خال من ثنائي الأوكسجين يحتوي على معطي للإلكترونات ($NADH,H^+$)، بعد ذلك تم تتبع تغير تركيز H^+ في المحلول قبل وبعد إضافة ثنائي الأوكسجين . تعطي **الوثيقة (2أ)** ظروف ونتائج هذه التجربة.



الوثيقة (2أ)

1- اعتمادا على معطيات **الوثيقة (2أ)** وعلى مكتسباتك ، حلل تطور تركيز H^+ في المحلول ، ثم فسر التغير في تركيز H^+ المسجل مباشرة بعد إضافة O_2.

<u>التجربة الثالثة</u> : تمت حسب المراحل الآتية :

- عزل المركبات البروتينية I و III و V (نواقل الإلكترونات) من الغشاء الداخلي للميتوكندري؛
- دمج كل مركب على حدى في حويصلات مغلقة شبيهة بالغشاء الداخلي للميتوكندري ، لكنها خالية من أي بروتين، كما هو مبين في الشكل أ من الوثيقة (2ج) ؛
- وضع كل حويصلة من الحويصلات المحصل عليها في المرحلة السابقة في محلول معلق يحتوي على معطي الإلكترونات الخاص بالمركب المدمج في غشاء الحويصلة.

يقدم جدول الشكل ب من الوثيقة **(2 ب)** النتائج المحصل عليها بعد إضافة مستقبل الإلكترونات الخاص بكل مركب مدمج.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213



	المركب المدمج في الحويصلة	معطي الالكترونات	متقبل الالكترونات	النتيجة
المحلول 1	المركب I			
المحلول 2	المركب III			
المحلول 3	المركبV			


الوثيقة (2 ب)

2- اعتمادا على معطيات الرسم التخطيطي المنجز سابقا والشكل (ب) من الوثيقة (2ب) :

أ- أكمل جدول الشكل (ب) .

ب- استنتج دور المركبات البروتينية I و III و V في تفاعلات استهلاك ثنائي الأوكسجين على مستوى الميتوكندري.

<u>التجربة الرابعة</u> : نخضع ميتوكندريات معزولة لتأثير موجات فوق صوتية قصد تقطيع أغشيتها الداخلية وتكوين حويصلات مغلقة تحمل كريات مذنبة موجهة نحو الخارج (الشكل أ من الوثيقة 2ج). توضع هذه الحويصلات في محاليل مختلفة من حيث pH وتحتوي على ADP و Pi. يبين جدول الشكل ب من الوثيقة (2ج) الظروف التجريبية والنتائج المحصل عليها.



الظروف التجريبية	pHi<pHe	pHi > pHe	pHi = pHe
النتيجة	تركيب ATP	عدم تركيب ATP	عدم تركيب ATP

الشكل ب

الوثيقة (2 ج)

3- باستغلالك **للوثيقة (2 ج)**، حدد الشرط الضروري لتركيب ATP على مستوى الميتوكندري. علّل إجابتك.

III- اعتمادا على ما سبق ، بين العلاقة بين تفاعلات استهلاك ثنائي الأوكسجين وتركيب ATP على مستوى الميتوكندري.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com