najah213.com · نجاح 213

ثـانوية الشهداء السبعة بوعيفل – سيدي عيش — السنــة الدراسيــة: 2020/2019

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

المستوى: 3 ع تج — **المــدة :** $\log 10$ سا و $\ln\left(e^{30}\right)$ د

التمرين الأول: في كل مما يلي، يوجد اجابة واحدة صحيحة عينها مع التبرير:

1) الكتابة المبسطة للعدد A حيث : $A=\ln\left(e+e^{-1}+2\right)-2\ln\left(e+1\right)$ هي:

أ)- $A=e+1$ ب)- $A=0$ ج)- $A=-1$

2) مجموعة حلول المتراجحة: $\ln\left(2-x\right)+\ln\left(x+3\right)-\ln 4\geq 0$ هي:

أ)- $s=[1;2]$ ب)- $s=]-2;1[$ ج)- $s=[-2;1]$

3) الحل العام للمعادلة التفاضلية: $2y-y'+1=0$ هو الدوال f حيث: (c ثابت حقيقي)

أ)- $f\left(x\right)=ce^{2x}-\frac{1}{2}$ ب)- $f\left(x\right)=ce^{x}-\frac{1}{2}$ ج)- $f\left(x\right)=ce^{2x}-2$

4) الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f\left(x\right)=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$ هي:

أ)- دالة زوجية ب)-دالة فردية ج)- ليست زوجية و لا فردية

5) f الدالة المعرفة على $[-1;1]-\{0\}$ بـ: $f\left(x\right)=1+\frac{\sqrt{1-x^{2}}}{x}$، $\left(C_f\right)$ تمثيلها البياني في المعلم $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$.

❶ الدالة المشتقة للدالة f هي:

أ)- $f'\left(x\right)=\frac{1}{x^{2}\sqrt{1-x^{2}}}$ ب)- $f'\left(x\right)=\frac{-1}{x^{2}\sqrt{1-x^{2}}}$ ج)- $f'\left(x\right)=\frac{2}{x^{2}\sqrt{1-x^{2}}}$

❷ $\left(C_f\right)$ يقبل عند النقطة ذات الفاصلة 1:

أ)- مماسا معادلته: $y=x$ ب)- نقطة زاوية ج)- نصف مماس موازي لمحور التراتيب.

❸ المعادلة $f\left(x\right)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث:

أ)- $\alpha\in]1,01;1,02[$ ب)- $\alpha\in]0,06;0,07[$ ج)- $\alpha\in]-0,8;-0,7[$

التمرين الثاني:

I)- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ كما يلي: $f\left(x\right)=\frac{\left(x-2\right)^{2}}{x^{2}-1}$

و ليكن $\left(C_f\right)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$.

1) أحسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة من مجموعة التعريف . فسر النتيجة بيانيا؟.

2) أدرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ و شكل جدول تغيراتها.

3) أدرس الوضع النسبي لـ $\left(C_f\right)$ بالنسبة للمستقيم المقارب الأفقي، ثم حدد نقطة تقاطعهما A .

4) عين احداثيات نقاط تقاطع $\left(C_f\right)$ مع حاملي محوري الإحداثيات.

5) أكتب معادلة المماس $\left(D\right)$ للمنحنى $\left(C_f\right)$ عند النقطة A.

6) أنشئ $\left(D\right)$ و $\left(C_f\right)$.

7) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد و اشارة حلول المعادلة: $x^{2}\left(1-m^{2}\right)-4x=-4-m^{2}$.

II)- نعتبر الدالة g المعرفة بـ: $g\left(x\right)=\frac{\left(e^{x}-2\right)^{2}}{\left(e^{x}-1\right)\left(e^{x}+1\right)}$. و ليكن $\left(C_g\right)$ تمثيلها البياني في $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$:

1) عين مجموعة تعريف الدالة g .

2) بين أن: $\left(e^{x}\right)'f'\left(x\right)=e^{x}g'\left(x\right)$.

أستاذتكم تتمنى لكم كل التوفيق و النجاح _ بن صافية_

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الإجابة المقترحة

التمرين الأول:

الإجابة الصحيحة	التبرير
1).....ج	$A=\ln\left(e+e^{-1}+2\right)-2\ln\left(e+1\right)=\ln\left(e+e^{-1}+2\right)-\ln\left(e+1\right)^2=\ln\left(\dfrac{e+e^{-1}+2}{\left(e+1\right)^2}\right)$ $=\ln\left(\dfrac{e+\dfrac{1}{e}+2}{\left(e+1\right)^2}\right)=\ln\left(\dfrac{\dfrac{e^2+1+2e}{e}}{\left(e+1\right)^2}\right)=\ln\left(\dfrac{\left(e+1\right)^2}{e}\times\dfrac{1}{\left(e+1\right)^2}\right)=\ln\left(\dfrac{1}{e}\right)=\ln\left(e^{-1}\right)=-1$
2).....ج	المجموعة المرجعية للمتراجحة هي: $D=]-3;2[$. منه: $\ln\left(2-x\right)+\ln\left(x+3\right)-\ln 4\geq 0$ أي: $\ln\left(2-x\right)+\ln\left(x+3\right)\geq\ln 4$ تكافيء: $\ln\left(\left(2-x\right)\left(x+3\right)\right)\geq\ln 4$ أي: $\left(\left(2-x\right)\left(x+3\right)\right)\geq 4$ أي: $-x^2-x+2\geq 0$ و بما أن: x | $-\infty$ -2 1 $+\infty$ $-x^2-x+2$ | - + - فان: $s=[-2;1]$
3).....أ	$2y-y'+1=0$ تكافيء $y'=2y+1$ حلولها هي الدوال من الشكل: $f\left(x\right)=ce^{2x}-\dfrac{1}{2}$; $c\in\mathbb{R}$
4).....أ	الدالة f زوجية لأن: من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ لدينا: $-x\in\mathbb{R}$ و: $f\left(-x\right)=\dfrac{e^{-x}+e^{x}}{2}=f\left(x\right)$
5) ❶ .....ب	الدالة المشتقة للدالة f هي: $f'\left(x\right)=0+\dfrac{\dfrac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}\times x-1\times\sqrt{1-x^2}}{x^2}=\dfrac{\dfrac{x^2-\sqrt{1-x^2}^2}{\sqrt{1-x^2}}}{x^2}=\dfrac{-1}{x^2\sqrt{1-x^2}}$
❷ .....ج	$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f\left(x\right)-f\left(1\right)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1+\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}-0}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+\sqrt{1-x^2}}{x\left(x-1\right)}=-\infty$ الدالة f غير قابلة للإشتقاق عند 1 منه (C_f) يقبل نصف مماس موازي لحامل محور التراتيب.
❸ .....ج	مبرهنة القيم المتوسطة

التمرين الثاني:

الجزء الأول: $f\left(x\right)=\dfrac{\left(x-2\right)^2}{x^2-1}$، $D_f=\mathbb{R}-\{-1;1\}$

1) حساب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف:

$\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{x^2}=1$; $\lim\limits_{x\to-\infty}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2}{x^2}=1$

$\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ <}}f\left(x\right)=\dfrac{\left(-1-2\right)^2}{\left(-1\right)^2-1}=+\infty$; $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}}f\left(x\right)=\dfrac{\left(-1-2\right)^2}{\left(-1\right)^2-1}=-\infty$

$\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}}f\left(x\right)=\dfrac{\left(1-2\right)^2}{\left(1\right)^2-1}=-\infty$; $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}}f\left(x\right)=\dfrac{\left(1-2\right)^2}{\left(1\right)^2-1}=+\infty$

نستنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين عموديين موازيين لمحور التراتيب معادلته: $x=-1$ ، $x=1$.

و مستقيما مقاربا أفقيا معادلته: $y=1$.

2) **حساب المشتقة:** f دالة معرفة و قابلة للاشتقاق على و دالتها المشتقة هي:

$f'\left(x\right)=\dfrac{2\left(x-2\right)\left(x^2-1\right)-2x\left(x-2\right)^2}{\left(x^2-1\right)^2}$

$=\dfrac{2\left(x-2\right)\left[\left(x^2-1\right)-x\left(x-2\right)\right]}{\left(x^2-1\right)^2}$

$=\dfrac{2\left(x-2\right)\left(-1+2x\right)}{\left(x^2-1\right)^2}=\dfrac{4x^2-10x+4}{\left(x^2-1\right)^2}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

اتجاه تغيرالدالة f:

$x-2=0$ أو: $-1+2x=0$

$x=2$ أو: $x=\frac{1}{2}$

x	$-\infty$		-1		$\frac{1}{2}$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$		$-$		$-$		$+$	

الدالة f متزايدة تماما على المجالات $]-\infty;1]$ و $\left[-1;\frac{1}{2}\right]$ و $]2;+\infty[$ ومتناقصة تماما $\left[1;\frac{1}{2}\right]$ و $[1;2[$.

جدول التغيرات:

x	$-\infty$		-1		$\frac{1}{2}$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$		$-$		$-$		$+$	
$f(x)$											

3) دراسة الوضع النسبي ل (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب الأفقي: ندرس اشارة الفرق:

$$(f(x)-1)=\frac{(x-2)^2}{x^2-1}-1=\frac{-4x+5}{x^2-1}$$

x	$-\infty$		-1		1		$5/4$		$+\infty$
$-4x+5$		$+$		$+$		$+$		$-$	
x^2-1		$+$		$-$		$+$		$+$	
$\frac{-4x+5}{x^2-1}$		$+$		$-$		$+$		$-$	
الوضع النسبي ل (C_f) بالنسبة لـ (Δ)									

نقطة التقاطع هي: $A\left(\frac{5}{4};1\right)$

4) حساب إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات:

مع محور الفواصل:

$f(x)=0$ معناه: أي: $\begin{cases}(x-2)^2=0\\ x^2-1\neq 0\end{cases}$ $x=2$

إذن: $(C_f)\cap(xx')=\{(2;0)\}$.

مع محور التراتيب:

$(C_f)\cap(yy')=\{(0;-4)\}$ منه: $f(0)=-4$

5) معادلة المماس عند النقطة $A\left(\frac{5}{4};1\right)$:

$$(T):\ y=f'\left(\frac{5}{4}\right)\left(x-\frac{5}{4}\right)+f\left(\frac{5}{4}\right)$$

$$y=\frac{-64}{9}\left(x-\frac{5}{4}\right)+1$$

$$y=-7,11x+9,89$$

6) الإنشاء: (أخر الورقة)

7) المناقشة حسب قيم m عدد و إشارة حلول المعادلة:

$(x+m)(x+1)^2-x^3-2x^2=0$:

$$x^2(1-m^2)-4x=-4-m^2$$

$$(x^2-4x+4)-m^2x^2+m^2=0$$

$$(x-2)^2-(m^2x^2-m^2)=0$$

تكافئ: $(x-2)^2=m^2(x^2-1)$

$$\frac{(x-2)^2}{(x^2-1)}=m^2$$

منه: $f(x)=m^2$

حلول المعادلة هي $f(x)=m^2$ فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) و المستقيم الذي معادلته: $y=m^2$.(المناقشة أفقية.)

- $m^2\in]0;1[$ أي: $0\prec m^2\prec 1$ منه: $-1\prec m\prec 1$ المعادلة لها حلان موجبان.
- $m^2=0$ أي: $m=0$ للمعادلة حل مضاعف.
- $m^2=1$ أي: $m=1$ أي: $m=-1$ للمعادلة حل وحيد موجب.
- $m^2\in]1;+\infty[$ أي: $m\in]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ للمعادلة حلان أحدهما موجب و الأخرسالب.

الجزء الثاني: لدينا: $g(x)=f(e^x)$

1) مجموعة التعريف:

$$D_g=\{x\in\mathbb{R}\ /\ e^x-1\neq 0\ ;\ e^x+1\neq 0\}$$


$$=\{x\in\mathbb{R}\ /\ e^x\neq 1\ ;\ e^x\neq -1\}$$

$$=\{x\in\mathbb{R}\ /\ x\neq 0\}=\mathbb{R}^*$$

2) بين أن: $g'(x)=e^xf'(e^x)$.

لدينا: $g(x)=f(e^x)$

منه: $g'(x)=e^xf'(e^x)$



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com