najah213.com · نجاح 213

ثانوية حويشيتي محمد الضاية غرداية **الموسم الدراسي :** 2021/2020

الشعبة: ثالثة رياضيات و تقني رياضي

jamalaze2000@gmail.com
فيزياء الضاية f

الفرض الثاني في مادة العلوم الفيزيائية **المدة: ساعة و نصف**

التمرين الأول: (14 نقطة)

الميثيل أمين مركب عضوي و هو أساس حسب برونشتد ، صيغته نصف المنشورة CH_3NH_2 ، يتميز برائحة تشبه رائحة السمك و له استعمالات عديدة في المجال الصناعي و الطبي...


- **المعطيات:**
- جميع القياسات تمت عند درجة حرارة $25°C$.
- الثابت pK_e للجداء الشاردي للماء هو $pK_e = 14$.
- الجدول المقابل يوضح بعض الكواشف الملونة و مجال تغيرها اللوني

الكاشف الملون	مجال التغير اللوني
فينول فتالين	8,2 -- 10
أحمر الكلوروفيل	5,2 -- 6,8
هيليانتين	3,1 -- 4,4

I. تفاعل الميثيل أمين مع الماء

نحضر محلول مائي (S) للميثيل أمين حجمه V و تركيزه $C = 2{,}00 \times 10^{-2} mol.L^{-1}$. أعطى قياس pH هذا المحلول القيمة $pH = 11{,}5$.

1) أنشئ جدولا لتقدم تفاعل الميثيل أمين مع الماء مبرزا فيه حالة التوازن.
2) بين أن النسبة النهائية لتقدم التفاعل τ_f تكتب على الشكل: $\tau_f = \frac{10^{pH-pK_e}}{C}$. أحسبها. ماذا تستنتج؟
3) عبر عن كسر التفاعل $Q_{r,éq}$ عند التوازن بدلالة C و τ_f. أحسب قيمته.
4) تحقق أن قيمة ثابت الحموضة للثنائية $\left(CH_3NH_3^+{}_{(aq)}/CH_3NH_{2\,(aq)}\right)$ هي $pK_a = 10{,}7$.
5) بيّن عل محور pH الممثل أسفله، مجال التغلب لكل نوع من النوعين : $CH_3NH_3^+$ و CH_3NH_2.



II. معايرة الميثيل أمين بمحلول كلور الهيدروجين


نعاير محلول (S_B) من الميثيل أمين حجمه $V_B = 20\ mL$ و تركيزه C_B بواسطة محلول (S_A) لحمض كلور الهيدروجين $\left(H_3O^+{}_{(aq)} + Cl^-{}_{(aq)}\right)$ تركيزه المولي $C_A = 5{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol.L}^{-1}$. مكنتنا النتائج المحصل عليها من رسم المنحنى $pH = f(V_B)$ الممثل في الشكل1.

1) أذكر عناصر التجهيز التجريبي اللازمة لتحقيق هذه المعايرة.
2) اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل المعايرة.
3) احسب ثابت التوازن K الموافق لمعادلة تفاعل المعايرة. ماذا تستنتج؟

jamalaze2000@gmail.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213




الشكل 1

4) حدّد إحداثيتي نقطة التكافؤ V_{AE} و pH_E .
5) احسب التركيز C_B للمحلول (S_B).
6) ما الكاشف الملون المناسب لهذه المعايرة؟ برر جوابك.
7) جد قيمة النسبة $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]}$ عند إضافة حجم $V_A = 8\ mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين.

التمرين الثاني: (6نقاط)

القمر الاصطناعي نايلسات(NILESAT) يستعمل للاتصالات و البث الإذاعي، حيث يبدو ساكنا بالنسبة لمراقب يوجد على سطح الأرض. يرتفع القمر نايلسات عن سطح الأرض بالارتفاع h ويدور حول الأرض وفق مسار دائري.



الشكل 2

- **المعطيات:**
- ثابت الجذب العام: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,(SI)$
- كتلة الأرض: $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ Kg
- دور دوران الأرض حول محورها: $T = 86164\ s$
- نصف قطر الأرض: $R_T = 6378$ Km

1) ما هو المرجع المناسب لدراسة حركة القمر الاصطناعي نايلسات؟ عرفه.
2) مثل على الشكل...، بدون سلم، شعاع سرعة القمر $\vec{v}$ و قوة الجذب العام $\vec{F}_{T/S}$ التي تطبقها الأرض على القمر الإصطناعي (S).
3) بيّن أن حركة القمر الاصطناعي دائرية منتظمة.
4) بيّن أن $\frac{T^2}{(R_T+h)^3} = K$ مع تحديد عبارة K بدلالة G و M_T. كيف يسمى هذا القانون؟
5) أحسب h ارتفاع القمر الاصطناعي نايلسات عن سطح الأرض.

jamalaze2000@gmail.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تصحيح الفرض الثاني

فيزياء الضابة f

jamalaze2000@gmail.com

التمرين الأول :

(1-E)

	$CH_3NH_{2(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3NH^+_{3(aq)} + HO^-_{(aq)}$			
ح إبتد	$n_0 = CV$	+	0	0
ح إنتق	$CV - x$	+	x	x
ح التوازن	$CV - x_{éq}$	+	$x_{éq}$	$x_{éq}$

(2) $\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[HO^-]_{éq} \cdot V}{C \cdot V} = \frac{[HO^-]_{éq}}{C}$

ولدينا $[HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]_{éq}}$ نجد

$\tau_f = \frac{K_e}{C \cdot [H_3O^+]} = \frac{10^{-pK_e}}{C \cdot 10^{-pH}}$

$\tau_f = \frac{10^{pH-K_e}}{C}$ نحصل على

الحساب - $\tau_f = \frac{10^{11,5-14}}{2,00 \times 10^{-2}} = 1,58 \times 10^{-1}$

$\tau_f = 15,8\%$ الأمين ساسي ضعيف.

(3) $Q_{r,éq} = \frac{[HO^-]^2_{éq}}{C - [HO^-]_{éq}}$

وحسب السؤال لدينا $[HO^-]_{éq} = C \cdot \tau_f$

نجد : $Q_{r,éq} = \frac{C \cdot \tau_f^2}{1 - \tau_f}$


الحساب - $Q_{r,éq} = 5,07 \times 10^{-4}$

(4) نعلم أن $K_A = \frac{K_e}{K} = \frac{K_e}{Q_{r,éq}}$

أي $pK_A = -\log K_A = -\log \frac{K}{Q_{r,éq}}$

الحساب - $pK_A = -\log \frac{10^{-14}}{5,07 \times 10^{-4}} = 10,7$: صيغي

(5)



التمرين الثاني :

(1-II) pH متر ، سحالة مدرجة ، بيشر ، خلاط مغناطيسي ، حامل .

(2) $CH_3NH_{2(aq)} + H_3O^+_{(aq)} = CH_3NH^+_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$: المعادلة

(3) $K = Q_{r,éq} = \frac{1}{K_A} = \frac{1}{10^{-10,7}} = 5,00 \times 10^{10}$

$K > 10^4$ تفاعل المعايرة تام.

(4) $pH_E = 6,2$ ؛ $V_{AE} = 12\,mL$

(6) الكاشف الملون المناسب هو أحمر الكلورفينول

(5) $C_B = \frac{C_A \cdot V_{AE}}{V_B}$

$C_B = 3,0 \times 10^{-2}\ \frac{mol}{L}$

(7) من العلاقة : $pH = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$

$\log \frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = pH - pK_A = 10,3 - 10,7 = -0,3$

من البيان : عندما $V_A = 8\,mL$ ، $pH = 10,3$


$\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 0,40\ (40\%)$

فيزياء الضابة f

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تصحيح الفرض (2)




jamalaze2000@gmail.com
فيزياء الضاية f

التمرين الثاني :

1) الجيومركزي : مركزه الأرض ومحاوره تتجه نحو ثلاث نجوم ثابتة .

2) التمثيل :



الشكل 2

3) نطبق ق II لنيوتن

$\vec{F}_{T/S} = m.\vec{a}$

$G.\frac{mM_T}{r^2}.\vec{n} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a}_N = \frac{GM_T}{r^2}.\vec{n}$

المسار دائري والمشاع منتظم وناتج أن الحركة دائرية منتظمة .

4) نعلم أن : $a_N = \frac{v^2}{r}$

و : $v = \frac{2\pi.r}{T}$

$a_N = \frac{4\pi^2 r^2}{r.T^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$ وهذه

ومن السؤال (3) لدينا $a_N = \frac{GM_T}{r^2}$

وهذه نحصل على $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$

أي $\frac{T^2}{(R_T+h)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T} = K = cte$

- ليس القانون الثالث لكبلر

2) ص ق III لكبلر (السؤال 04) نجد

$h = \left(\frac{GM_T.T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} - R_T$

$h = \left(\frac{6,67.10^{-11} \times 5,97.10^{24} \times (86164)^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} - 6378 \times 10^3$ الحساب

$h = 3558\ Km$

(صفحة 02)

jamalaze2000@gmail.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com