المفيد في الرياضيات

السلسلة رقم صفر "الدالة الأسية و اللوغاريتيمة"

الاشتقاق: أحسب مشتقات الدوال الآتية

1/ $(x-2)e^x+2$ 2/ $\frac{3e^x}{e^x+1}$ 3/ $x^2e^{-x+1}-ex$

4/ $\frac{2\ln x+2}{x+2}$ 5/ $1+x\ln x+x^2$ 6/ $\left(\ln(x+1)\right)^2$.

النهايات : أحسب النهايات الآتية

1/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+1\right)e^x$ 2/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x-2}{e^x-2x}$

3/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^x-x+2\right)$ 4/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+2x-1\right)e^{-x}$

5/ $\lim\limits_{x\to0}x-\frac{1}{e^x-1}$ 6/ $\lim\limits_{x\to+\infty}x-x^2\ln x$

7/ $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{2x}-1}{x}$ 8/ $\lim\limits_{x\to+\infty}e^x-\frac{1}{2}ex^2$

9/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^{x^2+2}}{x^2}$ 10/ $\lim\limits_{x\to1}x+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

11/ $\lim\limits_{x\to0}1+\frac{2\ln x}{x}$ 12/ $\lim\limits_{x\to-1}\frac{e}{x+1}+\frac{2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$

13/ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1+\ln x}{1+x\ln x}$ 14/ $\lim\limits_{x\to+\infty}x-1-\ln x$

دراسة الإشارة : أدرس الإشارة في كل حالة

1/ x^2+2x+4 حيث $x\in R$

2/ $x(x^2-5x+4)e^{-x+1}$ حيث $x\in R$

3/ $2x^3+x^2-x-2$ حيث $x\in R$

4/ $\ln x-x$ حيث $x\in\left]0;+\infty\right[$

5/ $\ln(x+2)$ حيث $x\succ2$

6/ $1+2\ln x$ حيث $x\succ0$

معادلات و متراجحات :

حل في R المعادلات و المتراجحات الآتية

1/ $e^{x^2}=e^{x-2}$ 2/ $e^x+2e^{-x}-2=\ln e$

3/ $\ln(2x-3)=\ln(x-3)+\ln5$ 4/ $e^{2x}+e^x-2\geq0$

5/ $\ln(2x+4)=1$ 6/ $(\ln x)^2-\ln\sqrt{x}-6=0$

تمرين 1 0 : أدرس اتجاه تغير الدوال التالية ثم شكل جدول تغيراتها:

1) الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$g(x)=2+(x-2)e^{-x+2}$$

2) الدالة h المعرفة على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ كمايلي :

$$h(x)=\frac{1}{x-2}+\ln x$$

تمرين 2 0 :

الدالة العددية المعرفة على $]0;1[\cup]1;+\infty[$ كما يلي

$$\begin{cases}f(x)=x+1-\frac{1}{\ln x}/x\in\mathbb{R}_+^*-\{1\}\\f(0)=1\end{cases}$$

1) بين أن الدالة مستمرة عند 0 بقيم أكبر

2) أحسب $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

3) بين أن النقطة $A\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحني (C_f)

للدالة f المعرفة على R ب $f(x)=\frac{e^x}{1+e^x}$

تمرين 3 0 :

أعط التفسير الهندسي لنهايتين التاليتين

❖ $\lim\limits_{x\to2}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$

- ✓ **أذكر نص مبرهنة القيم المتوسطة**
- ✓ **أذكر تعريف نقطة الانعطاف**
- ✓ **عرف الدالة الزوجية و الفردية**
- ✓ **متى نقول عن نقطة أنها مركز تناظر**
- ✓ **متى نقول عن مستقيم انه محور تناظر**

تمرين 04:

لتكن الدالة f المعرفة ب $f(x)=\frac{x^2+2\alpha x+\beta}{x+1}$ على $R-\{-1\}$ حيث β و α أعداد حقيقية.

1/ أحسب $f'(x)$

2/ عين α و β حتى يكون المستقيم $y=-2x+3$ مماسا للمنحى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x=0$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

المفيد في الرياضيات

السلسلة رقم صفر "الدالة الأسية و اللوغاريتيمة"

التمرين الأول: بكالوريا تجريبي أشبال الأمة 2019

الجزء الأول: g دالة g عددية معرفة على $]0,+\infty[$ ب

$$g(x)=x^2+2\ln x$$

1/ أدرس تغيرات الدالة g

2/ بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث

$$0.75 \prec \alpha \prec 0.76$$

3/ استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$

الجزء الثاني: نعتبر الدالة العددية f المعرفة على

$]0,+\infty[$ ب $f(x)=1-x+\frac{2}{x}(1+\ln x)$

نسمي المنحنى (C_f) الممثل للدالة في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(\vec{O}.\vec{I}.\vec{J}\right)$.

1) أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} f(x)$

ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x+1$ مقارب مائل للمنحى (C_f) بجوار $+\infty$ ، ثم أدرس وضعية (Δ) بالنسبة إلى (C_f)

2) أ) أثبت أنه من أجل كل x من $]0,+\infty[$ فإن

$$f'(x)=\frac{-g(x)}{x^2}$$

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها

3) أ) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) يطلب تعيين معادلته

ب) أثبت أن: $f(\alpha)=1-2\alpha+\frac{2}{\alpha}$ واستنتج حصرا ل $f(\alpha)$

ج) أحسب $f(2)$ و $f(3)$ ثم أرسم المستقيمين (T) و (Δ) والمنحني (C_f) في المعلم السابق

4) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $\frac{2}{x}(1+\ln x)=m$

التمرين الثاني:

الجزء الأول: g دالة g عددية معرفة على $\mathbb{R}$ ب

$$g(x)=2+(2+x)e^{-x}$$

1) أدرس تغيرات الدالة g

2) بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-2.3 \prec \alpha \prec -2.2$

3) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$

الجزء الثاني: نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ ب

$f(x)=\frac{x^2}{1+e^{-x}}$ ، نسمي المنحنى (C_f) الممثل للدالة في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $\left(\vec{O}.\vec{I}.\vec{J}\right)$.

1) أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

ب/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا

2) أ/ بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن

$$f'(x)=\frac{-g(x)}{x^2}$$

ب/استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها

3) بين أن: $f(\alpha)=\alpha(2+\alpha)$ واستنتج حصرا ل $f(\alpha)$.

4) (p) المنحنى الممثل للدالة مربع $x \to x^2$ في المعلم السابق

أ/أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-x^2\right)$ ، فسر النتيجة هندسيا

ب/ أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمنحنى (p)

5) أنشئ كل من المنحنى (C_f) و المنحنى (p) .

تعطى $f(\alpha)=0.48$

6) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط عدد حلول المعادلة

$f(x)=m$ و $f(x)=|m|$

ملاحظة:

$a<|m|<b$ حيث $0<a$ معناه

$m\in\,]-b,-a[\cup]a,b[$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com