najah213.com · نجاح 213

المـــوسم الدراسي : 2024 / 2023

امتـــحان بـــكالوريا تـــجريبي

القســـم :03 رياضيات

الشـــعبة :ريـــاضيات

إختبار في مـــادة الريـــاضيات

المـدة :04 ساعات و نصف

☜ على المترشح أن يختار أحد الموضوعين

الـــموضوع الأول :

التمرين الأول :(03 نقاط)

– أجب بصحيح أو خطأ :

1)– حجم المجسم المولد بالدوران حول محور الفواصل للتمثيل البياني للدالة f المعرفة على المجال $\left[1,e\right]$ بـــ :

$V=\frac{4\pi}{5}uv$ هو : $f(x)=\frac{2\left(Lnx\right)^2}{\sqrt{x}}$ ؟

2)– $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2023}{x}\right)^x=\frac{1}{2023}$

3)– من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $1+3^{\frac{1}{2}}+3+3^{\frac{3}{2}}+.....+3^{\frac{n}{2}}=\frac{\left(1+\sqrt{3}\right)\left(3^{\frac{n+1}{2}}-1\right)}{2}$

4)– $\left(U_n\right)$ و $\left(V_n\right)$ متتاليتان عدديتان معرفتان على $\mathbb{N}^*$ بـــ : $U_n=\frac{1}{2}-\frac{e}{n}$ ، $V_n=Ln\sqrt{\frac{3}{n}+e}$.

المتتاليتان $\left(U_n\right)$ و $\left(V_n\right)$ متجاورتان ؟

التمرين الثاني :(05 نقاط)

I)–1)– ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة كل من : 2^n ، 3^n على 11 .

2)– n عدد طبيعي ، α عدد صحيح ، نضع : $A_\alpha=2023^{2n+1}+\alpha\times4^{5n+1}$

أ)– تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $A_{1444}\equiv0\left[11\right]$.

بـ)– عين الأعداد الصحيحة α التي من اجلها A_α يقبل القسمة على 11 من أجل كل عدد طبيعي n .

جـ)– أوجد قيم العدد الطبيعي t بحيث : $1443^t+1444^t\equiv0\left[11\right]$.

II)– نضع في علبة بطاقات مرقمة ببواقي قسمة العدد 2^n على 11 ، نسحب من العلبة 3 بطاقات على التوالي وبدون إرجاع

لتكن الحادثتان التاليتان : A البطاقات المسحوبة تحمل أرقاماأولية ، B البطاقات المسحوبة تحمل أرقما فرديا

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1)- أحسب احتمال الحوادث : A ، B ، $A \cap B$.استنتج احتمال الحادثة : $A \cup B$.

2)- أحسب احتمال سحب بطاقة تحمل رقما أوليا علما أنه فردي .

3)- ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب عدد البطاقات التي تحمل رقما أوليا المتبقية في العلبة

- عرف قانون إحتمال X ثم أحسب أمله الرياضياتي .

التمرين الثالث :(05 نقاط)

1)- $P(z)$ كثير حدود للمتغير المركب z حيث : $P(z)=z^3-4z^2+8z-8$

أ)- تحقق أن 2 هو جذرل $P(z)$. ب)- حل في $\mathbb{C}$ مجموعة الأعداد المركبة المعادلة : $P(z)=0$.

2)- في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{u},\vec{v})$ ، لتكن النقاط : A، B و C تحقق لواحقها على الترتيب :

$z_A=2$ ، $z_B=1+i\sqrt{3}$ و $z_C=1-i\sqrt{3}$.

أ)- أكتب كل من و z_B ، z_C و $\frac{z_B}{z_C}$ على الشكل الأسي . ب)- عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد $\left(\frac{z_B}{z_C}\right)^n$ حقيقيا .

ج)- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي فردي n : $z_B{}^{3n}+z_C{}^{3n}+2^{3n+1}=0$

د)- علم النقاط : A ، B و C ، ماهي طبيعة الرباعي $OBAC$ ؟

3)- M و M' نقطتان من المستوي ذات اللاحقتان : z و z' على الترتيب حيث : $z'=\frac{z_A\times\overline{z}-z_C}{\overline{z}-z_C}$

أ)- لتكن (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z بحيث : $(z-z_B)(\overline{z}-z_C)=1$ ، عين ثم أنشئ (E) .

ب)- تحقق أن : $z'=z_A+\frac{z_C}{z-z_C}$

ج)- بين أنه عندما تمسح النقطة M المجموعة (E) فإن النقطة M' تمسح دائرة (C) يطلب تعيين عناصرها .

التمرين الرابع :(07 نقاط)

I)- الجدول التالي هو جدول تغيرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=(2x^2-5x+4)e^{x-2}+1$.

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	.....	↗	$7e^{\frac{-5}{2}}+1$	↘	.....	↗	....

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

(C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$ حيث : $\|\vec{i}\| = 1cm$

1)- أنقل ثم أكمل جدول تغيرات الدالة g ، استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$. 2)- تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x)-1 \succ 0$

3)- برهن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x)-1 = 2g'(x) - g''(x) + 4e^{x-2}$.

4)- أحسب : $S = \int_1^2 \left(g(x)-1\right)dx$ ، فسر هذه النتيجة بيانيا .

II)- لتكن الدالة f المعرفة على $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$ بـ : $f(x) = \left(\frac{2x-3}{x-1}\right)\left(e^{x-2}+1\right)$.

(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1)- أ)- أحسب : $\lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} 1} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \xrightarrow{\prec} 1} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ ، فسر هذه النتائج بيانيا. بـ)- أحسب : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

2)- أثبت أنه من أجل كل x من D_f : $f'(x) = \frac{g(x)}{(x-1)^2}$ ، استنتج اتجاه الدالة f على D_f . شكل جدول تغيراتها .

3)- أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 2$.

4)- أحسب : $f(0)$ ، $f\left(\frac{3}{2}\right)$ ، ثم أنشئ (T) و (C_f) .

III)- لتكن الدالة h المعرفة على $D_h = \mathbb{R} - \{-1,1\}$ بـ : $h(x) = \left(\frac{2|x|-3}{|x|-1}\right)\left(e^{|x|-2}+1\right)$.

(C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

1)- أثبت أن الدالة h دالة زوجية .

2)- اشرح كيفية إنشاء (C_h) إنطلاقا من (C_f) .

3)- أنشئ (C_h) . (استعمل الألوان للتوضيح)

انتهى الموضوع الأول

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

التمرين الأول :(04 نقاط)

I)– 1)– أوجد D_{119} مجموعة القواسم الطبيعية للعدد 119 .

2)– أوجد الثنائيات (a,b) من $(\mathbb{N}^*)^2$ حيث : $\begin{cases} PGCD(a,b)=17 \\ PPCM(a,b)=2023 \end{cases}$

II)– لتكن في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة : (E) ..... $289x-34y=2023$

1)– أوجد $PGCD(289,34)$ ،ثم استنتج أن المعادلة (E) تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$.

2)– بين أنه إذاكانت الثنائية (x,y) حلا للمعادلة (E) فإن y مضاعف للعدد 17 . ثم استنتج في $\mathbb{Z}^2$ حلول المعادلة (E).

3)– أوجد الثنائيات (x,y) حلول المعادلة (E) التي تحقق : $x^2-y\leq 52$

III)– n عددطبيعي فردي ، باقي قسمته على 17 هو 16 ، فما هو باقي قسمته على 34 ؟

التمرين الثاني :(04 نقاط)

1)– في ألعاب البحر المتوسط التي إحتضنها ولاية وهران (بالجزائر) في جوان 2022 ، تحصلت الجزائر في رياضة الملاكمة على :

7 ميداليات ذهبية ، 4 ميداليات فضية و ميدالية واحدة برونزية . وضعت هذه الميداليات في صندوق

– نسحب من الصندوق ميداليتين في آن واحد . نعتبر اللعبة التالية : يربح لاعب 20DA عند سحب ميدالية ذهبية ، يربح 10DA عند سحب ميدالية فضية و يخسر 10DA عند سحب ميدالية فضية

– ليكن المتغير العشوائي X الذي يمثل ربح أو خسارة اللاعب ، عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم أحسب أمله الرياضياتي

2)– بعد نجاح رياضة الملاكمة في الجزائر ترشح للمشاركة في ألعاب البحر المتوسط التي ستقام بفرنسا : 20 ملاكمة (إناث) من بينهم الملاكمة : إيمان خليف و 18 ملاكم (ذكور)من بينهم الملاكم :بن قاسمية محمد .

تم اختيارمجموعة مكونة من ثلاث ملاكمين للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية

– احسب احتمال الحوادث التالية : A : المجموعة تضم ثلاث ذكور. B : المجموعة تضم ذكر وأنثيين .

C : المجموعة تضم إيمان أو محمد .

D : المجموعة تضم ثلاث إناث ولاتضم الملاكمة إيمان بعد ما تم إقصائها نهائيا من المنافسة .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثالث: (05 نقاط)

I)- لتكن المتتالية (U_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $\begin{cases} U_0 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = \frac{9U_n + 2}{U_n + 8} \end{cases}$

1)- أ)- تحقق أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $U_{n+1} = 9 - \frac{70}{U_n + 8}$

ب)- باستعمال مبدأ البرهان بالتراجع أثبت أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le U_n \le 2$.

جـ)- أثبت أن المتتالية (U_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$. هـ)- استنتج مما سبق أن المتتالية (U_n) متقاربة .

2)- أ)- أثبت أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $2 - U_{n+1} \le \frac{7}{8}(2 - U_n)$.

ب)- استنتج أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le 2 - U_n \le \frac{3}{2}\left(\frac{7}{8}\right)^n$ ، ثم أحسب : $\lim\limits_{n \to +\infty} U_n$.

II)- لتكن المتتالية (V_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $V_n = \frac{U_n - 2}{U_n + 1}$

1)- أثبت أن (V_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول V_0 .

2)- أكتب بدلالة n الحد العام V_n ثم U_n . 3)- أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} V_n$ ، ثم استنتج للمرة الثانية حساب $\lim\limits_{n \to +\infty} U_n$.

4)- أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث :

$$S_n = U_0(V_0 - 1) + 10U_1(V_1 - 1) + 10^2 U_2(V_2 - 1) + \ldots\ldots\ldots + 10^n U_n(V_n - 1)$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I)- a و b عددان حقيقيان موجبان تماما ، باستعمال المساواة : $Ln(a \times b) = Ln(a) + Ln(b)$ أثبت أن :

$$\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} Ln(a)$$

II)-لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]1, +\infty[$ بـ : $g(x) = Ln\sqrt{\frac{x-1}{2e}} + \frac{1}{2}$: $D_g =$

1)- أحسب : $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 1} g(x)$ ، $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$.

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2)- أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها على D_g .

3)- أحسب $g(3)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على D_g .

III)- لتكن الدالة f المعرفة على المجال $D_f = [1,+\infty[$ بـ : $f(x) = \begin{cases} (x-1)Ln\sqrt{\dfrac{x-1}{2e}} & ; x \succ 1 \\ 0 & ; x = 1 \end{cases}$.

(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1)- أحسب : $\lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} 1} \dfrac{f(x)}{x-1}$. ماذا تستنتج ؟ فسر هذه النتيجة بيانيا . 2)- أحسب : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

3)- أثبت أنه من أجل كل x من $[1,+\infty[$: $f'(x) = g(x)$ ، شكل جدول تغيرات الدالة f على D_f .

4)- أ)- أثبت أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل عند نقطة A فاصلتها α حيث : $\alpha \succ 1$ يطلب تعيينها .

بـ)- أكتب معادلة المماس (T) عند النقطة A . جـ)- أنشئ (T) و (C_f) .

5)- لتكن الدالة h المعرفة على المجال $D_h = [1,+\infty[$ بـ : $h(x) = -f(x)$

- اشرح كيفية إنشاء (C_h) التمثيل البياني للدالة h إنطلاقا من (C_f) . ثم أنشئ (C_h) في نفس المعلم السابق .

6)- أ)- تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{1\}$: $\dfrac{x^2-2x}{x-1} = x - 1 - \dfrac{1}{x-1}$ ، ثم أحسب : $\int_2^{\alpha} \dfrac{x^2-2x}{x-1}\,dx$

بـ)- أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ : (C_f) و محور الفواصل و المستقيمين الذي معادلتهما : $x = 2$ ، $x = \alpha$.

(استعمل التكامل بالتجزئة)

جـ)- استنتج حساب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ : (C_f) و (C_h) و المستقيمين الذي معادلتهما : $x = 2$ ، $x = \alpha$.

بالتوفيق و النجاح في شهادة بكالوريا

الأستاذة : بن زادي

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الإجابـــة النموذجية + سلـــم التنقيط :

الـــوضوع الأول :

التمرين الأول : (03 نقاط) :

1)- $V = \pi\int_1^e \left(f(x)\right)^2 dx\ uv = \pi\int_1^e \frac{4\left(Lnx\right)^4}{x} dx\ uv$ هو : $V = \frac{4\pi}{5} uv$ ؟

و منه : $V = 4\pi\left[\frac{\left(Lnx\right)^5}{5}\right]_1^e uv = \frac{4\pi}{5} uv$ الإجابة صحيحة ..... (0.5ن)

2)- من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x لدينا : $\left(1+\frac{2023}{x}\right)^x = e^{xLn\left(1+\frac{2023}{x}\right)}$

نضع : $t = \frac{1}{x}$ ، $x \to +\infty$ ، $t \to 0$.

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2023}{x}\right)^x = \lim_{t\to 0} e^{\frac{Ln\left(1+2023t\right)}{t}} = \lim_{t\to 0} e^{2023\times\frac{Ln\left(1+2023t\right)}{2023t}}$$

بما أن : $\lim_{X\to 0}\frac{Ln\left(1+X\right)}{X} = 1$ و منه : $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2023}{x}\right)^x = e^{2023}$ و منه : الإجابة خاطئة ..... (01ن)

3)- نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $U_n = \left(\sqrt{3}\right)^n$. $\left(U_n\right)$ متتالية هندسية أساسها $q = \sqrt{3}$ و حدها الأول $U_0 = 1$.

$$S_n = U_0 + U_1 + U_1 + \ldots\ldots + U_n = \frac{1}{1-\sqrt{3}}\left[1-\left(\sqrt{3}\right)^{n+1}\right]$$

و منه : $S_n = \left(\frac{1+\sqrt{3}}{1-3}\right)\left[1-3^{\frac{n+1}{2}}\right] = \frac{\left(1+\sqrt{3}\right)\left(3^{\frac{n+1}{2}}-1\right)}{2}$ الإجابة صحيحة ..... (0.5ن)

4)- من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $U_{n+1}-U_n = \frac{e}{n\left(n+1\right)} \succ 0$ و منه : $\left(U_n\right)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}^*$.

من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $n+1 \succ n$ ، $\frac{1}{n+1} \prec \frac{1}{n}$ ، $\frac{3}{n+1}+e \prec \frac{3}{n}+e$ ، $\sqrt{\frac{3}{n+1}+e} \prec \sqrt{\frac{3}{n}+e}$

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$Ln\sqrt{\frac{3}{n+1}+e} \prec Ln\sqrt{\frac{3}{n}+e}$ و منه : $V_{n+1} \prec V_n$ ، أي أن (V_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}^*$.

$$\lim_{n\to+\infty}(U_n - V_n) = 0 : \text{و منه} \quad \begin{cases} \lim_{n\to+\infty} Ln\sqrt{\frac{3}{n}+e} = Ln\sqrt{e} = \frac{1}{2} \\ \lim_{n\to+\infty} Ln\left(\frac{1}{2}-\frac{e}{n}\right) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

و منه :المتتاليتان (U_n) و (V_n) متجاورتان الإجابة صحيحة ..... (01ن)

التمرين الثاني :(05 نقاط) :

I)-1)- $2^0 \equiv 1[11]$ ، $2^1 \equiv 2[11]$ ، $2^2 \equiv 4[11]$ ، $2^3 \equiv 8[11]$ ، $2^4 \equiv 5[11]$ ، $2^5 \equiv 10[11]$ ،
$2^6 \equiv 9[11]$ ، $2^7 \equiv 7[11]$ ، $2^8 \equiv 3[11]$ ، $2^9 \equiv 6[11]$ ، $2^{10} \equiv 1[11]$ . ..... (0.5ن)

بواقي قسمة 2^n على 11 تشكل متتالية دورية دورها $p = 10$.

$n =$	$10k$	$10k+1$	$10k+2$	$10k+3$	$10k+4$	$10k+5$	$10k+6$	$10k+7$	$10k+8$	$10k+9$	$k \in \mathbb{N}$
$2^n \equiv$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6	$[11]$

$3^0 \equiv 1[11]$ ، $3^1 \equiv 3[11]$ ، $3^2 \equiv 9[11]$ ، $3^3 \equiv 5[11]$ ، $3^4 \equiv 4[11]$ ، $3^5 \equiv 1[11]$ ..... (0.5ن)

بواقي قسمة 3^n على 11 تشكل متتالية دورية دورها $p' = 5$.

$n =$	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$	$k \in \mathbb{N}$
$3^n \equiv$	1	3	9	5	4	$[11]$

2)- أ)- لدينا : $2023 \equiv 10[11]$ أي أن : $2023 \equiv -1[11]$ و منه : $2023^{2n+1} \equiv -1[11]$ (لأن $2n+1$ فردي)

$4^{5n+1} = 2^{10n+2}$ و منه : $4^{5n+1} \equiv 4[11]$ ، $1444 \equiv 3[11]$ و منه : $A_{1444} \equiv (-1+3\times 4)[11]$ أي أن :

$A_{1444} \equiv 0[11]$ ..... (0.5ن)

بـ)- لدينا : $4^{5n+1} \equiv 4[11]$ ، $2023^{2n+1} \equiv -1[11]$ ، A_α يقبل القسمة على 11 معناه : $A_\alpha \equiv 0[11]$.

$A_\alpha \equiv (-1+4\alpha)[11]$ ، $-1+4\alpha \equiv 0[11]$ ، $4\alpha \equiv 1[11]$ ، $12\alpha \equiv 3[11]$ ، $\alpha \equiv 3[11]$. و منه :

A_α يقبل القسمة على 11 معناه : $\alpha = 11k+3 \quad (k \in \mathbb{Z})$ ..... (0.5ن)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$n =$	$10k$	$10k+1$	$10k+2$	$10k+3$	$10k+4$	$10k+5$ $5k'$	$10k+6$ $5k'+1$	$10k+7$ $5k'+2$	$10k+8$	$10k+9$	$k \in \mathbb{N}$ $k' \in \mathbb{N}$
$2^n \equiv$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6	$[11]$
$3^n \equiv$	1	3	9	5	4	1	3	9	5	4	$[11]$
$2^n + 3^n \equiv$	2	5	2	2	9	0	1	5	8	10	$[11]$

$n = 11k + 5 \quad (k \in \mathbb{N})$ ..... (0.5ن)

طريقة ثانية :

لدينا : $3 \equiv -8[11]$ ، $[11] \equiv (-2)^{3t}$ و منه : $3^t \equiv 0[11]$ يكافئ : $1444^t + 1443^t \equiv 0[11]$. $2^t + (-2)^{3t} \equiv 0[11]$

$n =$	$10k$	$10k+1$	$10k+2$	$10k+3$	$10k+4$	$10k+5$	$10k+6$	$10k+7$	$10k+8$	$10k+9$	$k \in \mathbb{N}$
$2^n \equiv$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6	$[11]$
$(-2)^{3t} \equiv$	1	−8	9	−6	4	−10	3	−2	5	−7	$[11]$
$2^t + (-2)^{3t} \equiv$	2	5	2	2	9	0	1	5	8	10	$[11]$

$n = 11k + 5 \quad (k \in \mathbb{N})$

عدد الحالات الممكنة للسحب : $A_{10}^3 = 720$ $\quad \Omega = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

1) –البطاقات التي تحمل أرقاما أولية هي : $2,3,5,7$ و منه : $P(A) = \frac{A_4^3}{A_{10}^3} = \frac{24}{720} = \frac{1}{30}$ ..... (0.25ن)

2)– البطاقات التي تحمل أرقاما فردية هي : $1,3,5,7,9$ و منه : $P(B) = \frac{A_5^3}{A_{10}^3} = \frac{60}{720} = \frac{1}{12}$ ..... (0.25ن)

3)– البطاقات التي تحمل أرقاما فردية وأولية هي : $3,5,7$ و منه : $P(A \cap B) = \frac{A_3^3}{A_{10}^3} = \frac{6}{720} = \frac{1}{120}$ ..... (0.25ن)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{30} + \frac{1}{12} - \frac{1}{120}$$

و منه : $P(A \cup B) = \frac{13}{120}$ ..... (0.25ن)

$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{120}}{\frac{1}{12}} = \frac{1}{10}$ ..... (0.25ن)

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

3)- قيم المتغير العشوائي : $x_i \in \{1,2,3,4\}$ ..... (0.25ن)

$P(X=1)=\frac{A_4^3}{A_{10}^3}=\frac{24}{720}=\frac{1}{30}$ ، $P(X=2)=\frac{A_4^2\times A_6^1\times 3!}{A_{10}^3\times 2!\times 1!}=\frac{216}{720}=\frac{3}{10}$ ..... (0.25ن) (0.25ن)

$P(X=3)=\frac{A_4^1\times A_6^2\times 3!}{A_{10}^3\times 2!\times 1!}=\frac{360}{720}=\frac{1}{2}$ ، $P(X=4)=\frac{A_6^3}{A_{10}^3}=\frac{120}{720}=\frac{1}{6}$ ..... (0.25ن) (0.25ن)

x_i	1	2	3	4
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{30}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

$E(X)=\frac{1}{30}+\frac{6}{10}+\frac{3}{2}+\frac{4}{6}\approx 2.8$ ..... (0.25ن)

التمرين الثالث: (05 نقاط):

1)- أ)- $P(2)=8-16+16-8=0$ ..... (0.25ن)

ب)- من أجل كل عدد مركب z : $P(z)=(z-2)(z^2-2z+4)$ ..... (0.5ن)

$P(z)=0$ من يكافئ : $z=2$ أو $z^2-2z+4=0$ $(\Delta=-12)$

$S=\{2,1-i\sqrt{3},1+i\sqrt{3}\}$ ..... (0.5ن)

2)- أ)- $z_B=2e^{\frac{i\pi}{3}}$ ، $z_C=2e^{\frac{-i\pi}{3}}$ ، $\frac{z_B}{z_C}=e^{\frac{i2\pi}{3}}$ ..... (0.5ن)

ب)- $\left(\frac{z_B}{z_C}\right)^n=e^{\frac{i2n\pi}{3}}$. $\left(\frac{z_B}{z_C}\right)^n$ حقيقي يكافئ : $(k\in\mathbb{N})$ $\frac{2\pi n}{3}=k\pi$ و منه :

$2n=3k$ $(k\in\mathbb{N})$ ، لدينا : $3\!/\!_{2n}$ و $PGCD(2,3)=1$ ومنه : حسب مبرهنة غوص : $3\!/\!_{n}$

$n=3k'$ $(k'\in\mathbb{N})$ ..... (0.5ن)

جـ)- n من فردي معناه : $n=2k+1(k\in\mathbb{N})$

$(z_B)^{3n}=2^{3n}\left(e^{i(2k+1)\pi}\right)=2^{3n}e^{i\pi}=-2^{3n}$

$(z_C)^{3n}=2^{3n}\left(e^{-i(2k+1)\pi}\right)=2^{3n}e^{-i\pi}=-2^{3n}$ ..... (0.5ن)

$(z_B)^{3n}+(z_C)^{3n}+2^{3n+1}=-2^{3n}-2^{3n}+2^{3n+1}=-2^{3n+1}+2^{3n+1}=0$


www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

د)- لدينا : $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{CA}$ $\left(z_B=z_A-z_C\right)$ و $OB=OC=2$ (متوازي أضلاع له ضلعان متتابعان متقايسان)

ومنه : الرباعي $OBAC$ معين ..... (0.5ن)

- تعليم النقاط : ..... (0.5ن)



2)-أ) $(z-z_B)(z-z_C)=(z-z_B)\overline{(z-z_C)}=1$ ومنه : $BM=1$

(نذكر أن : $z.\overline{z}=|z|^2$)

ومنه: (E) هي دائرة مركزها B و نصف قطرها $r=1$ ..... (0.5ن)

ب)- $z'=z_A+\dfrac{z_C}{\overline{z}-\overline{z_C}}=\dfrac{z_A.\overline{z}-z_A.\overline{z_C}+z_C}{\overline{z}-\overline{z_C}}=\dfrac{z_A.\overline{z}-2.z_C+z_C}{\overline{z}-\overline{z_C}}=\dfrac{z_A.\overline{z}-z_C}{\overline{z}-\overline{z_C}}$ ..... (0.25ن)

جـ)- $|z'-z_A|=\left|\dfrac{z_C}{\overline{z}-\overline{z_C}}\right|=\left|\dfrac{z_C}{\overline{z-z_B}}\right|=\left|\dfrac{z_C}{z-z_B}\right|$ ومنه : $AM'=\dfrac{OC}{BM}$

وبما أن : $M\in(E)$ فإن : $BM=1$ ومنه : $AM'=2$ ومنه : مجموعة النقط M' هي دائرة مركزها A

و نصف قطرها $r=2$ ..... (0.5ن)

التمرين الرابع :(07 نقاط):

$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=1$ ، $g(1)=e^{-1}+1$ . ..... (0.75ن)

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	1	↗	$7e^{\frac{-5}{2}}+1$	↘	$e^{-1}+1$	↗	$+\infty$

من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g(x) \succ 0$ . ..... (0.25ن)

من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $e^{x-2} \succ 0$ ، $2x^2-5x+4 \succ 0$ ($\Delta = -7 \prec 0$) ومنه : $g(x)-1 \succ 0$ ..... (0.25ن)

g قابلة للإشتقاق مرتين على $\mathbb{R}$: $2g'(x) = \left(4x^2-2x-2\right)e^{x-2}$ ، $g''(x) = \left(2x^2+3x-2\right)e^{x-2}$

$$2g'(x) - g''(x) + 4e^{x-2} = \left(4x^2-2x-2-2x^2-3x+2+4\right)e^{x-2}$$

$$2g'(x) - g''(x) + 4e^{x-2} = \left(2x^2-5x+4\right)e^{x-2} = g(x)-1$$ ..... (0.5ن)

$$S = \int_1^2 \left(g(x)-1\right)dx = \left[2g(x) - g'(x) + 4e^{x-2}\right]_1^2 = \left[\left(2x^2-9x+13\right)e^{x-2}\right]_1^2$$

$$S = \int_1^2 \left(g(x)-1\right)dx = 3-6e^{-1}$$ ..... (0.25ن)

هي مساحة الحيز المستوي المحدد بـ : (C_f) و المستقيمات التي معادلاتها : $S = \left(3-6e^{-1}\right)cm^2$

$y=1$ ، $x=1$ ، $x=2$ . ..... (0.25ن)

1)- أ)- $\begin{cases} \lim\limits_{x \to 1} \left(2x-3\right)\left(e^{x-2}+1\right) = -e^{-1}-1 \\ \lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} 1} \left(x-1\right) = 0^{-1} \end{cases}$ ومنه : $\lim\limits_{x \xrightarrow{\prec} 1} f(x) = +\infty$ ..... (0.25ن)

$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 1} \left(2x-3\right)\left(e^{x-2}+1\right) = -e^{-1}-1 \\ \lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} 1} \left(x-1\right) = 0^{+1} \end{cases}$ ومنه : $\lim\limits_{x \xrightarrow{\succ} 1} f(x) = -\infty$ ..... (0.25ن)

(C_f) يقبل مستقيما مقاربا عموديا معادلته : $x=1$ . ..... (0.25ن)

$\begin{cases} \lim\limits_{x \to -\infty} \left(\frac{2x-3}{x-1}\right) = 2 \\ \lim\limits_{x \to -\infty} \left(e^{x-2}+1\right) = 1 \end{cases}$ ومنه : $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 2$ ..... (0.25ن)

(C_f) يقبل مستقيما مقاربا عموديا معادلته : $y=2$ بجوار $-\infty$ . ..... (0.25ن)

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

ومنه: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2x-3}{x-1}\right)=2\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{x-2}+1\right)=+\infty\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ..... (0.25ن)

2)- f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}-\{1\}$:

$$f'(x)=\frac{1}{(x-1)^2}\left(e^{x-2}+1\right)+\left(\frac{2x-3}{x-1}\right)e^{x-2}$$

$$f'(x)=\left[\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{2x-3}{x-1}\right]e^{x-2}+\frac{1}{(x-1)^2}$$

$f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$ ..... (0.5ن)

$f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}\succ 0$ ومنه: متزايدة تماما على $\mathbb{R}-\{1\}$ . ..... (0.25ن)

جدول تغيرات الدالة f : ..... (0.5ن)

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$		$+\infty$ ↗	‖	$+\infty$ ↗	
	2		‖	$-\infty$	

3)- $(T): y=f'(2)(x-2)+f(2)=3x-4$ ..... (0.25ن)

$f(0)=3\left(e^{-2}+1\right)\approx 3.40$ ، $f\left(\dfrac{3}{2}\right)=0$ . ..... (0.25ن) (0.25ن)

III)- 1)- من أجل كل x من D_h : $h(-x)=h(x)$ (لأن : $|-x|=|x|$) ومنه : الدالة h دالة زوجية..... (0.25ن)

2)- على المجال $]1,+\infty[\cup]0,1[$: $h(x)=f(x)$ و منه (C_h) يطابق (C_f) .


على المجال $]-\infty,-1[\cup]-1,0[$ بما ان الدالة h دالة زوجية فإن يقبل محور التراتيب كمحور تناظر : ..... (0.25ن)

نرسم نظير الجزء السابق بالنسبة لـ (yy')

3)- إنشاء (T) ، (C_f) و (C_h) : ..... (0.75ن)

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com



الموضوع الثاني :

التمرين الأول : (04 نقاط)

I- 1- $119 = 7 \times 17$ ، $D_{119} = \{1, 7, 17, 119\}$ ..... (0.25ن)

2- نضع : $a = 17a'$ $b = 17b'$ حيث : $PGCD(a', b') = 1$

لدينا : $m = \frac{a \times b}{d}$ حيث : $d = PGCD(a,b)$ $m = PPCM(a,b)$ ومنه :

$$\begin{cases} 17a'b' = 2023 \\ PGCD(a', b') = 1 \end{cases} \text{ ، } \begin{cases} a'b' = 119 \\ PGCD(a', b') = 1 \end{cases} .$$

a'	1	119	7	17
b'	119	1	17	7

II- 1- $34 = 2 \times 17$ ، $119 = 7 \times 17$ ، ومنه : $PGCD(289, 34) = 17$ ..... (0.25ن)

$S = \{(17, 2023); (2023, 17); (119, 289); (289, 119)\}$ ..... (1.25ن)

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

ومنه : المعادلة (E) تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$ . ..... (0.25ن) $17/2023$

2)- المعادلة (E) تكافئ : $(E).....17x-2y=119$. $17x-2y=119$ معناه : $2y=17x-199$

$2y=17(x-7)$ لكن **2** و**17** أوليان فيما بينهما و منه حسب مبرهنة غوص :

$17/y$ أي أن : y مضاعف 17 ..... (0.5ن)

$y=17k\ (k\in\mathbb{Z})$ ، نعوض y بما يساويه في المعادلة (E) نجد : $y=17k\ (k\in\mathbb{Z})$

$S=\{(2k+7,17k);(k\in\mathbb{Z})\}$ ..... (0.5ن)

3)- $x^2-y\le 52$ يكافئ : $4k^2+28k+49-17k\le 52$ ، $4k^2+11k-3\le 0$.

$\Delta=169$ ، $k_1=-3$ ، $k_2=\frac{1}{4}$ ومنه : $k\in\{-3,-2,-1,0\}$.

$S'=\{(1,-51);(3,-34);(5,-17);(7,0)\}$ ..... (0.5ن)

III)- n عددطبيعي فردي معناه : $n\equiv 1[2]$ ، باقي قسمته على 17 هو 16 معناه : $n\equiv 16[17]$

$\begin{cases}17n\equiv 17[34]\\2n\equiv 32[34]\end{cases}$ ، $15n\equiv -15[34]$ ، $n\equiv -1[34]$ ، $n\equiv 33[34]$ و منه :

باقي قسمة n على 34 هو **33** . ..... (0.5ن)

التمرين الثاني :(04 نقاط):

1)- عدد الحالات الممكنة للسحب : $C_{12}^2=66$

2ذهبية ← 40 ، 1 ذهبية + 1فضية ← 30 ، 1 ذهبية + 1 برونزية ← 10 ، 2 فضية ← 20 ، 1 فضية + 1 برونزية ← 0 .

$x_i\in\{,10,20,30,40\}$ ..... (0.5ن)

$P(X=10)=\frac{C_1^1\times C_7^1}{C_{12}^2}=\frac{7}{66}$ ، $P(X=0)=\frac{C_1^1\times C_4^1}{C_{12}^2}=\frac{4}{66}=\frac{2}{33}$ ..... (0.25ن)(0.25ن)

$P(X=30)=\frac{C_4^1\times C_7^1}{C_{12}^2}=\frac{28}{66}=\frac{14}{33}$ ، $P(X=20)=\frac{C_4^2}{C_{12}^2}=\frac{6}{66}=\frac{1}{11}$ ..... (0.25ن)(0.25ن)

$P(X=40)=\frac{C_7^2}{C_{12}^2}=\frac{21}{66}=\frac{7}{22}$ ..... (0.25ن)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

x_i	0	10	20	30	40
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{33}$	$\frac{7}{66}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{14}{33}$	$\frac{7}{22}$

$E(X) = 0\times\frac{2}{33} + 10\times\frac{7}{66} + 20\times\frac{1}{11} + 30\times\frac{14}{33} + 40\times\frac{7}{22}$ ، $E(X) = \frac{85}{3}$ ..... (0.25ن)

2)- عدد الحالات الممكنة : $C_{38}^{3} = 8436$.

$P(A) = \frac{C_{18}^{3}}{C_{38}^{3}} = \frac{816}{8436} = \frac{68}{703}$ ..... (0.5ن)

$P(B) = \frac{C_{18}^{1}\times C_{20}^{2}}{C_{38}^{3}} = \frac{3420}{8436} = \frac{15}{37}$ ..... (0.5ن)

$P(C) = \frac{C_{2}^{1}\times C_{36}^{2} + C_{2}^{2}\times C_{36}^{1}}{C_{38}^{3}} = \frac{1296}{8436} = \frac{108}{703}$ ..... (0.5ن)

$P(D) = \frac{C_{19}^{3}}{C_{37}^{3}} = \frac{969}{8436} = \frac{17}{148}$ ..... (0.5ن)

التمرين الثالث: (05 نقاط):

I)- 1)- أ)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $U_{n+1} = \frac{9U_n + 72 - 70}{U_n + 8} = \frac{9U_n + 2}{U_n + 8}$ ..... (0.25ن)

ب)- $P(n)$ ..... $0 \le U_n \le 2$

من أجل $n = 0$: $0 \le \frac{1}{2} \le 2$ و منه : $P(0)$ محققة

نفرض صحة $P(n)$ معناه $0 \le U_n \le 2$ ، نبرهن على صحة $P(n+1)$ معناه : $0 \le U_{n+1} \le 2$

$0 \le U_n \le 2$ ، $8 \le U_n + 8 \le 10$ ، $\frac{1}{10} \le \frac{1}{U_n + 8} \le \frac{1}{8}$ ، $\frac{-70}{10} \le \frac{-70}{U_n + 8} \le \frac{-70}{8}$

$0 \le \frac{1}{4} \le U_{n+1} \le 2$ ومنه : $P(n+1)$ محققة .

ومنه : من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le U_n \le 2$ حسب مبدأ البرهان بالتراجع . ..... (0.5ن)

ج)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $U_{n+1} - U_n = \frac{9U_n + 2}{U_n + 8} - U_n = \frac{-U_n^2 + U_n + 2}{U_n + 8} = \frac{-(U_n + 1)(U_n - 2)}{U_n + 8}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

لدينا من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le U_n \le 2$ ومنه : $U_n + 1 \succ 0$ ، $U_n + 8 \succ 0$ ، $U_{n+1} - U_n \ge 0$ أي أن :

(U_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ ..... (0.5ن)

هـ)- (U_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ و محدودة من الأعلى بـ: 2 فهي متقاربة ..... (0.25ن)

2)- أ)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $2 - U_{n+1} = 2 - \dfrac{9U_n + 2}{U_n + 8} = \dfrac{2U_n + 16 - 9U_n - 2}{U_n + 8} = \dfrac{7(2 - U_n)}{U_n + 8}$

$U_n \ge 0$ ، $U_n + 8 \ge 8$ ، $\dfrac{1}{U_n + 8} \le \dfrac{1}{8}$ ، $\dfrac{7}{U_n + 8} \le \dfrac{7}{8}$ و منه : $2 - U_{n+1} \le \dfrac{7}{8}(2 - U_n)$ ..... (0.5ن)

بـ)-

$$2 - U_1 \le \frac{7}{8}(2 - U_0)$$
$$2 - U_2 \le \frac{7}{8}(2 - U_1)$$
$$\vdots$$
$$2 - U_n \le \frac{7}{8}(2 - U_{n-1})$$

$$0 \le 2 - U_n \le \left(\frac{7}{8}\right)^n (2 - U_0)$$

و منه : من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0 \le 2 - U_n \le \dfrac{3}{2}\left(\dfrac{7}{8}\right)^n$ ..... (0.5ن)

و منه : $\lim\limits_{n \to +\infty} U_n = 2$ و $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{3}{2}\left(\dfrac{7}{8}\right)^n = 0$ ..... (0.25ن)

II)-1)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $V_{n+1} = \dfrac{\dfrac{9U_n + 2}{U_n + 8} - 2}{\dfrac{9U_n + 2}{U_n + 8} + 1} = \dfrac{9U_n + 2 - 2U_n - 16}{9U_n + 2 + U_n + 8} = \dfrac{7(U_n + 2)}{10(U_n + 2)}$

ومنه : $V_{n+1} = \dfrac{7}{10}V_n$: (V_n) متتالية هندسية أساسها $q = \dfrac{7}{10}$ وحدها الأول : $V_0 = \dfrac{\frac{1}{2} - 2}{\frac{1}{2} + 1} = -1$ ..... (0.5ن)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

2)- من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $V_n = V_0 \times q^n = -\left(\frac{7}{10}\right)^n$ ..... (0.25ن)

$$U_n\left(V_n - 1\right) = -V_n - 2 \text{ ، } V_n \times U_n - U_n = -V_n - 2 \text{ ، } V_n\left(U_n + 1\right) = U_n - 2 \text{ ، } V_n = \frac{U_n - 2}{U_n + 1}$$

$U_n = \frac{V_n + 2}{1 - V_n} = \frac{-\left(\frac{7}{10}\right)^n + 2}{1 + \left(\frac{7}{10}\right)^n}$ ..... (0.5ن)

3)- $\lim_{n \to +\infty} V_n = 0$ و منه : $\lim_{n \to +\infty} U_n = 2$ ..... (0.25ن)(0.25ن)

4)- لدينا : $U_n = \frac{V_n + 2}{1 - V_n}$ ، $U_n\left(1 - V_n\right) = V_n + 2$ ، $U_n\left(V_n - 1\right) = -V_n - 2 = \left(\frac{7}{10}\right)^n - 2$

ومنه : $S_n = \frac{1}{1-7}\left(1 - 7^{n+1}\right) - \frac{2}{1-10}\left(1 - 10^{n+1}\right)$ ، $10^n U_n\left(V_n - 1\right) = 7^n - 2 \times 10^n$

$S_n = \frac{7^{n+1} - 1}{6} - \frac{2(10^{n+1} - 1)}{9}$ ..... (0.5ن)

التمرين الرابع (07 نقاط):

I)- $2Ln\left(\sqrt{a}\right) = Lna$: و منه $\begin{cases} Ln\left(\sqrt{a} \times \sqrt{a}\right) = Ln\left(\sqrt{a}\right) + Ln\left(\sqrt{a}\right) = 2Ln\left(\sqrt{a}\right) \\ Ln\left(\sqrt{a} \times \sqrt{a}\right) = Lna \end{cases}$

أي أن : $Ln\left(\sqrt{a}\right) = \frac{1}{2}Lna$ ..... (0.25ن)

II)-1)- $\lim_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \xrightarrow{\succ} 1} g(x) = -\infty$ ..... (0.25ن)(0.25ن)

2)- g قابلة للإشتقاق على D_g : $g'(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{\frac{1}{2e}}{\frac{x-1}{2e}}\right) = \frac{1}{2(x-1)} \succ 0$ ..... (0.25ن)

ومنه : الدالة متزايدة ماما على D_g . ..... (0.25ن)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

جدول تغيرات الدالة g : ..... (0.25ن)

x	1	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	
$g(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3- $g(3) = Ln\sqrt{\frac{2}{2e}} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}Ln\frac{1}{e} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$ ..... (0.25ن)

إشارة $g(x)$: ..... (0.25ن)

x	0	3	$+\infty$
إشارة: $g(x)$	$-$	0	$+$

III- 1- $\lim\limits_{x \to 1^+} \frac{f(x)}{x-1} = \lim\limits_{x \to 1^+} Ln\sqrt{\frac{x-1}{2e}} = -\infty$ ومنه: f غير قابلة للإشتقاق عند 1 من اليمين.. (0.25ن)(0.25ن)

- (C_f) يقبل نصف مماس عمودي عند النقطة $W(1,0)$ ..... (0.25ن)

2- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ ..... (0.25ن)

3- f قابلة للإشتقاق على المجال $]1,+\infty[$: $f'(x) = \frac{1}{2}Ln\left(\frac{x-1}{2e}\right) + \frac{1}{x-1} \times \frac{x-1}{2} = g(x)$ .....(0.25ن)

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ على المجال $]1,+\infty[$:

f متناقصة تماما على المجال : $]-\infty,3[$ ، f متزايدة تماما على المجال : $]3,+\infty[$ ..... (0.25ن)

جدول تغيرات الدالة f : ..... (0.5ن)

x	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	0 ↘	-1	↗ $+\infty$

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com


4)-أ) $(x-1)Ln\sqrt{\frac{x-1}{2e}}=0$ معناه : $x-1=0$ أو $Ln\sqrt{\frac{x-1}{2e}}=0$

$x=1$ أو $Ln\sqrt{\frac{x-1}{2e}}=0$ ، $\frac{1}{2}Ln\left(\frac{x-1}{2e}\right)=0$ ، $\frac{x-1}{2e}=1$ ، $x=1+2e$.

بما أن : $1\prec\alpha$ فإن : $\alpha=1+2e$ ..... (0.25ن)

ب)- $(T):y=f'(1+2e)(x-1-2e)+f(1+2e)=\frac{1}{2}x-e-\frac{1}{2}$ ..... (0.25ن)

جـ)- إنشاء (T) ، (C_f) و (C_h) : ..... (0.75ن)



5)- (C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة لـ (xx') على المجال $[1,+\infty[$ . ..... (0.25ن)

6)-أ) $x-1-\frac{1}{x-1}=\frac{(x-1)(x-1)-1}{x-1}=\frac{x^2-2x+1-1}{x-1}=\frac{x^2-2x}{x-1}$ ..... (0.25ن)

$$\int_2^{\alpha}\frac{x^2-2x}{x-1}dx=\int_2^{\alpha}\left[x-1-\frac{1}{x-1}\right]dx=\left[\frac{x^2}{2}-x-Ln(x-1)\right]_2^{\alpha}$$

$\int_2^{\alpha}\frac{x^2-2x}{x-1}dx=2e^2-\frac{3}{2}-Ln2$ ..... (0.25ن)

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$$U'(x)=\frac{x-1}{2} \qquad U(x)=\frac{x^2-2x}{4}$$


$$V(x)=Ln\left(\frac{x-1}{2e}\right) \qquad V'(x)=\frac{1}{x-1}$$ -ب)

$$\int_2^{\alpha} f(x)\,dx=\left[\left(\frac{x^2-2x}{4}\right)Ln\left(\frac{x-1}{2e}\right)\right]_2^{\alpha}-\frac{1}{4}\int_2^{\alpha}\frac{x^2-2x}{x-1}\,dx$$

$$S=-\int_2^{\alpha} f(x)\,dx=\frac{1}{4}\left(2e^2-\frac{3}{2}-Ln2\right) \qquad \int_2^{\alpha} f(x)\,dx=-\frac{1}{4}\left(2e^2-\frac{3}{2}-Ln2\right)$$

$S\approx 3.146cm^2$ ..... (0.75ن)

-جـ) $S'=\int_2^{\alpha} g(x)-f(x)\,dx=-2\int_2^{\alpha} f(x)\,dx\approx 6.292cm^2$ ..... (0.25ن)



www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com