najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان 2010

الشعبة : تقني رياضي

اختبار في مادة: الرياضيات — المدة: 04 ساعات ونصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضـــوع الأول

التمرين الأول: (05 نقاط)

1/ حلّ، في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$، المعادلة: $(z-3+2i)\left(z^2+6z+10\right)=0$.

(i هو العدد المركب الذي طويلته 1 و $\frac{\pi}{2}$ عمدة له)

2/ علّم في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A ، C ، D و I ذات اللاحقات: $z_A=3-2i$ ، $z_C=-3+i$ ، $z_D=-3-i$ و $z_I=1$ على الترتيب.

3/ z عدد مركب يحقق الجملة : $\begin{cases} arg(z-3+2i)=arg(z-1)+\frac{\pi}{2} \\ |z-3+2i|=|z-1| \end{cases}$

أ- بين أن الجملة تكافئ : $\frac{z-3+2i}{z-1}=i$ ثم عين قيمة z.

ب- B النقطة التي لاحقتها $z_B=3$، تحقق أنّ : $\overline{AB}=\overline{DC}$. ما هي طبيعة الرباعي $ABCD$؟

جـ- لتكن J النّقطة التي لاحقتها z_J حيث: $z_J=1-2i$.

اكتب على الشكل الأسي العدد المركّب Z حيث: $Z=\frac{z_A-z_I}{z_B-z_J}$.

تحقّق أنّ: $\overline{AB}=\overline{JI}$. ما هي طبيعة الرباعي $ABIJ$؟

التمرين الثاني: (05 نقاط)

الفضاء مزوّد بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

نعتبر النّقطتين $A(3;-1;2)$ و $B(1;2;1)$ والمستوي (P) الذي معادلته $x-2y+3z-7=0$.

1/ عيّن إحداثيات النقطة G مرجح النّقطتين A و B المرفقتين بالمعاملين 3 و 1 على الترتيب.

2/ عيّن طبيعة وعناصر (Γ)مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق: $\|3\overline{MA}+\overline{MB}\|=4$.

3/ أ- اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النّقطة G ويعامد المستوي (P) .

ب- عيّن إحداثيات H نقطة تقاطع (P) و (Δ) .

جـ - احسب المسافة بين G و المستوي (P).

4/ نعرّف المستوي (P') بتمثيله الوسيطي: $\begin{cases} x=1+t \\ y=t+2\lambda \\ z=2-t+2\lambda \end{cases}$ حيث t و λ عددان حقيقيان

أثبت أنّ (P) و (P') متقاطعان واكتب تمثيلا وسيطيا لمستقيم تقاطعهما.

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثالث: (07 نقاط)

f الدّالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}^*$ بالعبارة: $f(x)=\dfrac{3xe^x-3x-4}{3(e^x-1)}$

ليكن (C_f) منحنى f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث: $f(x)=ax+\dfrac{b}{3(e^x-1)}$ من أجل كلّ x من $\mathbb{R}^*$
2. احسب نهايات الدّالة f عند أطراف مجالات تعريفها.
3. بيّن أنّ f متزايدة تماما على كلّ مجال من مجالي تعريفها ثمّ شكل جدول تغيراتها.
4. أ – (D) و (D') المستقيمان اللذان معادلتاهما على الترتيب: $y=x$ و $y=x+\frac{4}{3}$.

بيّن أنّ (D) و (D') مقاربان للمنحنى (C_f) ، ثمّ حدّد وضعيته بالنسبة لكل منهما.

ب – بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين x_0 و x_1 حيث $0,9<x_0<0,91$ و $-1,66<x_1<-1,65$

جـ – احسب من أجل كلّ عدد حقيقي x غير معدوم $f(x)+f(-x)$.

فسّر النتيجة هندسيا.

د – ارسم (D) و (D') و (C_f) .

هـ – m عدد حقيقي، (D_m) المستقيم المعرّف بالمعادلة $y=x+m$.

ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة: $f(x)=x+m$

5. نعتبر الدّالة g المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يأتي: $g(x)=[f(x)]^2$

ادرس تغيّرات الدّالة g دون حساب $g(x)$ بدلالة x .

التمرين الرابع: (03 نقاط)

نعتبر العدد الطبيعي n الذي يكتب في نظام العد ذي الأساس 7 كما يلي:

$n=\overline{11\alpha 00}$ حيث α عدد طبيعي.

1- عين α حتى يكون n قابلا للقسمة على 3.

2- عين العدد α حتى يكون n قابلا للقسمة على 5.

استنتج قيمة α التي تجعل n قابلا للقسمة على 15.

3- نأخذ $\alpha=4$ اكتب العدد n في النظام العشري.

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (05 نقاط)

1) أ – اكتب على الشكل الأسي العدد المركّب a حيث: $a=-2+2i\sqrt{3}$

(i هو العدد المركب الذي طويلته 1 و $\frac{\pi}{2}$ عمدة له)

ب– حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول Z : $Z^2=-2+2i\sqrt{3}$

2) ينسب المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$.

A و B و C النّقط التي لاحقاتها $Z_A=-2$ و $Z_B=-1-\sqrt{3}\,i$ و $Z_C=1+\sqrt{3}\,i$ على التّرتيب.

أ– احسب طويلة العدد المركّب $\frac{Z_C-Z_A}{Z_B-Z_A}$ وعمدة له.

ب– استنتج طبيعة المثلّث ABC.

3) لتكن (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $arg(\overline{z}+2)=\frac{\pi}{3}$.

أ– تحقق أن B تنتمي إلى (E).

ب– عين المجموعة (E).

التمرين الثاني: (04 نقاط)

1– عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 10^n على 13 .

2– تحقق أن: $(10^{2008})^2+10^{2008}+1\equiv 0[13]$.

3– عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون: $10^{2n}+10^n+1\equiv 0[13]$.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$، نعتبر النقطتين:

$A(3;-2;2)$ ، $B(0;4;-1)$.

1) اكتب معادلة للمستوي (p_1) الذي يشمل النقطة A و $\vec{u}(1;0;-1)$ شعاع ناظمي له.

2) (p_2) المستوي الذي يحوي المستقيم (AB) ويعامد المستوي (p_1).

أ– بيّن أن $\vec{v}(1;1;1)$ شعاع ناظمي لـ (p_2).

ب– اكتب معادلة لـ (p_2).

3) نعتبر النقطتين C و D حيث $C(6;1;5)$ و D معرفة بـ: $\overrightarrow{CD}(0;-3;-6)$.

أ– بين أن المثلث ACD قائم في A واحسب مساحته.

ب– بين أن المستقيم (AB) عمودي على المستوي (ACD).

ج– احسب حجم رباعي الوجوه $ACDB$.

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie
فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الرابع: (06 نقاط)

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=x\left(1+\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right)$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1) أ- أثبت أن الدالة f فردية.

ب- أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f'(x)=1+\frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$

جـ- ادرس تغيرات الدالة f .

2) أ- اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

ب- ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T) واستنتج أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها.

جـ- بيّن أن المستقيم (d) ذو المعادلة $y=x+1$ مقارب للمنحنى (C_f) في جوار $+\infty$، ثم استنتج معادلة (d') المستقيم المقارب الآخر.

د- ارسم (d) و (d') و (C_f) في المعلم السابق.

3) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=|x|\left(1+\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right)$.

أ- بيّن أن الدالة g زوجية.

ب- انطلاقا من (C_f) ارسم (C_g) منحنى الدالة g في نفس المعلم السابق.

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2010

اختبار مادة : الرياضيات **الشعب(ة):** تقني رياضي

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	الموضوع الأول		
أعداد مركبة و تحويلات نقطية	تمرين 1: (5 نقاط)		
	1/ حلول المعادلة $(z-3+2i)(z^2+6z+10)=0$		
	$\Delta'=i^2$	0.50	
	$z_0=3-2i$ ، $z_1=-3+i$ ، $z_2=-3-i$	0.75	
	2/ تعليم النقط A، C، D في المستوي	0.75	
	3/ أ- الجملة تكافئ $\frac{z-3+2i}{z-1}=i$	0.5	
	$Z=3$	0.25	05
	ب- التحقق من أنّ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$	0.5	
	الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع	0.25	
	4/ الكتابتان الجبرية والأسّية للعدد Z : $Z=-i$ ، $Z=e^{i\frac{3\pi}{2}}$	0.5	
	التحقق أنّ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{JI}$ وطبيعة الرباعي $ABIJ$ مربع	0.5+0.5	
هندسة فضائية	تمرين 2: (5 نقاط)		
	1/ $G(\frac{10}{4},-\frac{1}{4},\frac{7}{4})$	01	
	2/ المجموعة (Γ) هي سطح كرة مركزها G ونصف قطرها 1	01	
	3/ أ - تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) : $\begin{cases} x=\frac{10}{4}+u \\ y=-\frac{1}{4}-2u \\ z=\frac{7}{4}+3u \end{cases}$ $u\in\mathbb{R}$	0.5	
	ب - إحداثيات H $H(\frac{135}{56},-\frac{4}{56},\frac{83}{56})$	0.75	05
	جـ - $d(G,p)=\frac{5}{4\sqrt{14}}$	0.75	
	4/ بحل الجملة المشكلة من معادلة (P) وتمثيل وسيطي (P') نجد:		
	$\begin{cases} x=1+t \\ y=5t \\ z=2+3t \end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$ $\lambda=2t$	0.5 + 0.5	
	أو		
	إيجاد شعاع ناظمي لـ (P') : $\vec{n}_{p'}(2;-1;1)$ وتبيان $\vec{n}_{p'}$ و $\vec{n}_P$ لا يوازي		
	إيجاد التمثيل الوسيطي (غير وحيد)		

191


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : الرياضيات الشعب(ة): تقني رياضي

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الدوال العددية	تمرين 3: (7 نقاط)		
	1. $f(x)=x+\frac{-4}{3(e^x-1)}$ ، $(a,b)=(1,-4)$	0.25	
	2. $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ، $\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ ، $\lim_{x\to0} f(x)=+\infty$ ، $\lim_{x\to0} f(x)=-\infty$	4×0.25	
	3. $f'(x)=1+\frac{4e^x}{3(e^x-1)^2}$ ، $f'(x)>0$	0.25+0.5	
	جدول التغيرات	0.25	
	4. أ- $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$ ، $y=x$ م.م.م	0.25	
	(C_f) أسفل (D) في جوار $+\infty$	0.25	07
	$\lim_{x\to-\infty}\left[f(x)-(x+\frac{4}{3})\right]=0$ ، $y=x+\frac{4}{3}$ (D') م.م.م	0.25	
	(C_f) فوق (D') في جوار $-\infty$	0.25	
	$f(x_0)=0$ و $0,9<x_0<0,91$	2×0.5	
	$f(x_1)=0$ و $-1,66<x_1<-1,65$ نظرية القيم المتوسطة		
	جـ - $f(x)+f(-x)=\frac{4}{3}$ (C_f) مركز تناظر $\omega\left(0,\frac{2}{3}\right)$	2×0.25	
	د- رسم (D) و (D') و C_f	0.5+0.25	
	هـ- $m<0$ أو $m>\frac{4}{3}$ حل وحيد	0.25	
	$0\leqslant m\leqslant\frac{4}{3}$ لا توجد حلول	0.25	
	5. g مركب الدالتين f والدالة مربع ($g'(x)=2f(x)f'(x)$).	1	



192

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : الرياضيات الشعب(ة): تقني رياضي

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	تمرين 4: (3 نقط)		
	$n=\overline{11\alpha 00}$		
	$n=49\alpha+2744$, $0\le\alpha\le 6$	0.5	
	1/ لدينا $n\equiv 0[3]$ معناه $\alpha+2\equiv 0[3]$ أي $\alpha\equiv 1[3]$		
	ومنه $\alpha\in\{1,4\}$	0.75	
	2/ $n\equiv 0[5]$ معناه $4\alpha+4\equiv 0[5]$ أي $\alpha+1\equiv 0[5]$		03
	ومنه $\alpha\equiv 4[5]$ إذن $\alpha=4$	0.75	
	n يقبل القسمة على 15 إذا وفقط إذا كان $\alpha=4$	0.5	
	3/ من أجل $\alpha=4$ نجد : $n=2940$	0.5	

193

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : الرياضيات الشعب(ة): تقني رياضي

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	الموضوع الثاني		
الأعداد المركب	**التمرين الأول : (05 ن)**		05
	1) أ - $a = 4e^{\frac{2\pi}{3}i}$	0.75	
	ب - بوضع $Z = re^{i\theta}$ ينتج $r^2e^{i2\theta} = 4e^{i\frac{2\pi}{3}}$	0.5	
	ومنه $Z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ أو $Z = 2e^{i\frac{4\pi}{3}}$	2×0.5	
	2) أ- $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i\sqrt{3}$ ؛ $\left\|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right\| = \sqrt{3}$ ؛ $arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$	3×0.5	
	ب- المثلث ABC قائم في A	0.25	
	3) أ- $\overline{Z}_B + 2 = 1 + \sqrt{3}i$ ، $\arg(\overline{Z} + 2) = \frac{\pi}{3}$ ، $(B \in E)$	0.5	
	ب- $\arg(Z + 2) = -\arg(\overline{Z + 2}) = -\frac{\pi}{3}$		
	$E = [AB) - \{A\}$	0.5	
الموافقات	**التمرين الثاني : (04 ن)**		04
	1) $n = 6k$ الباقي 1 ، $n = 6k+3$ الباقي 12 $n = 6k+1$ الباقي 10 ، $n = 6k+4$ الباقي 3 $n = 6k+2$ الباقي 9 ، $n = 6k+5$ الباقي 4	6×0.25	
	2) $2008 \equiv 4[6]$ و $10^{2008} \equiv 3[6]$ ومنه $(10^{2008})^2 + 10^{2008} + 1 \equiv 0[13]$	1	
	3) $n = 6k+2$ أو $n = 6k+4$ حيث $k \in \mathbb{N}$	6×0.25	
تطبيقات الجداء السلمي في الفضاء -	**التمرين الثالث: (05 ن)**		05
	1/ $(p_1): x - z - 1 = 0$	0.5	
	2/ أ- $\vec{v}.\overrightarrow{AB} = 0$ ، $\vec{v}.\vec{u} = 0$ ومنه $\vec{v}$ ناظمي لـ (P_2)	2×0.5	
	ب- معادلة (P_2) : $x + y + z - 3 = 0$	0.5	
	3/ أ) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AD} = 0$ المثلث ACD قائم في A ، مساحته: $S = \frac{9\sqrt{6}}{2}ua$	2×0.5	
	ب) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$ و $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD} = 0$	2×0.5	
	ج) $v = \frac{1}{3}S \times AB = 27uv$	2×0.5	

194

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الدوال الصماء	التمرين الرابع: (06 نقاط)		06
	1/ أ) f دالة فردية	0.25	
	ب) $f'(x)=1+\frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$	0.5	
	ج) $\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ ، $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$	2×0.25	
	f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$. $(f'(x)>0)$	0.5	
	جدول تغيراتها	0.25	
	2/ أ) $(T): y=2x$	0.5	
	ب) إشارة $f(x)-2x$ و (C_f) يخترق (T) في المبدأ O	0.5	
	المبدأ O نقطة انعطاف لـ (C_f)	0.25	
	ج) (d) مستقيم مقارب مائل معادلته $y=x+1$ في جوار $+\infty$	0.5	
	$(d'): y=x-1$ مقارب (C_f) في جوار $-\infty$	0.5	
	ج) رسم $(C_f),(d'),(d)$	1	
	3/ أ- g دالة زوجية	0.25	
	ب- رسم (C_g)	0.5	

195

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie
فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com