najah213.com · نجاح 213

مديرية التربية لولاية عين الدفلى — ثانوية عبد القادر واضحة العبادية

المستوى : ❸ تقني رياضي –هندسة الطرائق — مارس 2023 — المدة : ❸ ساعات

اختبـــار الفصل الثاني ❷ في مادة التكنولوجيا (هندسة الطـــرائق)

التمرين الأول : الكيمياء العضوية — 06 نقاط

من أجل تحضير المادة العازلة (Green Mask) و التي تستعمل في الدارات الكهربائية نقوم بسلسلة من التفاعلات انطلاقا من الكحول (A)

$$A \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} B$$

$$B + SOCl_2 \longrightarrow C + SO_2 + HCl$$

$$C + C_6H_6 \xrightarrow{AlCl_3} D + HCl$$

$$D + H_2 \xrightarrow{Ni} E$$

$$E \xrightarrow[350°C]{Al_2O_3} F + H_2O$$

$$F + HBr \longrightarrow G$$


$$G + Mg \xrightarrow{ROR} H$$

$$H + CO_2 \xrightarrow{H_2O} I + MgBr(OH)$$

$$I \xrightarrow[H_2O]{LiAlH_4} J$$

$$J \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4} K + H_2O$$

$$n\ K \longrightarrow$$



① أوجد الصيغ نصف المفصلة للمركبات العضوية المجهولة.

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

② أكتب تفاعل كليمنسن للمركب D ثم حضر المركب الناتج عن التفاعل انطلاقا من المركب I

③ مثل مقطع من البوليمير الناتج يتكون من 3 وحدات بنائية .

④ أحسب درجة البلمرة إذا علمت أن : الكتلة المولية المتوسطة للبوليمير $M=266904g/mol$

⑤ يدخل المركب F في تحضير عدة مركبات هامة منها : P ، Q و L كمايلي :



$M(Q) > M(P)$

✓ أوجد الصيغ نصف المفصلة للمركبات العضوية المجهولة .

التمرين الثاني : الليبيدات — 05 نقاط

مادة دهنية X تتكون من مايلي :

55% من ثلاثي غليسيريد TG قرينة أستره $Ie_{(TG)}=195,80$ وقرينة يوده : $Ii_{(TG)}=59,20$		
40% ثنائي الأوليين DG (ثنائي غليسيريد)	3% من حمض بالميتوأولييك	2% من حمض بالميتيك

علما أن:

حمض الأولييك	H_3C ⟋⟍⟋⟍⟋⟍⟋⟍⟋⟍⟋⟍⟋⟍⟋⟍ $COOH$
حمض الباليتيك	لا يتفاعل مع اليود كتلته المولية 256g/mol
حمض بالميتو أولييك E	رمزه : $C16:1\Delta^9$

1- ما نوع التماكب الفراغي لحمض بالميتواولييك ؟ مثل مماكباته .

2-أكتب الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسيريد DG

3-أعطى التحليل المائل لـ 1 مول من ثلاثي الغليسيريد TG : 1 مول من الغليسيرول و 1 مول من الحمض الدهني A و 2 مول من الحمض الدهني B

حيث :

◆ أكسدة الحمض الدهني B بواسطة KMnO4 في وجود حمض الكبريت تعطي مايلي :

✓ حمض أحادي الوظيفة C نسبة الكربون به 68,35%

✓ حمض ثنائي الوظيفة D تعديل m=1g منه استلزم 0,426g من هيدروكسيد الصوديوم NaOH

أ-جد الصيغ نصف المفصلة للأحماض A ,B,D,C

ب-ماهو عدد الصيغ المحتملة لثلاثي الغليسيريد TG

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ج-أكتب معادلة تشكل الصابون اللين لثلاثي الغليسيريد TG (A في الموضع β)

د-أحسب قرينة التصبن للمادة الدهنية.

يعطى : $MNa = 23\ g.mol^{-1}$

$M_I = 127 g.mol^{-1}$ $M_H = 1\ g.mol^{-1}$ $M_C = 12\ g.mol^{-1}$ $M_O = 16\ g.mol^{-1}$ ، $MK = 39\ g.mol^{-1}$

التمرين الثالث : أحماض أمينية و بروتينات — 04 نقاط

خماسي ببتيد مكون من الأحماض الأمينية بالترتيب التالي: A-B-A-C-D

◆ تأثير انزيمي التربسين و الكيموتربسين على رباعي الببتيد أعطى:

$$A-B-A-C-D \xrightarrow{Trpy\ si\ ne} A+B-A+C-D$$

$$A-B-A-C-D \xrightarrow{Chymotrpy\ sine} A-B-A-C+D$$

① حدد الأحماض الأمينية $A.B.C.D$ مع التعليل.

◆ حيث الحمض الأميني A يهاجر بالصيغة A^+ عند $pH = 10$

② أكتب الصيغة نصف المفصلة خماسي الببتيد عند $pH = 13$

③ مثل وفق إسقاط فيشر الصورتين D و L للحمض D.

④ نخضع مزيج الأحماض الأمينية الناتجة عن الإماهة الحامضية للببتيد A ,B,C للهجرة الكهربائية.

وضح برسم تخطيطي مواضع الأحماض الأمينية علي شريط الهجرة الكهربائية عند $pH = 5.66$

⑤ أ-أكتب الصيغ الأيونية للحمض الأميني B عند تغير الـ pH من 1 إلى 14

ب-ما هي الصيغ الأيونية المتواجدة للحمض الأميني B عند : $pH = 9$

جـ-ماهو مجال الـ pH الذي يهجر به الحمض الأمينيB على الشكل B^+

⑥ أكمل التفاعل التالي : $C \xrightarrow[OH^-]{\Delta}$ .....

الاسم و الرمز	الأرغينين Arg	التيروزين Tyr	الليزين Lys	السيستيين Cys
الجدر R :	$-(CH_2)_3-NH-\underset{\underset{NH}{|}}{C}=NH$	$-CH_2-C_6H_4-OH$	$-(CH_2)_3-NH_2$	$-CH_2-SH$
Pka_1	2.17	2.20	2.18	1.96
Pka_2	9.04	9.11	8.95	10.28
Pka_R	12.48	10.07	10.53	8.18


www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الرابع : الديناميكا الحرارية	05 نقاط

❶ يتعرض 1mol من غاز مثالي للتحولات التالية :



- التحول(a): انكماش عكوس ينتقل فيه الغاز من الحالة 1 إلى الحالة 2 حيث تبقى القيمة PV ثابتة.
- التحول(b): تمدد عكوس ينتقل فيه الغاز من الحالة 2 إلى الحالة 3 تحت ضغط ثابت ثم حجم ثابت (تحولين)
- التحول(C): تبريد يعود به الغاز إلى الحالة 1 حيث تبقى القيمة ثابت = $\frac{V}{T}$

أ-ما نوع التحولين (a) و (C) ؟ علل

ب-أكمل الجدول التالي مع التبرير حيث : R=8,314J/mol.k $1atm = 1,01325\times10^5 Pas$

	الحالة (1)	الحالة (2)	الحالة (3)
$V\,(L)$	.....	.....	12.3
$P(atm)$	4	10	4
$T\,(K)$	300	.....	.....

جـ مثل على البيان $P=f(V)$ التحولات الثلاثة (بنفس البيان)

د- أحسب العمل $W_{1\longrightarrow2}$, $W_{2\longrightarrow3}$, $W_{3\longrightarrow1}$ للتحولات الثلاث و العمل الكلي.

❷ مسعر حراري سعته الحرارية C=209J/K به كتلة $m_1 = 350g$ من الماء درجة حرارته T_1=16 °C توضع داخله قطعة من الرصاص كتلتها $m_2 = 280g$ درجة حرارتها T_2=98 °C , نسجل درجة حرارة التوازن T_{eq}=17.7 °C

✓ أحسب السعة الحرارية الكتلية للرصاص C_{plomb} يعطى : C_{eau}=4.185J/g K

بالتوفيق للجميع ...

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com