najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية باتنة
امتحان البكالوريا التجريبي — دورة: ماي 2023
شعبة: العلوم التجريبية — ثانوية عياش مقلاتي الحاسي
اختبار في مادة: الرياضيات — المدة: 03 سا و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضـــــــوع الأول

التمرين الأول: 04 نقاط

I. نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \left(\frac{1+\sqrt{u_n}}{2}\right)^2$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \le u_n \le 1$.
2. بين أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{4}\left(1-\sqrt{u_n}\right)\left(1+3\sqrt{u_n}\right)$، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) و برر تقاربها.

II. المتتالية العددية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \sqrt{u_n} - 1$.

1. أ) بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يطلب حساب حدها الأول.

ب) اكتب v_n بدلالة n، ثم استنتج أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$: $u_n = \left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)^2$ واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

2. احسب بدلالة n المجموع S_n بحيث $S_n = u_0 + u_1 + \ldots\ldots + u_n$.

التمرين الثاني: 04 نقاط

يحتوي كيس على 8 كريات متماثلة منها 6 كريات بيضاء مرقمة بـ: 0,2,2,2,2,4 و كريتين سوداوين مرقمتين بـ: 0,1.
نسحب عشوائيا و في آن واحد ثلاث كريات من هذا الكيس و نعتبر الحدثين A و B بحيث: الحدث A: الحصول على ثلاث كريات مختلفة اللون و الحدث B: الحصول على ثلاث كريات مجموع أرقامها يساوي 4.

1. احسب كلا من $P(A)$ و $P(B)$ احتمالي الحدثين A و B على الترتيب
2. بين أن $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$، ثم استنتج كلا من $P_A(B)$ و $P(A \cup B)$.
3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة عملية سحب أصغر الأرقام المحصل عليها أو يساويها.
   - ✓ عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.
4. نسحب الآن عشوائيا n كرية على التوالي بالإرجاع بحيث $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$ ونسمي C الحدث الحصول على n كرية سوداء.
   - ✓ بين أن $P(C) = \left(\frac{1}{4}\right)^n$، ثم أوجد أصغر قيمة للعدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $P(\overline{C}) \ge 0,99$.

التمرين الثالث: 05 نقاط

I. جد العددين المركبين α و β بحيث: $\begin{cases} 2\overline{\alpha} - \sqrt{3}\,\overline{\beta} = 3\sqrt{3} + i \\ \overline{\alpha i} - \beta = 0 \end{cases}$.

www.dzexams.com
فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

II. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط A، B و C التي لاحقاتها $z_A = \sqrt{3}+i$، $z_B = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}z_A$ و $z_C = -1+i\sqrt{3}$ على الترتيب.

1. اكتب z_B على الشكلين المثلثي و الجبري، ثم استنتج القيم المضبوطة لـ $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

2. أ) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $\left(\frac{z_B}{\sqrt{2}z_A}\right)^n$ تخيليا بحتا سالبا تماما.

ب) تحقق أن B صورة A بتحويل نقطي S يطلب تعيين طبيعته و تحديد عناصره المميزة.

3. أ) بين أن $\frac{z_C}{z_A} = i$، ثم استنتج طبيعة المثلث AOC.

ب) تحقق أن $z_B - z_A = z_C$ ثم حدد بدقة طبيعة الرباعي $AOCB$.

ج) عين طبيعة المجموعة (E) مجموعة النقط $M(Z)$ بحيث $\left|\frac{\overline{z}-\sqrt{3}+i}{\frac{\sqrt{2}}{2}iz}\right| = \left|\frac{z_B}{z_A}\right|$، ثم عين صورتها بالتحويل النقطي S.

التمرين الرابع: 07 نقاط

I. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(x^2-3x+1)e^{2x}+1$ و الجدول المقابل يمثل جدول تغيراتها.

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$1-e$	↗	$1+5e^{(-2)}$	↘	1

1. بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما العدد 2 والآخر α بحيث $0,4<\alpha<0,5$.
2. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(-x^2+x)e^{2-x}+x$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1. أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب) بين أنه من أجل $x\in\mathbb{R}$: $f'(x)=g(x)$، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f

2. بين أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين احداثيتيهما.
3. أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$، ثم ادرس الوضع النسبي لـ (C) و (Δ).

ب) بين أن (C_f) يقبل مماسين موازيين لـ (Δ).

4. احسب $f(0)$، ثم أنشئ (Δ) و مثل (C_f) على المجال $[0;+\infty[$. يعطى $f(\alpha)\approx 1,65$.
5. أ) بين أن الدالة H المعرفة بـ: $H(x)=(x^2+x+1)e^{2-x}$ دالة أصلية للدالة $x\mapsto(-x^2+x)e^{2-x}$ على $\mathbb{R}$.

ب) احسب المساحة A للحيز المحدد بـ: (C_f) و (Δ) و المستقيمين اللذين معادلتاهما $x=0$ و $x=1$.

انتهـــــــــى الموضوع الأول

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضـــــوع الثانـــــي


التمرين الأول: 04.5 نقطة

يحتوي وعاء U على ثلاث كريات متماثلة مرقمة بـ: $-1,0,1$ ، و يحتوي وعاء V على خمس كريات لا نفرق بينها باللمس منها ثلاث كريات حمراء و كريتين بيضاوين.

نسحب عشوائيا كريتين على التوالي بالإرجاع من الوعاء U فإذا كان مجموع رقميهما معدوما نسحب عشوائيا كريتين على التوالي بدون إرجاع من الوعاء V و إذا كان مجموع رقميهما غير معدوما نسحب عشوائيا و في آن واحد كريتين من الوعاء V.

نسمي A الحدث: الحصول على كريتين مجموع رقميهما معدوم من الوعاء U.

نسمي B الحدث: الحصول على كريتين من نفس اللون من الوعاء V.



1. بين أن $P(A)=\frac{1}{3}$ و أن $P_A(\overline{B})=\frac{3}{5}$.
2. انقل ثم أكمل شجرة الاحتمالات المقابلة.
3. احسب كلا من $P(\overline{B})$ و $P(\overline{A}\cap\overline{B})$، ثم استنتج $P_{\overline{B}}(\overline{A})$.
4. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بعملية سحب كريتين من نفس اللون من الوعاء V العدد α^2 و يرفق بسحب كريتين مختلفتين في اللون العدد α بحيث α عدد صحيح غير معدوم.

أ) عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X، ثم احسب بدلالة α أمله الرياضياتي $E(X)$.

ب) عين قيمة العدد الصحيح α حتى يكون $E(X)=-\frac{1}{5}$.

التمرين الثاني: 04 نقاط

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $\begin{cases}u_0=1\\u_{n+1}=\frac{1}{3}u_n+\frac{5}{3}\end{cases}$.

1. أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n<\frac{5}{2}$.

ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)، ثم استنتج أنها متقاربة.

2. أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\frac{5}{2}-u_{n+1}=\frac{1}{3}\left(\frac{5}{2}-u_n\right)$.

ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\frac{5}{2}-u_n=\left(\frac{1}{3}\right)^n\left(\frac{5}{2}-u_0\right)$، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n و احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=\ln(u_{n+1}-u_n)$.

أ. بين أن (v_n) متتالية حسابية أساسها $r=-\ln 3$ يطلب حساب حدها الأول، ثم اكتب v_n بدلالة n.

ب. احسب بدلالة n الجداء P_n بحيث: $P_n=(u_1-u_0)\times(u_2-u_1)\times.....\times(u_{n+1}-u_n)$.

التمرين الثالث: 04.5 نقطة

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط $A\left(z_A=e^{i\frac{\pi}{6}}\right)$، $B(z_B=-\overline{z_A})$، $z_C=-i$.

www.dzexams.com
فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1. نعتبر الدوران R الذي مركزه النقطة A و زاويته $\theta = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}$ و الذي يحول النقطة $M(Z)$ إلى النقطة $M'(z')$.

أ) عين الكتابة المركبة للدوران R، ثم تحقق أنه يحول النقطة C إلى النقطة B.

ب) استنتج طبيعة المثلث ABC، ثم استنتج العناصر المميزة للدائرة المحيطة به.

ج) عين لاحقة النقطة D التي من أجلها يكون الرباعي $ABCD$ معينا.

2. بين أن $i = -\left[\frac{1}{2}\left(z_B - \overline{z_A}\right)\right]^{2973} + \left(\frac{z_B}{z_A}\right)^{1443} + \left(z_A \times z_B\right)^{2023}$.

3. عين طبيعة المجموعة (E) للنقط $M(z)$ بحيث: $Arg\left(\frac{z_C - z}{z_A - z}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}$.

4. ليكن S التحويل النقطي الذي يحول النقطة $M(z)$ إلى النقطة $M'(z')$ بحيث: $z' = \left(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z + z_C$.

أ) عين طبيعة التحويل النقطي S محددا عناصره المميزة.

ب) استنتج طبيعة التحويل النقطي $S \circ R$ محددا عناصره المميزة.

التمرين الرابع: 07 نقاط

I. نعتبر الدالة g المعرفة و المتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ بحيث: $g(x) = x^3 + 3x - 2$.

1. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن $0,5 < \alpha < 0,7$.

2. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. الدالة f معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \ln\left(\frac{x^3+1}{x^2+1}\right)$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1. تحقق أنه من أجل $x > -1$: $f(x) = \ln(x+1) + \ln\left(1 - \frac{x}{x^2+1}\right)$ ثم احسب $\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

2. أ) بين أنه من أجل $x > -1$: $f'(x) = \frac{xg(x)}{(x^3+1)(x^2+1)}$، ثم تحقق أنه من أجل $x > -1$: $x^3 + 1 > 0$.

ب) ادرس حسب قيم x إشارة $f'(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

3. بين أن $f(\alpha) = \ln\left(\frac{3}{2}\alpha\right)$، ثم استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$.

4. الدالة h معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $h(x) = \ln(x+1)$ و (C_h) تمثيلها البياني في المستوي السابق.

أ) استنتج أن (C_h) صورة المنحنى الممثل للدالة $x \mapsto \ln x$ بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه.

ب) احسب $\lim\limits_{x \to +\infty}\left[f(x) - h(x)\right]$، ثم فسر النتيجة بيانيا و ادرس الوضع النسبي لـ (C_h) و (C_f).

5. أ) احسب $f(1)$ و مثل (C_h)، ثم مثل (C_f).

ب) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي الموجب تماما m التي من أجلها المعادلة $f(x) = \ln(m)$ تقبل ثلاث حلول متمايزة.

انتهى الموضوع الثاني

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com