
najah213.com · نجاح 213



المستوى ثانية علوم تجريبية/ تقني رياضي	أكتوبر 2023
الفرض الأول في مادة الرياضيات	المدة :ساعتان



التمرين الأول (10 ن):

I) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^3 - 3x + 2$

(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(**انظر الشكل المقابل**).

1) اثبت أن $\Omega(0\ ;\ 2)$ مركز تناظر لـ (C_f).

2) بقراءة بيانية عين إشارة $f(x)$ حسب قيم x .

II) g و h دالتين معرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$h(x) = |x^3 - 3x + 2| \ ; g(x) = x^2|x| - 3|x| + 2$$

و ليكن (C_g)و (C_h) المنحنيين الممثلين للدالتين g وh على الترتيب في معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) بين أن g دالة زوجية.

2) اكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

3) اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم أنشئه.**(على الوثيقة المرفقة).**

4) أ) اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

ب) اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم أنشئه. **(على الوثيقة المرفقة).**

التمرين الثاني (10 ن):

نعتبر كثير الحدود $P(x)$ المعرف بـ: $P(x) = 2\,x^3 - 13x^2 + 13x + 10$

1) أحسب $P(2)$. ماذا تستنتج؟

2) أوجد الأعداد الحقيقية a , b و c حيث من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$$

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$.

4) أدرس إشارة $P(x)$ ثم استنتج حلول المتراجحة $P(x) < 0$.

5) استنتج حلول المعادلة: $2x\sqrt{x} - 13x + 13\sqrt{x} + 10 = 0$

6) نضع $Q(x) = \frac{P(x)}{x^2-4}$

أ) عين قيم x حتى تكون $Q(x)$ معرفة.

ب) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $Q(x) > 0$.

بالتوفيق


www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً


najah213.com

الاسم :

اللقب :



$$g(x) = x^2|x| - 3|x| + 1$$



$$h(x) = |x^3 - 3x + 1|$$

الوثيقة المرفقة

www.dzexams.com

najah213.com · نجاح 213

التصحيح النموذجي

التمرين الأول

1) إثبات أن $\Omega(0\ ;\ 2)$ مركز تناظر لـ (C_f).

من اجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن $-x$ من $\mathbb{R}$: $f(-x)+f(x)=4$

2) إشارة $f(x)$:

x	$+\infty$		-2		1		$-\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	

II) 1) نبين أن g دالة زوجية.

من اجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن $-x$ من $\mathbb{R}$: $g(-x)=g(x)$

2)كتابة $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

❖ $g(x)=f(|x|)$:

$$g(x)=\begin{cases} x^3-3x+2 & ;\ x\in[0;+\infty[\\ -x^3+3x+2 & ;\ x\in]-\infty;0] \end{cases}$$


3) كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f)

- لما $x\in[0;+\infty[$: (C_g) ينطبق على (C_f).
- لما $x\in]-\infty;0]$: (C_g)نظير الجزء المنطبق بالنسبة إلى محور التراتيب.

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الرسم:



3) أ) $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

$h(x) = |f(x)|$:


$$h(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 2 & ; \quad x \in [-2; +\infty[\\ -x^3 + 3x - 2 & ; \quad x \in]-\infty; -2] \end{cases}$$

ب) كيفية إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_f)

- لما $x \in [-2; +\infty[$: (C_h)ينطبق على (C_f).
- لما $x \in]-\infty; -2]$: (C_h)نظير الجزء غير المنطبق بالنسبة إلى محور الفواصل

www.dzexams.com

الرسم:



التمرين الثاني

1) $P(2) = 0$. نستنتج أن 2 جدر لكثير الحدود $P(x)$.

2) إيجاد الأعداد الحقيقية a , b و c: $\begin{cases} a = 2 \\ b = -9 \\ c = -5 \end{cases}$

إذن: $P(x) = (x - 2)(2x^2 - 9x - 5)$

3) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$:

$$S = \left\{-\frac{1}{2}; 2; 5\right\}$$

4) إشارة $P(x)$:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		2		5		$+\infty$
$x-2$	-		-		0	+			+
$2x^2 - 9x - 5$	+		0	-		-	0		+
$P(x)$	-		0	+	0	-	0		+

www.dzexams.com

حلول المتراجحة $P(x) < 0$: $S =]-\infty; -1/2[\cup]2; 5[$

5) استنتج حلول المعادلة $2x\sqrt{x} - 13x + 13\sqrt{x} + 10 = 0$

نضع $t = \sqrt{x}$ مع $t > 0$ و منه $x = t^2$

$t = 5$ أو $t = 2$ إذن $x = 25$ أو $x = 4$

$S = \{4 ; 25\}$

6) أ) قيم x حتى تكون $Q(x)$ معرفة هي $x \in \mathbb{R} \{-2; 2\}$

ب) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $Q(x) > 0$

إشارة $Q(x)$

x	$-\infty$		-2		$\frac{-1}{2}$		2		5		$+\infty$
$P(x)$	-		-		0	+	0	-	0		+
$x^2 - 4$	+	0	-		-		0	+			+
$Q(x)$	-	‖	+		0	-	‖		-	0	+

حلول المتراجحة $Q(x) > 0$: $S =]-2 ; \frac{-1}{2}[\cup]5 ; +\infty[$

www.dzexams.com