الصبقري في الرياضيات

طبعة 2021

✦ المتتاليات العددية ✦

الثالثة ثانوي

الشعب: ☒ آداب وفلسفة؛

☒ آداب ولغات أ.

جمع وإعداد الأستاذ: بوعزة مصطفى.

مجلة العبقري في الرياضيات (المتتاليات العددية)

الدروس// الشعبة: الثالثة آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

دروس: حول المتتاليات العددية// التحضير الجيد للبكالوريا// الشعبة: 03 آ وف؛ لغ أ.

❶ عموميات على المتتاليات العددية:

① تعريف متتالية عددية:

تعريف:

متتالية u هي دالّة تُرفق بكل عدد طبيعي n، أكبر من أو يساوي عدد طبيعي n_0 مُعطى، العدد (u_n).

ترميز:

- نرمز إلى **صورة العدد** الطبيعي n بالمتتالية u بـ u_n بدلاً من $u(n)$.
- نرمز إلى المتتالية u بـ $(u_n)_{n\geq n_0}$، إذا كانت معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي n_0.
- نرمز إلى المتتالية u بـ $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ أو (u_n)، إذا كانت معرّفة على $\mathbb{N}$.
- يسمى u_n **الحد العام** للمتتالية u ويسمى u_{n_0} **حدّها الأوّل**.
- إذا كانت **المتتالية** (u_n) **معرّفة على** $\mathbb{N}$ نرمز إلى **حدّها الأوّل** بالرمز u_0.
- إذا كانت **المتتالية** (u_n) **معرّفة على** $\mathbb{N}^*$ نرمز إلى **حدّها الأوّل** بالرمز u_1.

ملاحظة:

لابد من **التمييز بين متتالية** (u_n) **وَ** بين **حدّها العام** u_n الذي هو **عدد حقيقي**.

② طُرق توليد متتاليات:

أ)توليد متتالية بالحد العام:

تعريف:

يمكن تعريف متتالية $(u_n)_{n\geq n_0}$ بوضع من أجل كل عدد طبيعي n مع $n \geq n_0$، $\boxed{u_n = f(n)}$ حيث f دالّة معرّفة على $[n_0; +\infty[$.

مثال:(● من بكالوريا 2008 الموضوع I)

(u_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_n = 3n + 1$.

1/حساب u_0، u_1، u_2:

طريقة:

العلاقة $u_n = 3n + 1$، **تسمح من حساب قيمة كل الحدود** ومن أجل ذلك **يكفي تعويض n** على التوالي بـ0، 1، 2، ...

إذن: $u_0 = 3 \times (0) + 1 = 0 + 1 = 1$،
$u_1 = 3 \times (1) + 1 = 3 + 1 = 4$،
$u_2 = 3 \times (2) + 1 = 6 + 1 = 7$.

ب)توليد متتالية بعلاقة تراجعية:

تعريف:

يُمكن تعريف متتالية بالتراجع وذلك بإعطاء:

- ❑ **قيمة الحد الأوّل.**
- ❑ **علاقة تراجعية تربط بين حدين متتابعين من المتتالية.**

مثال:(● من بكالوريا 2008 الموضوع II)

(u_n) متتالية عددية معرّفة بحدّها الأول $u_1 = 7$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

1)حساب u_2، u_3، u_4:

لدينا: $\begin{cases} u_1 = 7 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$

طريقة:

تسمح العلاقة $u_{n+1} = 2u_n + 1$، **بحساب قيمة الحد u_{n+1}، إذا عُلمت قيمة الحد الذي يسبقه u_n.**

- معرفة قيمة u_0 تسمح من حساب قيمة u_1.
- معرفة قيمة u_1 تسمح من حساب قيمة u_2.
- معرفة قيمة u_9 تسمح من حساب قيمة u_{10}، وهكذا ...

إذن:
$u_2 = 2u_1 + 1 = 2 \times (7) + 1 = 14 + 1 = 15$،
$u_3 = 2u_2 + 1 = 2 \times (15) + 1 = 30 + 1 = 31$،
$u_4 = 2u_3 + 1 = 2 \times (31) + 1 = 62 + 1 = 63$.

تمرين محلول 01 ص 33:

لتكن المتتالية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي:
$u_n = -3n^2 + 1$.

1. أحسب u_0، u_1، u_2 و u_{20}.
2. أكتب بدلالة n الحدود u_{n+1}، u_{2n}، u_{3n+2}.

الحل:

لاحظ أنّ: المتتالية (u_n) معرّفة بحدّها العام u_n

لأنّه: أُعطي حدها العام u_n بدلالة n.

1.حساب u_0، u_1، u_2 و u_{20}:

بالتعويض نجد:

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

$u_0 = -3(0)^2 + 1$
$= -3(0) + 1 = 0 + 1 = 1$
$u_1 = -3(1)^2 + 1$
$= -3(1) + 1 = -3 + 1 = -2$
$u_2 = -3(2)^2 + 1$
$= -3(4) + 1 = -12 + 1 = -11$
$u_{20} = -3(20)^2 + 1$
$= -3(400) + 1$
$= -1200 + 1 = -1199$

2.كتابة بدلالة n الحدود u_{n+1}، u_{2n}، u_{3n+2}:

بالتعويض نجد:

$u_{n+1} = -3(n+1)^2 + 1$
$= -3(n^2 + 2n + 1) + 1$
$= -3n^2 - 6n - 3 + 1$
$= -3n^2 - 6n - 2$

$u_{2n} = -3(2n)^2 + 1$
$= -3(4n^2) + 1 = -12n^2 + 1$

$u_{3n+2} = -3(3n+2)^2 + 1$
$= -3(9n^2 + 12n + 4) + 1$
$= -27n^2 - 36n - 12 + 1$
$= -27n^2 - 36n - 11$

تمرين محلول 02 ص33:

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 2$
ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = -2u_n + 1$.
1.أحسب u_1، u_2، u_3.

الحل:

لاحظ أنّ: المتتالية (u_n) معرّفة بالتراجع
لأنّه: أعطيت قيمة حدّها الأوّل $u_0 = 2$، وعلاقة تراجعية $u_{n+1} = -2u_n + 1$.

1.حساب u_1، u_2، u_3:

$u_1 = -2u_0 + 1 = -2(2) + 1 = -4 + 1 = -3$،
$u_2 = -2u_1 + 1 = -2(-3) + 1 = 6 + 1 = 7$،
$u_3 = -2u_2 + 1 = -2(7) + 1 = -14 + 1 = -13$.


تمرين محلول 03 ص33: (عمل منزلي)

❷ المتتالية الحسابية:

① تعريف:

نقول أنّ المتتالية (u_n) **متتالية حسابية** حدّها الأول u_0 وأساسها r (r عدد حقيقي)

إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n:
$u_{n+1} = u_n + r$.



② عبارة الحد العام:

خاصية 01:

إذا كانت (u_n) **متتالية حسابية** أساسها r، فإنّه من أجل كل عددين طبيعيين n وp، $u_n = u_p + (n-p)r$.

حالات خاصة:

$u_n = u_0 + nr$ وَ $u_n = u_1 + (n-1)r$.

③ مجموع حدود متتابعة من متتالية حسابية:

خاصية 02:

إذا كانت (u_n) **متتالية حسابية**، فإنّ:

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = (n+1)\left(\frac{u_0 + u_n}{2}\right)$$

بصفة عامة:

$$S = (\text{عدد الحدود})\left(\frac{\text{الحد الأخير} + \text{الحد الأوّل}}{2}\right)$$

حيث:

عدد الحدود = دليل الحد الأخير − دليل الحد الأوّل $+ 1$

④ خاصية الوسط الحسابي:

خاصية 03:

تكون الأعداد a، b وc بهذا الترتيب حدوداً متتابعة من متتالية حسابية إذا وفقط إذا كان $a + c = 2b$.
يسمى العدد b **الوسط الحسابي** للعددين a وc.

مثال: (● حل تمارين البكالوريا)

حسابية معرّفة بحدّها العام.

التمرين 01: (05 نقاط) بكالوريا 2008// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_n = 3n + 1$.
1/احسب u_0، u_1، u_2.
2/بيّن أنّ (u_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها. عيّن اتجاه تغيّر (u_n).
3/تحقّق أنّ العدد 2008 حدّ من حدود المتتالية (u_n). ما رتبته؟
4/احسب المجموع: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{669}$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

حسابية معرّفة بحدّين مختلفين.

التمرين 05: (05 نقاط) بكالوريا 2010// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

$(I)(u_n)$ متتالية حسابية معرّفة على $\mathbb{N}$ بالحدين :

$u_{10} = 31$ وَ $u_{15} = 46$.

1-عيّن أساسها وحدّها الأول u_0.

2-أكتب u_n بدلالة n.

3-بيّن أنّ 6028 حدّ من حدود المتتالية (u_n).

4-أحسب المجموع S: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{2009}$.

حسابية معرّفة بحد وعلاقة.

التمرين 03: (06 نقاط) بكالوريا 2009// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية حسابية معرّفة على $\mathbb{N}^*$ بحدّها الأول $u_1 = 2$ وبالعلاقة $u_2 - 2u_5 = 19$.

1)أ-أحسب الأساس r للمتتالية (u_n).

ب-أحسب الحد العاشر.

2)أكتب عبارة u_n بدلالة n.

3)بيّن أنّ العدد (-2008) هو حداً من حدود (u_n). محدّدا رتبته.

4)أحسب المجموع: $S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{671}$.

حسابية معرّفة بعلاقة يُوظف فيها الوسط الحسابي.

التمرين 27: (06 نقاط) بكالوريا 2020// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لتكن (u_n) متتالية حسابية حدّها الأوّل u_0 وأساسها r حيث:

$u_2 - u_0 = 4$ وَ $u_1 + u_3 = 16$.

1)احسب الحدّ u_2، ثمّ الحدّ u_0 واستنتج الأساس r للمتتالية (u_n).

2)أ. بيّن أنّ الحدّ العام للمتتالية (u_n) معرّف بـ:

$u_n = 4 + 2n$.

ب. حدّد مع التّبرير اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3)بيّن أنّ العدد 2020 حدّ من حدود المتتالية (u_n)، محدّداً رُتبته.

4)احسب المجموع S المعرّف بـ:

$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{1008}$.


❸ المتتالية الهندسية:

① تعريف:

نقول أنّ المتتالية (u_n) **متتالية هندسية** حدّها الأوّل u_0 وأساسها q (q عدد حقيقي)

إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} = u_n \times q$$



② عبارة الحد العام.

خاصية 01:

إذا كانت (u_n) **متتالية هندسية** أساسها q، فإنّه من أجل كل عددين طبيعيين n وp، $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

حالات خاصة:

$u_n = u_0 \times q^n$ وَ $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.

③ مجموع حدود متتابعة من متتالية هندسية:

خاصية 02:

إذا كانت (u_n) **متتالية هندسية** أساسها q يختلف عن 1 فإنّ:

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = u_0\left(\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right)$$

بصفة عامة:

$$S = \text{الحد الأوّل} \left(\frac{1-\text{الأساس}^{\text{عدد الحدود}}}{1-\text{الأساس}}\right)$$

حيث:

عدد الحدود = دليل الحد الأخير − دليل الحد الأوّل + 1

حالة خاصة:

إذا كان $q = 1$، فإنّ:

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = (n+1)u_0$$

④ خاصية الوسط الهندسي:

خاصية 03:

تكون الأعداد غير المعدومة a، b وc بهذا الترتيب حدوداً متتابعة من متتالية هندسية إذا وفقط إذا كان $a \times c = b^2$.

يسمى العدد b الوسط الهندسي للعددين a وb.

مثال: (● حل تمارين البكالوريا)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

هندسية معرّفة بحدّها العام.

التمرين 05: (05 نقاط) بكالوريا 2010// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

II)نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ :

$v_n = 2 \times 8^n$.

1-بيّن أنّ (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول v_0.

2-أحسب بدلالة n المجموع S': $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

هندسية معرّفة بحدّين مختلفين

التمرين 04: (07 نقاط) بكالوريا 2009// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية هندسية معرّفة على $\mathbb{N}$ وأساسها **موجب**.

1-عيّن أساس هذه المتتالية وحدّها الأول u_0 **إذا علمت** أنّ:

$u_3 = 144$ و $u_5 = 576$.

2-تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 18 \times 2^n$.

3-أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$،

ثمّ استنتج قيمة العدد الطبيعي n حيث: $S_n = 1134$.

هندسية معرّفة بحدّين مختلفين

التمرين 06: (07 نقاط) بكالوريا 2010// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية هندسية معرّفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$، أساسها q وحدّها الأوّل u_0 حيث:

$u_1 = 6$ و $u_4 = 48$.

1.أ-أحسب الأساس والحدّ الأوّل للمتتالية (u_n).

ب-استنتج أنّ عبارة الحدّ العام للمتتالية (u_n) هي:

$u_n = 3 \times 2^n$.

2.أ-علماً أنّ $2^8 = 256$؛ بيّن أنّ العدد 768 هو حدّ من حدود المتتالية (u_n).

ب-أحسب المجموع S حيث: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_7$.

هندسية معرّفة بعلاقة يُوظف فيها الوسط الحسابي.

التمرين 28: (06 نقاط) بكالوريا 2020// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لتكن (u_n) متتالية هندسية حدّها الأوّل u_1، حدودها موجبة تماما حيث: $u_3 \times u_5 = 2916$.

1)احسب الحد u_4.

2)علما أنّ $u_3 = 18$، تحقّق أنّ أساس المتتالية (u_n) هو 3.

3)احسب الحدّ الأوّل u_1، ثمّ اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

4)عيّن رتبة الحدّ الذي قيمته 1458. (لاحظ أنّ: $729 = 3^6$)

5)احسب بدلالة n المجموع S_n حيث:

$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

❹ المتتالية الرتيبة:

① اتجاه تغيّر متتالية عددية:

تعاريف:

(u_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$.

❑ القول عن (u_n) أنّها **متزايدة** يعني أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $\boxed{u_{n+1} \geq u_n}$.

❑ القول عن (u_n) أنّها **متناقصة** يعني أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $\boxed{u_{n+1} \leq u_n}$.

❑ القول عن (u_n) أنّها **ثابتة** يعني أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $\boxed{u_{n+1} = u_n}$.

❑ القول عن (u_n) أنّها **رتيبة** يعني أنّها **إما متزايدة وإما متناقصة**.

ملاحظات:

❍ تبقى التعاريف السابقة صحيحة في حالة متتالية $(u_n)_{n \geq n_0}$ معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq n_0$.

❍ توجد **متتاليات ليست متزايدة وليست متناقصة.** نقول عنها أنّها **غير رتيبة** ونذكر على سبيل المثال المتتالية (u_n) المعرّفة بحدّها العام $u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

❍ تكون المتتالية (u_n) **ثابتة** إذا وفقط إذا وُجد عدد حقيقي k بحيث من أجل كل عدد طبيعي n، $\boxed{u_n = k}$.

② اتجاه تغيّر متتالية حسابية:

(u_n) متتالية حسابية معرّفة على $\mathbb{N}$، حدّها الأوّل u_0 وأساسها r.

لدينا: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} - u_n = \boldsymbol{r}$

ومنه:

☜ إذا كان $\boldsymbol{r}$ **سالبا تماما** $(r < 0)$، فإنّ المتتالية **متناقصة تماما**.

☜ إذا كان $\boldsymbol{r}$ **موجبا تماما** $(r > 0)$، فإنّ المتتالية **متزايدة تماما**.

☜ إذا كان $\boldsymbol{r}$ **معدوما** $(r = 0)$، فإنّ المتتالية **ثابتة**.

③ اتجاه تغيّر متتالية هندسية:

(u_n) متتالية هندسية معرّفة على $\mathbb{N}$، حدّها الأوّل u_0 وأساسها q.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

نعلم أنّ: $u_n = u_0 \times q^n$ وَ $u_{n+1} = u_0 \times q^{n+1}$.
نستنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n،

$$u_{n+1} - u_n = u_0 \times q^n \times (q-1)$$

ومنه:

- إذا كان $0 < q < 1$ وكان $u_0 > 0$، فإنّ **المتتالية (u_n) متناقصة.**
- إذا كان $0 < q < 1$ وكان $u_0 < 0$، فإنّ **المتتالية (u_n) متزايدة.**
- إذا كان $q > 1$ وكان $u_0 > 0$، فإنّ **المتتالية (u_n) متزايدة.**
- إذا كان $q > 1$ وكان $u_0 < 0$، فإنّ **المتتالية (u_n) متناقصة.**
- إذا كان $q = 1$، فإنّ **المتتالية (u_n) ثابتة.**
- إذا كان $q = 0$، **تكون كل حدود المتتالية (u_n) معدومة ابتداءً من الحد الثاني.**
- إذا كان $q < 0$، فإنّ **الفرق $u_{n+1} - u_n$ لا يحتفظ بإشارة ثابتة لأنّ q^n لا يحتفظ بإشارة ثابتة ومنه المتتالية (u_n) ليست رتيبة.**

يُمكن تلخيص ذلك في جدول:

إذا كان	$0 < q < 1$	$q > 1$	$q = 1$	$q \leq 0$
$u_0 > 0$	(u_n) متناقصة تماما	(u_n) متزايدة تماما	(u_n) ثابتة	(u_n) غير رتيبة
$u_0 < 0$	(u_n) متزايدة تماما	(u_n) متناقصة تماما		

تمرين محلول 01 ص 37:

لتكن (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي:
$u_n = n^2 - n$.
1.أحسب $u_{n+1} - u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n.
2.استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

طريقة:

لدراسة اتجاه تغيّر متتالية (u_n)، لا يكفي المقارنة بين u_1 وu_0 **أو** بين u_3 وu_2 **أو** ... وإنّما يجب المقارنة بين u_{n+1} وu_n من أجل كل عدد طبيعي n.

الحل:

1.**حساب $u_{n+1} - u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n:**
لدينا: $u_n = n^2 - n$،
ومنه:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (n+1)^2 - (n+1) \\ &= (n^2 + 2n + 1) - (n+1) \\ &= n^2 + 2n + 1 - n - 1 \\ &= n^2 + n \end{aligned}$$

وعليه:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n^2 + n) - (n^2 - n) \\ &= n^2 + n - n^2 + n = 2n \end{aligned}$$

2.**استنتاج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n):**
بمأنّ: $u_{n+1} - u_n = 2n \geq 0$، فإنّ: (u_n) متزايدة تماما.

تمرين محلول 03 ص 37:

لتكن (v_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـِ: $v_n = \frac{3^n}{2^{n+1}}$.
1.بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تحديد أساسها وحدّها الأوّل.
2.ما هو اتجاه تغيّر المتتالية (v_n)؟

الحل:

1.**تبيّان أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تحديد أساسها وحدّها الأوّل:**
نُبين أنّ حاصل القسمة $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ عدد ثابت.
لدينا: $v_{n+1} = \frac{3^{(n+1)}}{2^{(n+1)+1}} = \frac{3^n \times 3^1}{2^{n+1} \times 2^1} = \frac{3^n}{2^{n+1}} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2} v_n$.
إذن: المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{2}$، وحدّها الأوّل $v_0 = \frac{3^0}{2^{0+1}} = \frac{1}{2}$.

2.**دراسة اتجاه تغيّر المتتالية (v_n):**
بما أنّ: $q = \frac{3}{2} > 1$ وَ $v_0 = \frac{1}{2} > 0$، فإنّ المتتالية (v_n) متزايدة تماماً.

ط2) ندرس إشارة الفرق $v_{n+1} - v_n$:
لدينا: $v_{n+1} - v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{3}{2}\right)^n \geq 0$،
إذن: المتتالية (v_n) **متزايدة تماماً.**

❺ المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$:
($a \neq 0$ وَ $b \neq 0$)

تمرين محلول ص 39:

لتكن المتتالية (u_n) المعرّفة بحدّها الأوّل $u_0 = \alpha$
وبالعلاقة: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.
أ) نفرض $\alpha = 3$.
اثبت أنّ المتتالية (u_n) ثابتة ثمّ أحسب، بدلالة n، المجموع $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
ب) نفرض $\alpha = 2$ ونعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة: $v_n = u_n - 3$.
1.أثبت أنّ المتتالية (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأوّل.
2.أحسب v_n بدلالة n ثمّ استنتج u_n بدلالة n.
3.أحسب، بدلالة n، المجموع

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

4.ما هو اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)؟

الحل:

لدينا: $\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 \end{cases}$.

أ) بفرض $\alpha = 3$، ومنه: $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 \end{cases}$.

المتتالية (u_n) ثابتة **معناه** $u_0 = u_1 = u_{n-1} = u_n = 3$

حساب، بدلالة n، المجموع $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$:

من أجل كل عدد طبيعي n،

$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)u_0 = 3(n+1)$

ب) بفرض $\alpha = 2$، ومنه: $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 \end{cases}$.

ولدينا: (v_n) متتالية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة: $\boxed{v_n = u_n - 3}$.

1.إثبات أنّ المتتالية (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأوّل:

نكتب v_{n+1} بدلالة v_n:

1.لدينا:

$v_{n+1} = u_{n+1} - 3$
$= \frac{1}{3}u_n + 2 - 3$
$= \frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$

ومنه: $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n$.

إذن: المتتالية (v_n) متتالية **هندسية**، أساسها $\boxed{q = \frac{1}{3}}$

وحدّها الأوّل $\boxed{v_0 = u_0 - 3 = 2 - 3 = -1}$.

2.حساب v_n بدلالة n ثمّ استنتاج u_n بدلالة n:

- **لدينا:** $\boxed{v_n = v_0 \times q^n = -\left(\frac{1}{3}\right)^n}$.
- **لدينا:** $v_n = u_n - 3$

ومنه: $\boxed{u_n = v_n + 3 = -\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3}$.

3.حساب، بدلالة n، المجموع $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$:

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$
$= (v_0 + 3) + (v_1 + 3) + \cdots + (v_n + 3)$
$= (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) + (3 + 3 + \cdots + 3)$
$= v_0\left(\frac{1-q^{n-0+1}}{1-q}\right) + 3(n - 0 + 1)$
$= -1\left(\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}\right) + 3(n+1)$

ومنه: $S = -\left(\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\frac{2}{3}}\right) + 3(n+1)$

$= -\frac{3}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right) + 3(n+1)$

4.دراسة اتجاه تغيّر المتتالية (u_n):

ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$:

لدينا: $u_{n+1} - u_n = \left[-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} + 3\right] - \left[-\left(\frac{1}{3}\right)^{n} + 3\right]$

$= -\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} + 3 + \left(\frac{1}{3}\right)^{n} - 3$
$= -\left(\frac{1}{3}\right)^{n} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{1} + \left(\frac{1}{3}\right)^{n}$
$= \left(\frac{1}{3}\right)^{n}\left(-\frac{1}{3} + 1\right)$
$= \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{n} > 0$

نستنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} - u_n > 0$

إذن: المتتالية (u_n) **متزايدة تماما**.

مثال:(● حل تمارين البكالوريا)

التمرين **02**: (**06** نقاط) بكالوريا **2008**// الموضوع **02**// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية عددية معرّفة بحدّها الأول $u_1 = 7$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

1)أحسب u_2، u_3، u_4.

2)من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، نُعرف المتتالية (v_n) كما يأتي: $v_n = u_n + 1$.

أ-أثبت أنّ (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها q وحدّها الأول v_1.

ب-اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثمّ استنتج u_n بدلالة n.

ج-نضع: $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$، احسب S_n بدلالة n.

د-عيّن n علماً أنّ $S_n = 1016$.

الحمد لله.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

najah213.com · نجاح 213

مجلة العبقري في الرياضيات (المتتاليات العددية)

الملخص// الشعبة: الثالثة آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

ملخص: حول المتتاليات العددية// التحضير الجيد للبكالوريا// الشعبة: 03 آوف؛ لغ أ.

عموميات

❶ دراسة اتجاه تغير متتالية (u_n):

لدراسة **اتجاه تغيّر متتالية** (u_n)؛

➢ ندرس إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$

نكون أمام ثلاث (03) حالات بعد حساب الفرق

$u_{n+1}-u_n>0$	$u_{n+1}-u_n<0$	$u_{n+1}-u_n=0$
(الفرق موجب تماما)	(الفرق سالب تماما)	(الفرق معدوم)
(u_n) متزايدة تماماً.	(u_n) متناقصة تماماً.	(u_n) ثابتة.

الاستنتاج:

المتتالية الحسابية

(u_n) متتالية حسابية.

1)طريقة إثبات أنّ المتتالية (u_n) حسابية:

يكفى أن نُثبت أنّ:

① الفرق $u_{n+1}-u_n$ **عدد ثابت**

أي: $\boxed{u_{n+1}-u_n=r}$.

② **أو** نكتب u_{n+1} بدلالة u_n

نجد: $\boxed{u_{n+1}=u_n+r}$.

حيث: r عدد حقيقي، يسمى **أساس** المتتالية **الحسابية** (u_n).

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

2)عبارة الحد العام لمتتالية حسابية:

(كتابة u_n بدلالة n)؛ u_n يسمى **الحد العام**.

في حالة u_0 هو الحد الأوّل:

② $u_n = u_0 + nr$

بصفة عامة:

① $u_n = u_p + (n-p)r$

في حالة u_1 هو الحد الأوّل:

③ $u_n = u_1 + (n-1)r$

$p = 0$ $\quad$ $p = 1$

علاقة تربط بين **حدين مختلفين**.

تُستعمل العلاقة ①، إذا كانت (u_n) **حسابية ومعرّفة بحدين مختلفين**

وباستعمال العلاقة نقوم **بحساب الأساس** نجد: $r = \frac{u_n - u_p}{n-p}$.

ملاحظة:

هذه العلاقات ①؛ ②؛ ③ يُمكن استعمالها في حالات أخرى، وذلك بتعويض u_n بأي حد مُعطى في التمرين.

3)مجموع حدود متتابعة من متتالية حسابية:

بصفة عامة:

(عدد الحدود) $\left(\frac{\text{الحد الأخير+الحد الأوّل}}{2}\right) =$ المجموع

$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2}$

حيث: 1 + دليل الحد الأوّل – دليل الحد الأخير = عدد الحدود.

4)خاصة الوسط الحسابي:

تكون الأعداد الحقيقية a، b وَ c بهذا الترتيب **حدوداً متتابعة من متتالية حسابية** إذا وفقط إذا كان

$a + c = 2b$ أو $b = \frac{a+c}{2}$.

مثال: $u_1 + u_2 + u_3 = 2u_2 + u_2 = 3u_2$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

مجلة العبقري في الرياضيات (الدّوال العددية) الملخص ـــــــــــــــ الشعبة: الثالثة آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

المتتالية الهندسية

(u_n) متتالية هندسية.

1) طريقة إثبات أنّ المتتالية (u_n) هندسية:

يكفى أن نُثبت أنّ:

① الحاصل $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ عدد ثابت

أي: $\boxed{\frac{u_{n+1}}{u_n} = q}$.

② أو نكتب u_{n+1} بدلالة u_n

نجد: $\boxed{u_{n+1} = qu_n}$.

حيث: q عدد حقيقي، يسمى أساس المتتالية الهندسية (u_n).

2) عبارة الحد العام لمتتالية هندسية:

(كتابة u_n بدلالة n)؛ u_n يسمى الحد العام.

في حالة u_0 هو الحد الأوّل:

② $\boxed{u_n = u_0 \times q^n}$

بصفة عامة:

① $\boxed{u_n = u_p \times q^{n-p}}$

في حالة u_1 هو الحد الأوّل:

③ $\boxed{u_n = u_1 \times q^{n-1}}$

$p = 0$ | $p = 1$

علاقة تربط بين حدين مختلفين.

تُستعمل العلاقة ①، إذا كانت (u_n) هندسية ومعرّفة بحدين مختلفين

وباستعمال العلاقة نقوم بحساب الأساس نجد: $\boxed{q^{n-p} = \frac{u_n}{u_p}}$.

- إذا كان $q^2 = \frac{u_n}{u_p} > 0$، فإنّ: $q = \sqrt{\frac{u_n}{u_p}}$ أو $q = -\sqrt{\frac{u_n}{u_p}}$.
- إذا كان $n - p \neq 2$، نقوم: بتحليل العدد $\frac{u_n}{u_p}$ إلى جداء عوامل أولية.

ملاحظة:

هذه العلاقات ①؛ ②؛ ③ يُمكن استعمالها في حالات أخرى، وذلك بتعويض u_n بأي حد مُعطى في التمرين.

3) مجموع حدود متتابعة من متتالية هندسية:

بصفة عامة:

$$\text{المجموع} = (\text{الحد الأوّل})\left(\frac{1-q^{\text{عدد الحدود}}}{1-q}\right)$$

أو

$$\text{المجموع} = (\text{الحد الأوّل})\left(\frac{q^{\text{عدد الحدود}}-1}{q-1}\right)$$

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$$

حيث: عدد الحدود $=$ دليل الحد الأخير $-$ دليل الحد الأوّل $+ 1$.

4) خاصة الوسط الهندسي:

تكون الأعداد الحقيقية a، b وَ c بهذا الترتيب **حدوداً متتابعة من متتالية هندسية** إذا وفقط إذا كان

$$a \times c = b^2$$

مثال: $u_1 \times u_2 \times u_3 = {u_2}^2 \times u_2 = {u_2}^3$.

اتجاه تغيّر متتالية (u_n)

➢ ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

في حالة (u_n) حسابية:

بمأنّ: $u_{n+1} - u_n = r$

فإنّ: اتجاه التغيّر، حسب إشارة أساسها r.

- $r > 0$، متزايدة تماماً.
- $r < 0$، متناقصة تماماً.
- $r = 0$، ثابتة.

في حالة (u_n) هندسية:

➢ ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$


جمع الأستاذ: بوعزة مصطفى.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

مجلة العبقري في الرياضيات (الدّوال العددية) الملخص ـــــــــــــــ الشعبة: الثالثة آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

المتتالية (u_n)

حسابية



$u_{n+1} = u_n + r$ حيث r عدد حقيقي

r يسمى **أساس** المتتالية **الحسابية** (u_n).

الطريقة 01:

نُبين أنّ **الفرق** $u_{n+1} - u_n$ **عدد ثابت** (الأساس)

الطريقة 02:

نكتب u_{n+1} بدلالة u_n **نجد:**

$u_{n+1} = u_n + r$.

إذا أُعطي u_0:

$u_n = u_0 + nr$.

إذا أُعطي u_1:

$u_n = u_1 + (n-1)r$.

من أجل عددين طبيعيين n و p.


$u_n = u_p + (n-p)r$.

علاقة تربط بين حدين مختلفين في متتالية حسابية.

بصفة عامة:

$$\text{المجموع} = (\text{عدد الحدود})\left(\frac{\text{الحد الأول} + \text{الحد الأخير}}{2}\right)$$

هندسية



$u_{n+1} = qu_n$ حيث q عدد حقيقي

q يسمى **أساس** المتتالية **الهندسية** (u_n).

الطريقة 01:

نُبين أنّ **الحاصل** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ **عدد ثابت** (الأساس)

الطريقة 02:

نكتب u_{n+1} بدلالة u_n **نجد:**

$u_{n+1} = qu_n$.

إذا أُعطي u_0:

$u_n = u_0 \times q^n$.

إذا أُعطي u_1:

$u_n = u_1 \times q^{n-1}$.

من أجل عددين طبيعيين n و p.

$u_n = u_p \times q^{n-p}$.

علاقة تربط بين حدين مختلفين في متتالية هندسية.

بصفة عامة:

$$\text{المجموع} = \text{الحد الأول}\left(\frac{1 - q^{\text{عدد الحدود}}}{1-q}\right)$$

كيف نبين أن

عبارة الحد العام للمتتالية (u_n)

كتابة u_n بدلالة n

هذه العلاقات يُمكن استعمالها وذلك بتعويض u_n **بأي** حد مُعطى

مجموع حدود متتابعة من متتالية


$$\text{عدد الحدود} = \text{دليل الحد الأخير} - \text{دليل الحد الأوّل} + 1$$

خاصية الوسط

الوسط الحسابي:

تكون a، b و c **ثلاث حدود متتابعة** من متتالية **حسابية** إذا وفقط إذا كان

$a + c = 2b$




$$\begin{cases} a = b - r \\ c = b + r \end{cases}$$

الوسط الهندسي:

تكون a، b و c **ثلاث حدود متتابعة** من متتالية **هندسية** إذا وفقط إذا كان

$a \times c = b^2$



$$\begin{cases} a = \frac{b}{q} \\ c = qb \end{cases}$$

najah213.com · نجاح 213

مجلة العبقري في الرياضيات (المتتاليات العددية في البكالوريا)

تمارين// الشعبة: الثالثة آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

تمارين البكالوريا: حول المتتاليات العددية// التحضير الجيد للبكالوريا// الشعبة: 03 آ

نجاحك بيدك

التمرين 01: (05 نقاط) بكالوريا 2008// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_n = 3n + 1$.

1/احسب u_0، u_1، u_2.

2/بيّن أنّ (u_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها. عيّن اتجاه تغيّر (u_n).

3/تحقّق أنّ العدد 2008 حدّ من حدود المتتالية (u_n). ما رتبته؟

4/احسب المجموع: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{669}$.

التمرين 02: (06 نقاط) بكالوريا 2008// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية عددية معرّفة بحدّها الأول $u_1 = 7$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

1)أحسب u_2، u_3، u_4.

2)من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، نُعرف المتتالية (v_n) كما يأتي: $v_n = u_n + 1$.

أ-أثبت أنّ (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها q وحدّها الأول v_1.

ب-اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثمّ استنتج u_n بدلالة n.

ج-نضع: $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$، احسب S_n بدلالة n.

د-عيّن n علماً أنّ $S_n = 1016$.

التمرين 03: (06 نقاط) بكالوريا 2009// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية حسابية معرّفة على $\mathbb{N}^*$ بحدّها الأول $u_1 = 2$ وبالعلاقة $u_2 - 2u_5 = 19$.

1)أ-أُحسب الأساس r للمتتالية (u_n).

ب-أُحسب الحد العاشر.

2)أُكتب عبارة u_n بدلالة n.

3)بيّن أنّ العدد (-2008) هو حداً من حدود (u_n). محدّدا رتبته.

4)أُحسب المجموع: $S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{671}$.

التمرين 04: (07 نقاط) بكالوريا 2009// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية هندسية معرّفة على $\mathbb{N}$ وأساسها **موجب**.

1-عيّن أساس هذه المتتالية وحدّها الأول u_0 **إذا علمت** أنّ: $u_3 = 144$ و $u_5 = 576$.

2-تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 18 \times 2^n$.

3-أُحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$، ثمّ استنتج قيمة العدد الطبيعي n حيث: $S_n = 1134$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

مجلة العبقري في الرياضيات (المتتاليات العددية في البكالوريا) تمارين ـــــ الشعبة: الثالثة آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

التمرين 05: (05 نقاط) بكالوريا 2010// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

I) (u_n) متتالية حسابية معرّفة على $\mathbb{N}$ بالحدين: $u_{10}=31$ و $u_{15}=46$.

1-عيّن أساسها وحدّها الأول u_0.

2-أكتب u_n بدلالة n.

3-بيّن أنّ 6028 حدّ من حدود المتتالية (u_n).

4-أحسب المجموع S: $S=u_0+u_1+\cdots+u_{2009}$.

II) نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=2\times 8^n$.

1-بيّن أنّ (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول v_0.

2-أحسب بدلالة n المجموع S': $S'=v_0+v_1+\cdots+v_n$.

التمرين 06: (07 نقاط) بكالوريا 2010// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية هندسية معرّفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$، أساسها q وحدّها الأوّل u_0 حيث:

$u_1=6$ و $u_4=48$.

1.أ-أحسب الأساس والحدّ الأوّل للمتتالية (u_n).

ب-استنتج أنّ عبارة الحدّ العام للمتتالية (u_n) هي: $u_n=3\times 2^n$.

2.أ-علماً أنّ $2^8=256$؛ بيّن أنّ العدد 768 هو حدّ من حدود المتتالية (u_n).

ب-أحسب المجموع S حيث: $S=u_0+u_1+\cdots+u_7$.

3.(v_n) متتالية عددية معرّفة بـ: $v_0=4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1}=2v_n-1$.

أ-أحسب: v_1، v_2، v_3.

ب-برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=3\times 2^n+1$.

جـ-أحسب المجموع S' حيث: $S'=v_0+v_1+\cdots+v_7$.

التمرين 07: (06 نقاط) بكالوريا 2011// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

أ) (u_n) متتالية هندسية أساسها 3 وحدّها الأول u_0 بحيث: $u_0+u_3=28$.

1.احسب u_0، ثمّ اكتب الحد العام u_n بدلالة n.

2.احسب المجموع: $S_1=u_0+u_1+\cdots+u_9$.

ب) (v_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها العام: $v_n=1-5n$.

1.بيّن أنّ (v_n) متتالية حسابية يُطلب تعيين أساسها ثمّ استنتج اتجاه تغيّرها.

2.احسب المجموع: $S_2=v_0+v_1+\cdots+v_9$.

ج) نعتبر المتتالية (k_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها العام: $k_n=1+3^n-5n$.

-تحقّق أنّ: $k_n=u_n+v_n$ ثمّ احسب المجموع: $S=k_0+k_1+\cdots+k_9$.

التمرين 08: (06 نقاط) بكالوريا 2011// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرّفتان على $\mathbb{N}$ بحدّيهما العام: $u_n=-2n$ و $v_n=3^{-2n}$.

عيّن في كلّ حالة من الحالات الخمس في الجدول أدناه الاقتراح الصحيح من بين الاقتراحات الثلاث مع التعليل.

		اقتراح 1	اقتراح 2	اقتراح 3
1	(u_n) هي متتالية	هندسية	حسابية	لا حسابية ولا هندسية
2	الحد الخامس والأربعون للمتتالية (u_n) يساوي	-90	-92	-88
3	المجموع $u_0+u_1+\cdots+u_n$ يساوي	n^2+1	$-n^2-n$	$-n^2-1$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

4	(v_n) متتالية هندسية أساسها	$\frac{1}{9}$	9	-9
5	المتتالية (v_n)	متزايدة	متناقصة	ليست رتيبة

التمرين 09: (06 نقاط) بكالوريا 2012// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

a، b، c ثلاثة حدود متتابعة لمتتالية حسابية متزايدة أساسها r حيث: $a+b+c=9$.

1.أ) احسب b ثم اكتب a و c بدلالة r.

ب) علماً أنّ: $a\times c=-16$

-عيّن الأساس r ثم استنتج a و c.

2. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0=-2$ وأساسها 5.

أ) عبّر عن الحدّ العام u_n بدلالة n.

ب) احسب u_{15} ثم استنتج المجموع: $S=u_0+u_1+\cdots+u_{15}$.

3. (v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بالعلاقة: $8v_n-u_n=0$

-احسب المجموع: $S'=v_0+v_1+\cdots+v_{15}$.

التمرين 10: (06 نقاط) بكالوريا 2012// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية حسابية متزايدة، أساسها r، حدّها الأول u_1 و $u_3=7$.

1.أ) احسب بدلالة r الجدائين: $T_1=u_1\times u_5$ و $T_2=u_2\times u_4$.

ب) عيّن الأساس r بحيث: $T_2-T_1=27$.

2.نضع $r=3$.

أ) اكتب عبارة الحدّ العام u_n بدلالة n.

ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$.

بيّن أنّ: $S_n=\frac{3n^2-n}{2}$.

ج) جِد العدد الطبيعي n بحيث: $S_n=145$.

3.أ) اكتب الحدّ u_{n+5} بدلالة n.

ب) تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $\frac{u_{n+5}}{n}=3+\frac{13}{n}$.

ج) استنتج الأعداد الطبيعية n التي يكون من أجلها العدد $\frac{u_{n+5}}{n}$ طبيعيا.

التمرين 11: (06 نقاط) بكالوريا 2013// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(v_n) متتالية هندسية حدّها الأول $v_0=2$ وأساسها 3.

1-أ) عبّر عن v_n بدلالة n.

ب) احسب بدلالة n الفرق $v_{n+1}-v_n$، ثمّ استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (v_n).

2-نضع، من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_{n-1}$.

أ) احسب بدلالة n المجموع S_n.

ب) عيّن قيمة العدد الطبيعي n بحيث: $S_n=80$.

ج) أثبت بالتراجع أنّه، من أجل كل عدد طبيعي n، العدد 3^n-1 يقبل القسمة على 2.

التمرين 12: (06 نقاط) بكالوريا 2013// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية حسابية حدّها الأول u_0 وأساسها 5 بحيث: $u_0+u_1+u_2+u_3=34$.

1- احسب u_0.
2- بيّن أنّه، من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 5n + 1$.
3- عيّن العدد الطبيعي n بحيث: $u_{n+1} + u_n - 8n = 4033$.
4- أُحسب المجموع: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{2013}$.
5- المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بالعبارة: $v_n = 2u_n + 1$.
أ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (v_n).
ب) أحسب المجموع: $S' = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_{2013}$.

التمرين 13: (06 نقاط) بكالوريا 2014// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

عيّن الاقتراح الصّحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة، في كلّ حالة من الحالات الأربعة الآتية، مع التّعليل:

1) (u_n) متتالية حسابية أساسها 3 وحدّها $u_2 = 1$.
الحد العام للمتتالية (u_n) هو:
أ) $u_n = 1 + 3n$ ب) $u_n = 7 + 3n$ جـ) $u_n = -5 + 3n$.

2) n عدد طبيعي. المجموع $1 + 2 + 3 + \cdots + n$ يساوي:
أ) $\frac{n^2+n}{2}$ ب) $\frac{n(n-1)}{2}$ جـ) $\frac{n^2+1}{2}$.

3) x عدد حقيقي. تكون الأعداد $x - 2$، x، $x + 1$ بهذا الترتيب حدودا متعاقبة لمتتالية هندسية إذا كان:
أ) $x = 3$ ب) $x = 5$ جـ) $x = -2$.

4) (v_n) متتالية هندسية معرّفة على $\mathbb{N}$، حدّها العام $v_n = 2 \times 3^{n+1}$. أساس المتتالية (v_n) هو:
أ) 2 ب) 3 جـ) 6.

التمرين 14: (06 نقاط) بكالوريا 2014// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(v_n) المتتالية العددية المعرّفة بما يلي: $v_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n؛ $v_{n+1} = 5v_n + 4$.
1) احسب: v_1، v_2 و v_3.
2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n؛ $u_n = v_n + 1$
أ- بيّن أنّ (u_n) متتالية هندسية أساسها $q = 5$ وحدّها الأول $u_0 = 2$.
ب- اكتب u_n بدلالة n واستنتج v_n بدلالة n.
جـ- حلّل العدد 1250 إلى جداء عوامل أوليّة واستنتج أنّه حد من حدود المتتالية (u_n).
3) أ- احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}$.
ب- احسب بدلالة n المجموع S_n' حيث: $S_n' = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$.

التمرين 15: (07 نقاط) بكالوريا 2015// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) المتتالية الهندسية التي حدّها الأوّل u_0 وأساسها q حيث: $u_0 = 2$ و $q = 3$.
1) احسب u_1 و u_2.
2) اكتب u_n بدلالة n؛ ثمّ استنتج u_5.
3) عيّن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).
4) أ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{n-1}$.
ب) استنتج قيمة المجموع: $2 + 6 + 18 + \cdots + 486$.
5) أ) عيّن باقي القسمة الإقليدية على 5 لكل عدد من الأعداد 3، 3^2، 3^3 و 3^4.
ب) استنتج أنّه لكل k من $\mathbb{N}$؛ $3^{4k} \equiv 1[5]$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

6)عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $3^n - 1$ قابلا للقسمة على 5.

التمرين 16: (06 نقاط) بكالوريا 2015// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية حسابية حدّها الأوّل u_1 وأساسها r حيث: $u_2 = \frac{1}{2}$ و $u_1 - u_3 = 5$.

1)أ) بيّن أنّ: $u_1 + u_3 = 1$.

ب) عيّن الحدّ الأوّل u_1؛ ثمّ استنتج أنّ $r = -\frac{5}{2}$.

2)اكتب u_n بدلالة n.

3)أ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

ب) عيّن قيمة العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $S_n = -\frac{657}{2}$.

4)n عدد طبيعي غير معدوم، نضع: $T_n = u_1 + 2u_2 + 3u_3 + \cdots + nu_n$.

أ) تحقّق أنه لكل n من $\mathbb{N}^*$: $(n+2)(9-5n) = -5n^2 - n + 18$.

ب) باستعمال الاستدلال بالتراجع، أثبت أنّه لكل n من $\mathbb{N}^*$: $T_n = \frac{1}{6}n(n+1)(14-5n)$.

التمرين 17: (07 نقاط) بكالوريا 2016// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لتكن (u_n) متتالية عددية معرّفة من أجلّ عدد طبيعي n بـ: $u_n = 3n - 2$.

1)احسب u_0، u_1، u_2 و u_3.

2)بيّن أنّ المتتالية (u_n) حسابية وعيّن أساسها.

3)ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

4)بيّن أنّ العدد 1954 حدّ من حدود المتتالية (u_n) وعيّن رتبته.

5)أ) احسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

ب) عيّن العدد n بحيث يكون: $S_n = 328$.

التمرين 18: (06 نقاط) بكالوريا 2016// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

نعتبر المتتالية الحسابية (u_n) التي أساسها 3 وحدّها الأول u_0 وتُحقّق: $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 10$.

1)احسب الحد الأوّل u_0.

2)اكتب الحد العام u_n بدلالة n.

3)عيّن العدد الطبيعي n بحيث: $u_n = 145$.

4)احسب المجموع S بحيث: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{49}$.

5)نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بالعبارة: $v_n = 2u_n + 3$.

احسب المجموع S' بحيث: $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_{49}$.

التمرين 19: (06 نقاط) بكالوريا 2017_د01// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) المتتالية هندسية حدودها موجبة تماما، معرّفة على $\mathbb{N}$ حيث $u_1 = 20$ و $u_3 = 320$.

1)بيّن أنّ أساس المتتالية (u_n) هو 4 وحدّها الأول هو 5.

2)اكتب عبارة الحد العام للمتتالية (u_n) بدلالة n ثمّ استنتج قيمة حدّها السابع.

3)أ) احسب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S حيث $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

ب) استنتج قيمة المجموع S' حيث $S' = u_0 + u_1 + \cdots + u_6$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

مجلة العبقري في الرياضيات (المتتاليات العددية في البكالوريا) تمارين ـــــ الشعبة: الثالثة آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

التمرين 20: (06 نقاط) بكالوريا 2017_د01// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية حسابية معرّفة على المجموعة $\mathbb{N}$ بحدّها الأوّل $u_0 = -5$ و$u_3 + u_7 = 50$.

1)عيّن الأساس r للمتتالية (u_n).

2)بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 6n - 5$.

3)اثبت أنّ العدد 2017 حد من حدود المتتالية (u_n)، ما هي رتبته؟

4)احسب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S حيث $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

التمرين 21: (06 نقاط) بكالوريا 2017_د02// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

نعتبر المتتالية الحسابية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول u_0 وأساسها r.

1)احسب الحد u_4 علما أنّ: $u_3 + u_5 = 20$.

2)احسب الحد u_5 علما أنّ: $2u_4 - u_5 = 7$.

3)استنتج قيمة r واحسب u_0.

4)تحقّق أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 3n - 2$.

5)احسب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S_n: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

6)جِد العدد الطبيعي n حيث: $S_n = 33$.

التمرين 22: (06 نقاط) بكالوريا 2017_د02// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

في كل حالة من الحالات الأربع الآتية أُقتُرحت ثلاث إجابات، واحدة فقط منها صحيحة، يُطلب تحديدها مع التعليل.

1)الحد السّادس لمتتالية حسابية أساسها -3 وحدّها الأول 1 هو:

أ) -17 ب) -14 جـ) -11.

2)مجموع 100 حدٍ الأولى لمتتالية هندسية حدّها الأول هو 1 وأساسها 3 هو:

أ) $\frac{3^{101}-1}{2}$ ب) $\frac{1-3^{100}}{2}$ جـ) $\frac{3^{100}-1}{2}$.

3)نضع من أجل كل عدد حقيقي x: $a = 2x + 2$، $b = 6x - 3$، $c = 4x$.

الأعداد الحقيقية a، b، c بهذا الترتيب تُشكل حدودا متتابعة لمتتالية حسابية عندما يكون:

أ) $x = \frac{4}{3}$ ب) $x = 0$ جـ) $x = \frac{3}{4}$.

4)المتتالية العددية (u_n) المعرّفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ هي متتالية:

أ) حسابية أساسها 1 ب) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ جـ) لا حسابية ولا هندسية.

التمرين 23: (06 نقاط) بكالوريا 2018// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات التالية، مع التبرير:

1)(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = n^2 - 1$

المتتالية (u_n): أ) متزايدة تماما ب) متناقصة تماما جـ) ليست رتيبة.

2)(v_n) متتالية هندسية حدّها الأوّل $v_1 = 3$ وأساسها $q = 2$

عبارة الحد العام للمتتالية (v_n) هي:

أ) $v_n = 3 \times 2^n$ ب) $v_n = 3 \times 2^{n-1}$ جـ) $v_n = 2 \times 3^n$.

المجموع $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$ يُساوي:

أ) $3(2^n - 1)$ ب) $(2^n - 1)$ جـ) $2(3^n - 1)$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

3) الاحتمالات.

التمرين 24: (06 نقاط) بكالوريا 2018// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية هندسية حدودها موجبة تماما، حدّها الأول u_0 وأساسها q حيث:

$u_0 \times u_2 = 576$ و $u_0 + u_1 = 30$.

1)بيّن أنّ $u_1 = 24$، ثمّ استنتج قيمة u_0.

2)بيّن أنّ $q = 4$، ثمّ اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

3)أثبت أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = 18 \times 4^n$، ثمّ استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

4)احسب 4^4، ثم تحقّق أنّ العدد 1536 حد من حدود المتتالية (u_n) وعيّن رتبته.

5)احسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

التمرين 25: (06 نقاط) بكالوريا 2019// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}^*$ بـ: $u_n = \frac{2}{5}n - 1$.

1)بيّن أنّ المتتالية (u_n) حسابية أساسها $\frac{2}{5}$ يُطلب حساب حدّها الأول u_1.

2)عيّن رتبة الحد الذي قيمته 575.

3)احسب قيمة المجموع S حيث: $S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{1440}$.

4)(v_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}^*$ كما يلي: $v_n = 4^{5u_n+6}$.

أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول v_1.

ب) احسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$.

التمرين 26: (04 نقاط) بكالوريا 2019// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) المتتالية الحسابية التي حدّها الأول u_0 وأساسها r.

1)علماً أنّ: $u_0 + u_1 + u_2 = 6$، عيّن u_1.

2)علماً أنّ: $2u_0 - 3u_1 = -10$، عيّن الحد الأول u_0، ثم استنتج قيمة r أساس المتتالية (u_n).

3)اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

4)أ) عيّن قيمة n حتى يكون $u_n = 2018$.

ب) أحسب الحد الخامس عشر للمتتالية (u_n).

5)أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

6)عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون: $S_n = 96$.

التمرين 27: (06 نقاط) بكالوريا 2020// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لتكن (u_n) متتالية حسابية حدّها الأوّل u_0 وأساسها r حيث: $u_2 - u_0 = 4$ وَ $u_1 + u_3 = 16$.

1)احسب الحدّ u_2، ثمّ الحدّ u_0 واستنتج الأساس r للمتتالية (u_n).

2)أ. بيّن أنّ الحدّ العام للمتتالية (u_n) معرّف بـ: $u_n = 4 + 2n$.

ب. حدّد مع التّبرير اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3)بيّن أنّ العدد 2020 حدّ من حدود المتتالية (u_n)، محدّداً رُتبته.

4)احسب المجموع S المعرّف بـ: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{1008}$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

التمرين 28: (06 نقاط) بكالوريا 2020// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لتكن (u_n) متتالية هندسية حدّها الأوّل u_1، حدودها موجبة تماما حيث: $u_3 \times u_5 = 2916$.

1)احسب الحد u_4.

2)علما أنّ $u_3 = 18$، تحقّق أنّ أساس المتتالية (u_n) هو 3.

3)احسب الحدّ الأوّل u_1، ثمّ اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

4)عيّن رتبة الحدّ الذي قيمته 1458. (لاحظ أنّ: $729 = 3^6$)

5)احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

الحمد لله.

جمع الأستاذ بوعزة مصطفى.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

مجلة العبقري في الرياضيات (المتتاليات العددية في البكالوريا)

حلول// الشعبة: الثالثة آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

حلول تمارين البكالوريا: حول المتتاليات العددية// التحضير الجيد للبكالوريا// الشعبة: 03 آ

نجاحك بيدك

حل التمرين 01: (05 نقاط) بكالوريا 2008// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_n = 3n + 1$.

1/حساب u_0، u_1، u_2:

- $u_0 = 3(0) + 1 = 0 + 1 = 1$؛
- $u_1 = 3(1) + 1 = 3 + 1 = 4$؛
- $u_2 = 3(2) + 1 = 6 + 1 = 7$.

2/تبيان أنّ (u_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها: (نُبين أن الفرق $u_{n+1} - u_n$ عدد ثابت)

لدينا: $u_n = 3n + 1$ ومنه: $u_{n+1} = 3(n+1) + 1 = 3n + 3 + 1 = 3n + 4$

وعليه الفرق يكون كالتالي: $u_{n+1} - u_n = (3n + 4) - (3n + 1) = 3n + 4 - 3n - 1 = 3$

إذن: (u_n) **حسابية أساسها 3.**

تعيين اتجاه تغيّر (u_n):

بمأنّ: (u_n) **حسابية أساسها موجب تماما** $(0 < 3)$، فإنّها: **متزايدة تماما** على $\mathbb{N}$.

3/التحقّق أنّ العدد 2008 حدّ من حدود المتتالية (u_n):

نضع: $\boxed{u_n = 2008}$ نجد: $3n + 1 = 2008$

ومنه: $3n = 2008 - 1$ أي: $n = \frac{2007}{3} = 669 \in \mathbb{N}$ $(u_{669} = 2008)$

إذن: 2008 حد من حدود المتتالية (u_n)، **رتبته:** $669 + 1 = 670$ لأنّ الحد الأوّل هو u_0.

4/حساب المجموع، $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{669}$:

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{669} = (669 - 0 + 1)\left(\frac{u_0 + u_{669}}{2}\right) = 670\left(\frac{1+2008}{2}\right)$

ومنه: $S = 670\left(\frac{2009}{2}\right) = 670(1004{,}5) = 673015$.

حل التمرين 02: (06 نقاط) بكالوريا 2008// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية معرّفة بـ: $\begin{cases} u_1 = 7 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$.

1)حساب u_2، u_3 وu_4:

- $u_2 = 2u_1 + 1 = 2(7) + 1 = 15$.
- $u_3 = 2u_2 + 1 = 2(15) + 1 = 31$.
- $u_4 = 2u_3 + 1 = 2(31) + 1 = 63$.

2)(v_n) متتالية معرّفة كما يأتي: $v_n = u_n + 1$.

لـاثبات أنّ (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها q وحدها الأول v_1:

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

ط01) نُبين أنّ الحاصل $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ عدد ثابت.

لدينا: $v_n = u_n + 1$ ومنه: $v_{n+1} = u_{n+1} + 1 = (2u_n + 1) + 1 = 2u_n + 2 = 2(u_n + 1)$

وعليه: $\boxed{\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2(u_n+1)}{u_n+1} = 2}$.

إذن: (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = 2$ وحدّها الأول $v_1 = u_1 + 1 = 7 + 1 = 8$.

بـكتابة عبارة الحد العام v_n بدلالة n:

بمأنّ: (v_n) متتالية هندسية أساسها 2 وحدّها الأول $v_1 = 8$، فإنّ: $v_n = v_1 \times q^{n-1}$

بالتعويض نجد: $\boxed{v_n = 8 \times 2^{n-1}}$.

استنتاج u_n بدلالة n:

لدينا: $v_n = u_n + 1$ ومنه: $\boxed{u_n = v_n - 1 = 8 \times 2^{n-1} - 1}$.

جـ- $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$، حساب S_n بدلالة n:

لدينا: $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n = v_1\left(\frac{1-q^{n-1+1}}{1-q}\right) = 8\left(\frac{1-2^n}{1-2}\right) = \frac{8}{-1}(1 - 2^n)$

إذن: $\boxed{S_n = 8(2^n - 1)}$.

حـتعيين n علماً أنّ $S_n = 1016$:

$S_n = 1016$ معناه: $8(2^n - 1) = 1016$

ومنه: $2^n - 1 = \frac{1016}{8}$

أي: $2^n - 1 = 127$

وعليه: $2^n = 128 = 2^7$ (لأنّ $128 = 2^7$)

إذن: $\boxed{n = 7}$ $(S_7 = 1016)$.

حل التمرين 03: (06 نقاط) بكالوريا 2009// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **حسابية** معرّفة على $\mathbb{N}^*$ **بحدّها الأول** $u_1 = 2$ **وبالعلاقة** $u_2 - 2u_5 = 19$.

1)أحسب الأساس r للمتتالية (u_n): (نكتب كل من u_2 وu_5 بدلالة الحد الأول u_1 المُعطى)

حسب العلاقة $\boxed{u_n = u_1 + (n-1)r}$، نجد: $\begin{cases} u_2 = u_1 + (2-1)r = 2 + r \\ u_5 = u_1 + (5-1)r = 2 + 4r \end{cases}$

العلاقة $u_2 - 2u_5 = 19$ تُصبح: $(2 + r) - 2(2 + 4r) = 19$

ومنه: $2 + r - 4 - 8r = 19$

وعليه: $-7r = 21$ إذن: $\boxed{r = \frac{21}{-7} = -3}$.

بـحساب الحد العاشر:

بمأنّ الحد الأوّل هو u_1، إذن الحد **العاشر** هو

$u_{10} = u_1 + (10-1)r = u_1 + 9r = 2 + 9(-3) = 2 - 27 = -25$

2)كتابة عبارة u_n بدلالة n:

لدينا: $\boxed{u_n = u_1 + (n-1)r}$ ومنه: $u_n = 2 + (n-1)(-3)$ إذن: $\boxed{u_n = -3n + 5}$.

3)تبيان أنّ العدد (-2008) هو حداً من حدود (u_n):

نضع: $\boxed{u_n = -2008}$ نجد: $-3n + 5 = -2008$

ومنه: $-3n = -2008 - 5$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

أي: $(u_{671} = -2008)\ n = \frac{-2013}{-3} = 671 \in \mathbb{N}$

إذن: (-2008) حد من حدود المتتالية (u_n)، **رتبته:** 671 لأنّ الحد الأوّل هو u_1.

4)حساب المجموع، $S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{671}$:

لدينا: $S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{671} = (671 - 1 + 1)\left(\frac{u_1 + u_{671}}{2}\right) = 671\left(\frac{2+(-2008)}{2}\right)$

ومنه: $S = 671\left(\frac{-2006}{2}\right) = 671(-1003) = -673013$.

حل التمرين 04: (07 نقاط) بكالوريا 2009// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **هندسية** معرفة على $\mathbb{N}$ و**أساسها موجب** $(q > 0)$

1ـ تعيين أساس المتتالية (u_n) **وحدّها الأول** u_0 **علماً أنّ،** $u_3 = 144$ **و** $u_5 = 576$:

لـدينا: $u_n = u_p \times q^{n-p}$ ومنه: $u_5 = u_3 \times q^{5-3}$

وعليه: $576 = 144 \times q^2$

ومنه: $q^2 = \frac{576}{144} = 4$

أي: $q = \sqrt{4} = 2 > 0$ **(مقبول) أو** $q = -\sqrt{4} = -2$ **(مرفوض)**

إذن: $\boxed{q = 2}$.

تعيين الحد الأول u_0:

لدينا: $u_n = u_0 \times q^n$ ومنه: $u_3 = u_0 \times q^3$ إذن: $\boxed{u_0 = \frac{u_3}{q^3} = \frac{144}{2^3} = \frac{144}{8} = 18}$.

أو: $u_5 = u_0 \times q^5$ نجد: $\boxed{u_0 = \frac{u_5}{q^5} = \frac{576}{2^5} = \frac{576}{32} = 18}$.

2ـ التحقق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 18 \times 2^n$:

لدينا: $u_n = u_0 \times q^n$ ومنه: $\boxed{u_n = 18 \times 2^n}$.

3ـ حساب بدلالة n **المجموع،** $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$:

لدينا: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0\left(\frac{1-q^{n-0+1}}{1-q}\right) = 18\left(\frac{1-2^{n+1}}{1-2}\right) = \frac{18}{-1}(1 - 2^{n+1})$

ومنه: $S_n = -18(1 - 2^{n+1}) = 18(2^{n+1} - 1)$.

استنتاج قيمة العدد الطبيعي n **حيث،** $S_n = 1134$:

$S_n = 1134$ معناه: $18(2^{n+1} - 1) = 1134$

ومنه: $2^{n+1} - 1 = \frac{1134}{18}$

أي: $2^{n+1} - 1 = 63$

ومنه: $2^{n+1} = 64 = 2^6$

وعليه: $n + 1 = 6$، إذن: $\boxed{n = 5}$ ($S_5 = 1134$).

حل التمرين 05: (05 نقاط) بكالوريا 2010// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

I)لدينا: (u_n) متتالية **حسابية** معرّفة على $\mathbb{N}$ بالحدين: $u_{10} = 31$ وَ $u_{15} = 46$.

1ـ تعيين أساس المتتالية (u_n):

لدينا: $\boxed{u_n = u_p + (n-p)r}$، ومنه: $u_{15} = u_{10} + (15 - 10)r$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

وعليه: $46 = 31 + 5r$ وبالتالي: $5r = 46 - 31$ إذن: $\boxed{r = \frac{15}{5} = 3}$.

الطريقة 02: $r = \frac{u_n - u_p}{n-p} = \frac{u_{15} - u_{10}}{15-10} = \frac{46-31}{5} = \frac{15}{5} = 3$.

تعيين الحدّ الأول u_0:

لدينا: $\boxed{u_n = u_0 + nr}$ ومنه: $u_{10} = u_0 + 10r$

وعليه: $u_0 = u_{10} - 10r = 31 - 10(3) = 31 - 30 = 1$

أو $\boxed{u_n = u_0 + nr}$ ومنه: $u_{15} = u_0 + 15r$

وعليه: $u_0 = u_{15} - 15r = 46 - 15(3) = 46 - 45 = 1$

2ـ كتابة u_n بدلالة n: (عبارة الحد العام)

لدينا: $u_n = u_0 + nr$، إذن: $\boxed{u_n = 1 + 3n}$.

3ـ تبيان أنّ 6028 حدّ من حدود المتتالية (u_n):

نضع: $u_n = 6028$ نجد: $6028 = 1 + 3n$

ومنه: $6027 = 3n$ وبالتالي: $n = \frac{6027}{3} = 2009 \in \mathbb{N}$ $(u_{2009} = 6028)$

إذن: العدد 6028 حد من حدود المتتالية (u_n).

4ـ حساب المجموع S، $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{2009}$:

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{2009} = (2009 - 0 + 1)\left(\frac{u_0 + u_{2009}}{2}\right) = (2010)\left(\frac{1+6028}{2}\right)$

ومنه: $S = (2010)\left(\frac{6029}{2}\right) = (2010)(3014{,}5) = 6059145$.

II) لدينا: (v_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 2 \times 8^n$.

1ـ تبيان أنّ (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول v_0:

نُبين أنّ حاصل القسمة $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ عدد ثابت:

لدينا: $v_n = 2 \times 8^n$ ومنه: $v_{n+1} = 2 \times 8^{n+1}$ وبالتالي: $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2 \times 8^{n+1}}{2 \times 8^n} = \frac{8^{n+1}}{8^n} = \frac{8^n \times 8^1}{8^n} = 8$

إذن: (v_n) هندسية، أساسها $\boxed{q = 8}$ وحدّها الأوّل $v_0 = 2 \times 8^0 = 2 \times 1 = 2$.

2ـ حساب بدلالة n المجموع S'، $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$:

لدينا: $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0\left(\frac{1-q^{n-0+1}}{1-q}\right) = 2\left(\frac{1-8^{n+1}}{1-8}\right) = \frac{2}{-7}(1 - 8^{n+1})$

ومنه: $S' = \frac{2}{7}(8^{n+1} - 1)$.

حل التمرين 06: (07 نقاط) بكالوريا 2010// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **هندسية** معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$، **أساسها q وحدّها الأول u_0** حيث:

$u_1 = 6$ و $u_4 = 48$.

1. أحساب الأساس والحدّ الأوّل للمتتالية (u_n):

نعلم أنّ $u_n = u_p \times q^{n-p}$ ومنه: $u_4 = u_1 \times q^{4-1}$

ويكون: $48 = 6 \times q^3$

وعليه: $q^3 = \frac{48}{6} = 8$ (وبمأنّ $8 = 2^3$ فإنّ $q^3 = 2^3$) إذن: $\boxed{q = 2}$.

حساب الحد الأوّل u_0:

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

لدينا: $u_n = u_0 \times q^n$ ومنه: $u_1 = u_0 \times q^1$ ويكون: $\boxed{u_0 = \frac{u_1}{q^1} = \frac{6}{2} = 3}$.

أو: $u_n = u_0 \times q^n$ ومنه: $u_4 = u_0 \times q^4$ ويكون: $\boxed{u_0 = \frac{u_4}{q^4} = \frac{48}{16} = 3}$.

ب- استنتاج أنّ عبارة الحدّ العام لـ (u_n) هي، $u_n = 3 \times 2^n$:

لدينا: $u_n = u_0 \times q^n$، إذن: $\boxed{u_n = 3 \times 2^n}$.

2. لعلماً أنّ $2^8 = 256$؛ تبيّن أنّ العدد 768 هو حدّ من حدود المتتالية (u_n):

نضع: $u_n = 768$ نجد: $3 \times 2^n = 768$

ومنه: $2^n = \frac{768}{3} = 256$

وعليه: $2^n = 2^8$ (لأنّ $2^8 = 256$)

وبالتالي: $\boxed{n = 8 \in \mathbb{N}}$ ($u_8 = 768$)، إذن: 768 حدّ من حدود المتتالية (u_n).

ب- حساب المجموع S حيث، $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_7$:

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_7 = u_0\left(\frac{1-q^{7-0+1}}{1-q}\right) = 3\left(\frac{1-2^8}{1-2}\right) = \frac{3}{-1}(1-256)$

ومنه: $S = -3(-255) = 765$.

3. لدينا: (v_n) متتالية معرفة بـ: $\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = 2v_n - 1 \end{cases}$.

أ- حساب v_1، v_2 و v_3:

- $v_1 = 2v_0 - 1 = 2(4) - 1 = 7$.
- $v_2 = 2v_1 - 1 = 2(7) - 1 = 13$.
- $v_3 = 2v_2 - 1 = 2(13) - 1 = 25$.

ب- البرهان بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $v_n = 3 \times 2^n + 1$:

نسمي هذه الخاصية بـ $P(n)$.

المرحلة 01: (من أجل $n = 0$)، لدينا: $v_0 = 3 \times 2^0 + 1 = 3(1) + 1 = 4$ إذن: $P(0)$ صحيحة.

المرحلة 02:

- **نفرض** صحة الخاصية $P(n)$ أي: $\boxed{v_n = 3 \times 2^n + 1}$ **(فرضية التراجع)**
- **ونبرهن** صحة الخاصية $P(n+1)$ أي: $\boxed{v_{n+1} = 3 \times 2^{n+1} + 1}$

البرهان: لدينا:

$$v_{n+1} = 2v_n - 1 = 2(3 \times 2^n + 1) - 1 = 2^1 \times 3 \times 2^n + 2 - 1 = 3 \times 2^{n+1} + 1$$

إذن: $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: حسب **مبدأ الاستدلال بالتراجع** من أجل كل عدد طبيعي n، $\boxed{v_n = 3 \times 2^n + 1}$.

جـ- حساب المجموع S' حيث، $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_7$:

نلاحظ أنّ $\boxed{v_n = 3 \times 2^n + 1 = u_n + 1}$

ومنه: $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_7 = (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \cdots + (u_7 + 1)$

وعليه: $S' = (u_0 + u_1 + \cdots + u_7) + 8 = S + 8 = 765 + 8 = 773$.

حل التمرين 07: (06 نقاط) بكالوريا 2011// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

أ) لدينا: (u_n) متتالية **هندسية** أساسها 3 وحدّها الأول u_0 بحيث، $u_0 + u_3 = 28$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

1. حساب u_0:

لدينا: $u_n = u_0 \times q^n$ ومنه: $u_3 = u_0 \times q^3 = u_0 \times 3^3 = 27u_0$

العلاقة $u_0 + u_3 = 28$ تُصبح $u_0 + 27u_0 = 28$ ومنه: $28u_0 = 28$ إذن: $\boxed{u_0 = 1}$.

كتابة الحد العام u_n بدلالة n:

لدينا: $u_n = u_0 \times q^n$، إذن: $\boxed{u_n = 3^n}$.

2. حساب المجموع، $S_1 = u_0 + u_1 + \cdots + u_9$:

لدينا: $S_1 = u_0 + u_1 + \cdots + u_9 = u_0\left(\frac{1-q^{9-0+1}}{1-q}\right) = 1\left(\frac{1-3^{10}}{1-3}\right) = 1\left(\frac{1-3^{10}}{-2}\right)$

ومنه: $S_1 = \frac{1}{-2}(1-3^{10}) = \frac{1}{2}(3^{10}-1) = \frac{1}{2}(59048) = 29524$.

ب) لدينا: (v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بحدّها العام، $v_n = 1 - 5n$.

1. تبيّان أنّ (v_n) متتالية حسابية يُطلب تعيين أساسها: (نُبين أنّ الفرق $v_{n+1} - v_n$ عدد ثابت)

لدينا: $v_n = 1 - 5n$ ومنه: $v_{n+1} = 1 - 5(n+1) = 1 - 5n - 5 = -4 - 5n$

وعليه: $v_{n+1} - v_n = (-4 - 5n) - (1 - 5n) = -4 - 5n - 1 + 5n = -5$

أي: $\boxed{v_{n+1} = v_n - 5}$

إذن: (v_n) متتالية **حسابية** أساسها $\boxed{r = -5}$.

استنتاج اتجاه تغيّرها:

بمأنّ (v_n) **حسابية** أساسها $(r = -5 < 0)$ **سالب تماما** فإنّها **متناقصة تماما** على $\mathbb{N}$.

2. حساب المجموع، $S_2 = v_0 + v_1 + \cdots + v_9$:

لدينا: $S_2 = v_0 + v_1 + \cdots + v_9 = (9 - 0 + 1)\left(\frac{v_0 + v_9}{2}\right) = 10\left(\frac{1-44}{2}\right) = \frac{10}{2}(1 - 44)$

ومنه: $S_2 = 5(-43) = -215$.

(**ملاحظة:** $v_9 = 1 - 5(9) = 1 - 45 = -44$)

ج) لدينا: المتتالية (k_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها العام، $k_n = 1 + 3^n - 5n$.

ـ التحقّق أنّ، $k_n = u_n + v_n$:

لدينا: $\begin{cases} u_n = 3^n \\ v_n = 1 - 5n \end{cases}$، ومنه: $k_n = 1 + 3^n - 5n = 3^n + (1 - 5n) = u_n + v_n$

حساب المجموع، $S = k_0 + k_1 + \cdots + k_9$:

لدينا: $k_n = u_n + v_n$

ومنه: $S = k_0 + k_1 + \cdots + k_9 = (u_0 + v_0) + (u_1 + v_1) + \cdots + (u_9 + v_9)$

وعليه: $S = (u_0 + u_1 + \cdots + u_9) + (v_0 + v_1 + \cdots + v_9) = S_1 + S_2$

إذن: $S = 29524 - 215 = 29309$.

حل التمرين 08: (06 نقاط) بكالوريا 2011// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) و(v_n) متتاليتان عدديتان معرّفتان على $\mathbb{N}$ بحدّيهما العام، $u_n = -2n$ وَ $v_n = 3^{-2n}$.

(**نلاحظ أنّ** $v_n = 3^{u_n}$)

تعيين الإقتراح الصحيح مع التعليل:

1) لدينا: $u_n = -2n$ ومنه: $u_{n+1} = -2(n+1) = -2n - 2$

وعليه: $u_{n+1} - u_n = (-2n - 2) - (-2n) = -2n - 2 + 2n = -2$

إذن: (u_n) هي متتالية **حسابية**.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

2) بمأنّ (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}$، فحدّها **الأول** هو u_0، وبالتالي: حدها الخامس والأربعون هو:

$$\boxed{u_{44} = -2(44) = -88}.$$

3) حسب السؤال **1)** لدينا: (u_n) متتالية **حسابية**،

إذن: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n - 0 + 1)\left(\frac{u_0 + u_n}{2}\right) = (n+1)\left(\frac{0 + (-2n)}{2}\right)$

ومنه: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\left(\frac{-2n}{2}\right) = (n+1)(-n) = -n^2 - n$

4) (v_n) متتالية **هندسية** أساسها: $\boxed{q = \frac{v_{n+1}}{v_n}}$،

لدينا: $v_n = 3^{-2n}$ ومنه: $v_{n+1} = 3^{-2(n+1)} = 3^{-2n-2} = 3^{-2n+(-2)} = 3^{-2n} \times 3^{-2}$

بالتعويض نجد: $q = \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3^{-2n} \times 3^{-2}}{3^{-2n}} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$.

5) المتتالية (v_n) **متزايدة تماما، لأنّ:**

$v_{n+1} - v_n = (3^{-2n} \times 3^{-2}) - (3^{-2n}) = 3^{-2n}(3^{-2} - 1) = 3^{-2n}\left(\frac{1}{9} - 1\right) = \frac{-8}{9} \times 3^{-2n} < 0$.

حل التمرين 09: (06 نقاط) بكالوريا 2012// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: a، b، c **ثلاثة حدود متتابعة** لمتتالية **حسابية متزايدة** أساسها r حيث: $a + b + c = 9$.

1.أ) حساب b:

حسب خاصية **الوسط الحسابي** لدينا: $a + c = 2b$.

$a + b + c = 9$ تُصبح $2b + b = 9$ ومنه: $3b = 9$ إذن: $\boxed{b = 3}$.

توضيح

$$\overset{+r}{\overset{\frown}{a}} \quad \overset{+r}{\overset{\frown}{b}} \quad c$$

كتابة a وc بدلالة r:

لدينا: $\begin{cases} b = a + r \\ c = b + r \end{cases}$ وبالتالي: $\begin{cases} a = b - r \\ c = b + r \end{cases}$، إذن: $\boxed{\begin{cases} a = 3 - r \\ c = 3 + r \end{cases}}$.

ب) علماً أنّ: $a \times c = -16$ **ـ تعيين الأساس r:**

لدينا مما سبق: $a = 3 - r$ **وَ** $c = 3 + r$.

$a \times c = -16$ تُكافئ: $(3 - r) \times (3 + r) = -16$

ومنه: $3^2 - r^2 = -16$

وعليه: $-r^2 = -25$

ويكون: $r^2 = 25$

وبالتالي: $r = \sqrt{25} = 5$ **أو** $r = -\sqrt{25} = -5$ **(مرفوض)**

إذن: $\boxed{r = 5}$ (لأنّ المتتالية **حسابية متزايدة**)

استنتاج a وc:

لدينا: $\begin{cases} a = 3 - r \\ c = 3 + r \end{cases}$ و $r = 5$ إذن: $\boxed{\begin{cases} a = -2 \\ c = 8 \end{cases}}$.

2. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = -2$ وأساسها 5.

نلاحظ أنّ $\begin{cases} u_0 = -2 = a \\ 5 = r \end{cases}$ إذن: $\begin{cases} u_1 = b = 3 \\ u_2 = c = 8 \end{cases}$

أ) التعبير عن الحدّ العام u_n بدلالة n:

لدينا: $u_n = u_0 + nr$، إذن: $\boxed{u_n = -2 + 5n}$.

ب) حساب u_{15}:

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

لدينا: $u_{15} = -2 + 5(15) = -2 + 75 = 73$.

استنتاج المجموع، $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{15}$:

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{15} = (15 - 0 + 1)\left(\frac{u_0 + u_{15}}{2}\right) = 16\left(\frac{-2+73}{2}\right)$

ومنه: $S = 16(35{,}5) = 568$.

3.لدينا: (v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بالعلاقة: $8v_n - u_n = 0$.

حساب المجموع، $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_{15}$:

لدينا: $8v_n - u_n = 0$ ومنه: $v_n = \frac{1}{8}u_n$

وبالتالي: $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_{15} = \frac{1}{8}u_0 + \frac{1}{8}u_1 + \cdots + \frac{1}{8}u_{15}$

ومنه: $S' = \frac{1}{8}(u_0 + u_1 + \cdots + u_{15}) = \frac{1}{8}S = \frac{1}{8}(568) = 71$.

حل التمرين 10: (06 نقاط) بكالوريا 2012// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **حسابية متزايدة**، أساسها r، **حدّها الأول** u_1 و $u_3 = 7$.

1.أ) حساب بدلالة r الجدائين $T_1 = u_1 \times u_5$ و $T_2 = u_2 \times u_4$:

لدينا: $u_n = u_p + (n-p)r$

ومنه: $u_n = u_3 + (n-3)r$ وعليه:
$$\begin{cases} u_1 = u_3 + (1-3)r = 7 - 2r \\ u_2 = u_3 + (2-3)r = 7 - r \\ u_4 = u_3 + (4-3)r = 7 + r \\ u_5 = u_3 + (5-3)r = 7 + 2r \end{cases}$$

وبالتالي: $T_1 = u_1 \times u_5 = (7-2r)(7+2r) = 7^2 - (2r)^2 = 49 - 4r^2$

وَ $T_2 = u_2 \times u_4 = (7-r)(7+r) = 7^2 - (r)^2 = 49 - r^2$

ب) تعيّين الأساس r بحيث، $T_2 - T_1 = 27$:

لدينا: $T_2 - T_1 = 27$ تُكافئ: $(49 - r^2) - (49 - 4r^2) = 27$

ومنه: $49 - r^2 - 49 + 4r^2 = 27$

وعليه: $r^2 = \frac{27}{3}$

أي: $r^2 = 9$

وبالتالي: $r = \sqrt{9} = 3$ أو $r = -\sqrt{9} = -3$

وبمأنّ (u_n) **حسابية متزايدة** (أساسها موجب)، فإنّ: $\boxed{r = 3}$.

2.بوضع $r = 3$.

أ) كتابة عبارة الحدّ العام u_n بدلالة n:

لدينا: (u_n) متتالية **حسابية**، أساسها $r = 3$، **حدّها الأول** $u_1 = 7 - 2(3) = 1$

فإنّ: $u_n = u_1 + (n-1)r$، بالتعويض نجد: $u_n = 1 + (n-1)(3)$ إذن: $\boxed{u_n = 3n - 2}$.

ب) $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ (n عدد طبيعي غير معدوم)

تبيّان أنّ، $S_n = \frac{3n^2 - n}{2}$:

لدينا: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (n - 1 + 1)\left(\frac{u_1 + u_n}{2}\right) = n\left(\frac{1+(3n-2)}{2}\right) = n\left(\frac{3n-1}{2}\right)$

ومنه: $S_n = \frac{n(3n-1)}{2} = \frac{3n^2 - n}{2}$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

ج) ايجاد العدد الطبيعي n بحيث، $S_n = 145$:

$S_n = 145$ معناه: $\frac{3n^2-n}{2} = 145$

ومنه: $3n^2 - n - 290 = 0$

مميزها: $\Delta = (-1)^2 - 4(3)(-290) = 1 + 3480 = 3481 > 0$

للمعادلة حلين متمايزين هما:

$$n' = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1)+\sqrt{3481}}{2(3)} = \frac{1+59}{6} = \frac{60}{6} = 10 \in \mathbb{N}$$

و $n'' = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1)-\sqrt{3481}}{2(3)} = \frac{1-59}{6} = \frac{-29}{3} \notin \mathbb{N}$

إذن: $\boxed{n = 10}$ ($S_{10} = 145$).

3.أ) كتابة الحدّ u_{n+5} بدلالة n:

لدينا: $u_n = 3n - 2$

ومنه: $u_{n+5} = 3(n+5) - 2 = 3n + 15 - 2 = 3n + 13$، إذن: $\boxed{u_{n+5} = 3n + 13}$.

ب) التحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم، $\frac{u_{n+5}}{n} = 3 + \frac{13}{n}$:

لدينا: $\frac{u_{n+1}}{n} = \frac{3n+13}{n} = \frac{3n}{n} + \frac{13}{n} = 3 + \frac{13}{n}$.

ج) استنتاج الأعداد الطبيعية n التي يكون من أجلها العدد $\frac{u_{n+5}}{n}$ طبيعيا:

$\frac{u_{n+1}}{n} \in \mathbb{N}$ معناه: $3 + \frac{13}{n} \in \mathbb{N}$

ومنه: $\frac{13}{n} \in \mathbb{N}$

وعليه: $n \in D_{13}$ أي: $n \in \{1; 13\}$ (قيم n هي قواسم العدد 13)

إذن: $\boxed{n = 1}$ أو $\boxed{n = 13}$.

حل التمرين 11: (06 نقاط) بكالوريا 2013// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (v_n) متتالية **هندسية** حدّها الأول $v_0 = 2$ وأساسها 3.

1.أ) التعبير عن v_n بدلالة n:

لدينا: $v_n = v_0 \times q^n$، إذن: $\boxed{v_n = 2 \times 3^n}$.

ب) حساب بدلالة n الفرق $v_{n+1} - v_n$:

لدينا: $v_n = 2 \times 3^n$ ومنه: $v_{n+1} = 2 \times 3^{n+1} = 2 \times 3^n \times 3^1$

وعليه: $v_{n+1} - v_n = (6 \times 3^n) - (2 \times 3^n) = 4 \times 3^n$

إذن: $\boxed{v_{n+1} - v_n = 4 \times 3^n}$.

استنتاج اتجاه تغيّر المتتالية (v_n):

بمأنّ: $v_{n+1} - v_n = 4 \times 3^n > 0$، فإنّ: (v_n) **متزايدة تماماً** على $\mathbb{N}$.

2ـ $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$، n عدد طبيعي غير معدوم.

أ) حساب S_n المجموع بدلالة n:

لدينا: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1} = v_0\left(\frac{1-q^{(n-1)-0+1}}{1-q}\right) = 2\left(\frac{1-3^n}{1-3}\right) = \frac{2}{-2}(1-3^n)$

ومنه: $S_n = -(1-3^n) = 3^n - 1$.

ب) تعيّين قيمة العدد الطبيعي n بحيث، $S_n = 80$:

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

$S_n = 80$ معناه: $3^n - 1 = 80$

ومنه: $3^n = 81$ (لدينا: $81 = 3^4$)

أي: $3^n = 3^4$، إذن: $\boxed{n = 4}$ ($S_4 = 80$)

ج) اثبات بالتراجع أنّه، من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $3^n - 1$ يقبل القسمة على 2:

نسمي هذه الخاصية بـ$P(n)$.

المرحلة 01: من أجل $n = 0$، لدينا: $3^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ و0 يقبل القسمة على 2، إذن: $P(0)$ صحيحة.

المرحلة 02:

- **نفرض** صحة الخاصية $P(n)$ أي: $3^n - 1$ يقبل القسمة على 2 ($3^n - 1 = 2k$) **(فرضية التراجع)**
- **ونبرهن** صحة الخاصية $P(n+1)$ أي: $3^{n+1} - 1$ يقبل القسمة على 2 ($3^{n+1} - 1 = 2k'$).

البرهان:

لدينا: $3^{n+1} - 1 = 3^n \times 3^1 - 1 = (2k+1) \times 3 - 1 = 6k + 3 - 1 = 6k + 2$

ومنه: $3^{n+1} - 1 = 2(3k+1) = 2k'$ (**حيث** $k' = 3k + 1$)

بالتالي: $P(n+1)$ صحيحة.

إذن: **حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع** من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $3^n - 1$ يقبل القسمة على 2.

حل التمرين 12: (06 نقاط) بكالوريا 2013// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **حسابية** حدّها الأول u_0 وأساسها 5 بحيث: $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 34$.

1ـ حساب u_0:

نكتب الحدود u_1، u_2 وu_3 بدلالة الحد الأول u_0

لدينا: $u_n = u_0 + nr$ ومنه: $\begin{cases} u_1 = u_0 + r = u_0 + 5 \\ u_2 = u_0 + 2r = u_0 + 10 \\ u_3 = u_0 + 3r = u_0 + 15 \end{cases}$

$u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 34$ تُصبح: $u_0 + (u_0 + 5) + (u_0 + 10) + (u_0 + 15) = 34$

ومنه: $4u_0 = 34 - 30$

ويكون: $4u_0 = 4$

إذن: $\boxed{u_0 = 1}$.

2ـ تبيّان أنّه، من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 5n + 1$:

لدينا: $u_n = u_0 + nr$، إذن: $\boxed{u_n = 1 + 5n}$.

3ـ تعيّين العدد الطبيعي n بحيث، $u_{n+1} + u_n - 8n = 4033$:

- لدينا: $u_n = 5n + 1$ ومنه: $u_{n+1} = 5(n+1) + 1 = 5n + 6$
- لدينا: $u_{n+1} + u_n - 8n = 4033$ معناه: $(5n + 6) + (5n + 1) - 8n = 4033$

ومنه: $7 + 2n = 4033$

وعليه: $2n = 4026$ إذن: $\boxed{n = 2013}$.

4ـ حساب المجموع، $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{2013}$:

لدينا: $u_{2013} = 5(2013) + 1 = 10066$

ومنه: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{2013} = (2013 - 0 + 1)\left(\frac{u_0 + u_{2013}}{2}\right) = \frac{2014}{2}(1 + 10066)$

وعليه: $S = 1007(10067) = 10137469$.

5ـ لدينا: المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بالعبارة، $v_n = 2u_n + 1$.

أ) دراسة اتجاه تغيّر المتتالية (v_n): (ندرس إشارة الفرق $v_{n+1} - v_n$)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

لدينا: $v_n = 2u_n + 1$، ولدينا: $u_{n+1} = u_n + 5$ لأنّ (u_n) حسابية أساسها 5.

نجد: $v_{n+1} = 2u_{n+1} + 1 = 2(u_n + 5) + 1 = 2u_n + 11$

ومنه: $v_{n+1} - v_n = (2u_n + 11) - (2u_n + 1) = 10 > \mathbf{0}$

إذن: (v_n) **متزايدة تماما**.

ب) حساب المجموع، $S' = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_{2013}$:

لدينا: $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_{2013} = (2u_0 + 1) + (2u_1 + 1) + \cdots + (2u_{2013} + 1)$

ومنه: $S' = 2(u_0 + u_1 + \cdots + u_{2013}) + 1(2013 - 0 + 1) = 2S + 2014$

إذن: $\boxed{S' = 20276951}$.

حل التمرين 13: (06 نقاط) بكالوريا 2014// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

تعيين الاقتراح الصّحيح، مع التّعليل:

1) (u_n) متتالية **حسابية** أساسها 3 وحدّها $u_2 = 1$.

الحد العام للمتتالية (u_n) هو:

الطريقة 01: $u_n = u_2 + (n-2)r = 1 + (n-2)(3) = 1 + 3n - 6 = -5 + 3n$

إذن: الاقتراح الصحيح هو الاقتراح جـ) $u_n = -5 + 3n$.

الطريقة 02:

- في حالة: $u_n = 1 + 3n$، نجد: $u_2 = 1 + 3(2) = 7 \neq 1$.
- في حالة: $u_n = 7 + 3n$، نجد: $u_2 = 7 + 3(2) = 13 \neq 1$.
- في حالة: $u_n = -5 + 3n$، نجد: $u_2 = -5 + 3(2) = 1$.

إذن: الاقتراح الصحيح هو الاقتراح جـ) $u_n = -5 + 3n$.

2) n عدد طبيعي،

المجموع $1 + 2 + 3 + \cdots + n$ هو عبارة عن مجموع n حد من متتالية حسابية حدّها الأول يساوي 1 وأساسها 1 لتكن هذه المتتالية (u_n) نضع: $u_1 = 1$ نجد: $u_n = n$

ومنه: $1 + 2 + 3 + \cdots + n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n = (n - 1 + 1)\left(\frac{u_1 + u_n}{2}\right)$

وعليه: $1 + 2 + 3 + \cdots + n = n\left(\frac{1+n}{2}\right) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2}$

إذن: الاقتراح الصحيح هو الاقتراح أ) $\frac{n^2+n}{2}$.

3) x عدد حقيقي.

الأعداد $x - 2$، x، $x + 1$ بهذا الترتيب **حدودا متعاقبة** لمتتالية **هندسية**، معناه: $(x - 2) \times (x + 1) = x^2$

ومنه: $x^2 + x - 2x - 2 = x^2$

وعليه: $-x - 2 = 0$

وبالتالي: $\boxed{x = -2}$

إذن: الاقتراح الصحيح هو الاقتراح جـ) $x = -2$.

4) (v_n) متتالية **هندسية** معرّفة على $\mathbb{N}$، حدّها العام $v_n = 2 \times 3^{n+1}$.

أساس المتتالية (v_n) هو:

الطريقة 01: $q = \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2\times3^{(n+1)+1}}{2\times3^{n+1}} = \frac{2\times3^{n+1}\times3^1}{2\times3^{n+1}} = 3$

إذن: الاقتراح الصحيح هو الاقتراح ب) 3.

الطريقة 02: لدينا: $v_n = 2 \times 3^{n+1}$، ومنه: $v_{n+1} = 2 \times 3^{(n+1)+1} = 2 \times 3^{(n+1)} \times 3^1 = v_n \times 3$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

أي: $\boxed{v_{n+1} = 3v_n}$

إذن: الاقتراح الصحيح هو الاقتراح ب) 3.

حل التمرين 14: (06 نقاط) بكالوريا 2014// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (v_n) المتتالية العددية المعرّفة بما يلي، $\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = 5v_n + 4 \end{cases}$.

1) حساب v_1، v_2 و v_3:

- $v_1 = 5v_0 + 4 = 5(1) + 4 = 5 + 4 = 9$.
- $v_2 = 5v_1 + 4 = 5(9) + 4 = 45 + 4 = 49$.
- $v_3 = 5v_2 + 4 = 5(49) + 4 = 245 + 4 = 249$.

2) لدينا: $u_n = v_n + 1$.

أ- تبيّان أنّ (u_n) متتالية هندسية أساسها $q = 5$ وحدّها الأول $u_0 = 2$:

ط01) نُبين أنّ الحاصل $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ عدد ثابت.

لدينا: $u_n = v_n + 1$ ومنه: $u_{n+1} = v_{n+1} + 1 = (5v_n + 4) + 1 = 5v_n + 5 = 5(v_n + 1)$

وعليه: $\boxed{\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5(v_n+1)}{v_n+1} = 5}$.

إذن: (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = 5$ وحدّها الأول $u_0 = v_0 + 1 = 1 + 1 = 2$.

ب- كتابة u_n بدلالة n:

(u_n) **هندسية** أساسها 5 وحدّها الأول $u_0 = 2$، **عبارة الحد العام** هي: $u_n = u_0 \times q^n$،

بالتعويض نجد: $\boxed{u_n = 2 \times 5^n}$.

استنتاج v_n بدلالة n:

لدينا: $u_n = v_n + 1$ و $u_n = 2 \times 5^n$ إذن: $\boxed{v_n = u_n - 1 = 2 \times 5^n - 1}$.

جـ- تحلّيل العدد 1250 إلى جداء عوامل أوليّة:

1250	2
625	5
125	5
25	5
5	5
1	

إذن: $\boxed{1250 = 2 \times 5^4}$.

استنتاج أنّ 1250 حد من حدود المتتالية (u_n):

نضع: $u_n = 1250$ نجد: $2 \times 5^{n} = 2 \times 5^{4}$

أي: $\boxed{n = 4 \in \mathbb{N}}$ $(u_4 = 1250)$

إذن: 1250 حد من حدود المتتالية (u_n).

3) أ- حساب بدلالة n المجموع S_n؛ $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}$

لدينا: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} = u_0\left(\frac{1-q^{(n-1)-0+1}}{1-q}\right) = 2\left(\frac{1-5^n}{1-5}\right) = \frac{2}{-4}(1 - 5^n)$

إذن: $\boxed{S_n = \frac{1}{2}(5^n - 1)}$.

ب- حساب بدلالة n المجموع S'_n؛ $S'_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$:

لدينا: $u_n = v_n + 1$ ومنه: $v_n = u_n - 1$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

وعليه: $S'_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1} = (u_0 - 1) + (u_1 - 1) + \cdots + (u_{n-1} - 1)$

ويكون: $S'_n = (u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}) - 1[(n-1) - 0 + 1] = S_n - n$

إذن: $\boxed{S'_n = \frac{1}{2}(5^n - 1) - n = \frac{1}{2}(5^n - 1) - n}$.

حل التمرين 15: (07 نقاط) بكالوريا 2015// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **هندسية** حدّها الأوّل u_0 وأساسها q حيث، $u_0 = 2$ وَ $q = 3$.

1) حساب u_1 وu_2:

بمأنّ (u_n) متتالية **هندسية** فإنّ: $\boxed{u_{n+1} = u_n \times q}$

وبالتالي: $u_1 = u_0 \times q = 2 \times 3 = 6$ وَ $u_2 = u_1 \times q = 6 \times 3 = 18$.

2) كتابة u_n بدلالة n:

لدينا: $u_n = u_0 \times q^n$ ومنه: $\boxed{u_n = 2 \times 3^n}$.

استنتاج u_5: $u_5 = 2 \times 3^5 = 2 \times 243 = 486$.

3) تعيين اتجاه تغيّر المتتالية (u_n): (ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$)

لدينا: $u_n = 2 \times 3^n$ ومنه: $u_{n+1} = 2 \times 3^{n+1} = 2 \times 3^n \times 3^1$

وعليه: $u_{n+1} - u_n = (6 \times 3^n) - (2 \times 3^n) = 4 \times 3^n > 0$

إذن: (u_n) **متزايدة تماما**.

4) أ) حسب بدلالة n المجموع S_n حيث، $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{n-1}$:

لدينا: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{n-1} = u_0\left(\frac{1-q^{(n-1)-0+1}}{1-q}\right) = 2\left(\frac{1-3^n}{1-3}\right)$

ومنه: $S_n = \frac{2}{-2}(1 - 3^n) = -(1 - 3^n) = 3^n - 1$.

ب) استنتج قيمة المجموع، $2 + 6 + 18 + \cdots + 486$:

لدينا: $2 + 6 + 18 + \cdots + 486 = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_5 = 3^6 - 1 = 728$

5) أ) تعيين باقي القسمة الإقليدية على 5 لكل عدد من الأعداد 3، 3^2، 3^3 و3^4:

لدينا: $\boxed{3 \equiv 3[5]}$، إذن: باقي قسمة 3 على 5 هـو 3.

$\boxed{3^2 \equiv 4[5]}$، إذن: باقي قسمة 3^2 على 5 هو 4.

$\boxed{3^3 \equiv 2[5]}$، إذن: باقي قسمة 3^3 على 5 هو 2.

$\boxed{3^4 \equiv 1[5]}$، إذن: باقي قسمة 3^4 على 5 هو 1.

ب) استنتاج أنّه لكل k من $\mathbb{N}$؛ $3^{4k} \equiv 1[5]$:

لدينا: $3^4 \equiv 1[5]$ ومنه: $(k \in \mathbb{N})\ (3^4)^k \equiv (1)^k[5]$ وعليه: $\boxed{3^{4k} \equiv 1[5]}$.

6) تعيين الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $3^n - 1$ قابلا للقسمة على 5:

$3^n - 1$ **قابلا للقسمة على** 5 معناه: $3^n - 1 \equiv 0[5]$

ومنه: $3^n \equiv 1[5]$

وَحسب نتيجة السؤال 5)ب)، فإنّ: $\boxed{n = 4k}$ (حيث $k \in \mathbb{N}$).

حل التمرين 16: (06 نقاط) بكالوريا 2015// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **حسابية** حدّها **الأوّل** u_1 وأساسها r حيث، $u_2 = \frac{1}{2}$ و$u_1 - u_3 = 5$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

1)أ) تبيان أنّ: $u_1+u_3=1$:

حسب خاصية الوسط الحسابي، $u_1+u_3=2u_2=2\left(\frac{1}{2}\right)=1$.

ب) تعيين الحدّ الأوّل u_1؛ ثمّ استنتاج أنّ $r=-\frac{5}{2}$:

لدينا: $\begin{cases}u_1-u_3=5\\u_1+u_3=1\end{cases}$، بالجمع طرفاً لطرف نجد: $(u_1-u_3)+(u_1+u_3)=5+1$

ومنه: $2u_1=6$ وعليه: $\boxed{u_1=\frac{6}{2}=3}$.

استنتاج أنّ $r=-\frac{5}{2}$: لدينا: $r=u_2-u_1=\frac{1}{2}-3=\frac{1-6}{2}=-\frac{5}{2}$.

2)كتابة u_n بدلالة n:

لدينا: $u_n=u_p+(n-p)r$ ومنه: $u_n=u_1+(n-1)r$

بالتعويض نجد: $u_n=3+(n-1)\left(-\frac{5}{2}\right)$

وبالتالي: $u_n=-\frac{5}{2}n+3+\frac{5}{2}$ إذن: $\boxed{u_n=-\frac{5}{2}n+\frac{11}{2}}$.

3)أ) حساب بدلالة n المجموع S_n حيث، $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$:

لدينا: $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n=(n-1+1)\left(\frac{u_1+u_n}{2}\right)=(n)\left(\frac{3+\left(-\frac{5}{2}n+\frac{11}{2}\right)}{2}\right)$

ومنه: $=\frac{-5n^2+17n}{4}=\frac{n}{2}\left(-\frac{5}{2}n+\frac{17}{2}\right)=\frac{n}{2}\left(3-\frac{5}{2}n+\frac{11}{2}\right)$.$S_n$

ب) عيّن قيمة العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $S_n=-\frac{657}{2}$:

معناه: $S_n=-\frac{657}{2}=\frac{-5n^2+17n}{4}$

ومنه: $2(-5n^2+17n)=4(-657)$

وعليه: $-10n^2+34n+2628=0$

مميزها: $\Delta=(34)^2-4(-10)(2628)=1156+105120=106276>0$

للمعادلة حلين متمايزين هما:

$n'=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-34+\sqrt{106276}}{2(-10)}=\frac{-34+326}{-20}=\frac{292}{-20}=\frac{-146}{10}\notin\mathbb{N}$

وَ$n''=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-34-\sqrt{106276}}{2(-10)}=\frac{-34-326}{-20}=\frac{-360}{-20}=18\in\mathbb{N}$

إذن: $\boxed{n=18}$ ($S_{18}=-\frac{657}{2}$).

4) n عدد طبيعي غير معدوم، $T_n=u_1+2u_2+3u_3+\cdots+nu_n$.

أ) التحقق أنّه لكل n من $\mathbb{N}^*$، $(n+2)(9-5n)=-5n^2-n+18$:

لدينا: $(n+2)(9-5n)=9n-5n^2+18-10n=-5n^2-n+18$

ب) باستعمال الإستدلال بالتراجع، إثبات أنّه لكل n من $\mathbb{N}^*$، $T_n=\frac{1}{6}n(n+1)(14-5n)$:

نسمي هذه الخاصية بـ$P(n)$.

المرحلة 01: من أجل $n=1$،

الطرف الأول: $T_1=1u_1=u_1=3$

الطرف الثاني: $\frac{1}{6}(1)((1)+1)(14-5(1))=\frac{2(9)}{6}=3$، إذن: $P(1)$ **صحيحة**.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

المرحلة 02:

- **نفرض** صحة الخاصية $P(n)$ أي: $T_n = \frac{1}{6}n(n+1)(14-5n)$ (**فرضية التراجع**)
- **ونبرهن** صحة الخاصية $P(n+1)$ أي: $T_{n+1} = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(9-5n)$

البرهان: لدينا:

$$\begin{aligned}T_{n+1} &= u_1 + 2u_2 + 3u_3 + \cdots + (n+1)u_{n+1}\\ &= \underbrace{u_1 + 2u_2 + 3u_3 + \cdots + nu_n}_{T_n} + (n+1)u_{n+1}\\ &= T_n + (n+1)u_{n+1}\\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(14-5n) + (n+1)u_{n+1}\\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(14-5n) + (n+1)\left(-\frac{5}{2}n+3\right)\\ &= \frac{1}{6}(n+1)[n(14-5n) + (-15n+18]\\ &= \frac{1}{6}(n+1)(-5n^2-n+18)\end{aligned}$$

حسب السؤال أ) نجد: $T_{n+1} = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(9-5n)$

إذن: $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: **حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع** لكل n من $\mathbb{N}^*$، $T_n = \frac{1}{6}n(n+1)(14-5n)$.

حل التمرين 17: (07 نقاط) بكالوريا 2016// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية عددية معرّفة من أجلّ عدد طبيعي n بـ: $u_n = 3n-2$.

1) حساب u_0، u_1، u_2 وu_3:

- $u_0 = 3(0) - 2 = 0 - 2 = -2$
- $u_1 = 3(1) - 2 = 3 - 2 = 1$
- $u_2 = 3(2) - 2 = 6 - 2 = 4$
- $u_3 = 3(3) - 2 = 9 - 2 = 7$

2) تبيان أنّ المتتالية (u_n) حسابية وتعيين أساسها: (نُبين أنّ الفرق $u_{n+1} - u_n$ عدد ثابت)

لدينا: $u_n = 3n-2$ ومنه: $u_{n+1} = 3(n+1) - 2 = 3n+3-2 = 3n+1$

وعليه: $u_{n+1} - u_n = (3n+1) - (3n-2) = 3n+1-3n+2 = 3$

إذن: (u_n) **حسابية**، أساسها $r = 3$.

3) دراسة اتجاه تغيّر المتتالية (u_n):

بمـأنّ (u_n) **حسابية** أساسها **موجب تماماً** $(r = 3 > 0)$ فـإنّها **متزايدة تماما**.

4) تبيان أنّ العدد 1954 حدّ من حدود المتتالية (u_n) وتعيين رتبته:

نضع: $u_n = 1954$ نجد: $3n - 2 = 1954$

ومنه: $3n = 1956$

وعليه: $n = \frac{1956}{3} = 652 \in \mathbb{N}$ $(u_{652} = 1954)$

إذن: 1954 حدّ من حدود المتتالية (u_n)، **رتبته:** 653 (**لأنّ** الحد الأوّل هو u_0)

5) أ) حساب بدلالة n المجموع، $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$:

لدينا: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (n-0+1)\left(\frac{u_0+u_n}{2}\right) = (n+1)\left(\frac{-2+(3n-2)}{2}\right)$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

ومنه: $S_n = (n+1)\left(\frac{3n-4}{2}\right) = \frac{(n+1)(3n-4)}{2} = \frac{3n^2-n-4}{2}$.

ب) تعيين العدد n بحيث يكون، $S_n = 328$:

$S_n = 328$ معناه: $\frac{3n^2-n-4}{2} = 328$

ومنه: $3n^2 - n - 4 = 2(328)$

وعليه: $3n^2 - n - 660 = 0$

مميزها: $\Delta = (-1)^2 - 4(3)(-660) = 1 + 7920 = 7921 > 0$

للمعادلة حلين متمايزين هما:

$n' = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1)+\sqrt{7921}}{2(3)} = \frac{1+89}{6} = \frac{90}{6} = 15 \in \mathbb{N}$

و $n'' = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1)-\sqrt{7921}}{2(3)} = \frac{1-89}{6} = \frac{-88}{6} = \frac{-44}{3} \notin \mathbb{N}$

إذن: $\boxed{n = 15}$ ($S_{15} = 328$).

حل التمرين 18: (06 نقاط) بكالوريا 2016// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **حسابية، أساسها** 3 وحدّها **الأول** u_0 وتُحقّق: $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 10$.

1) حساب الحد الأوّل u_0:

نكتب u_1؛ u_2 و u_3 بدلالة u_0

لـدينا: $u_n = u_0 + nr$ ومنه: $\begin{cases} u_1 = u_0 + (1)r = u_0 + 3 \\ u_2 = u_0 + (2)r = u_0 + 6 \\ u_3 = u_0 + (3)r = u_0 + 9 \end{cases}$

العلاقة $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 10$، تُصبح: $u_0 + (u_0 + 3) + (u_0 + 6) + (u_0 + 9) = 10$

ومنه: $4u_0 + 18 = 10$

وعليه: $4u_0 = -8$ إذن: $\boxed{u_0 = \frac{-8}{4} = -2}$.

2) كتابة الحد العام u_n بدلالة n:

لدينا: $u_n = u_0 + nr$ ومنه: $\boxed{u_n = -2 + 3n}$.

3) تعيين العدد الطبيعي n بحيث، $u_n = 145$:

$u_n = 145$ تُكافئ: $-2 + 3n = 145$

ومنه: $3n = 147$ وعليه: $\boxed{n = \frac{147}{3} = 49}$ ($u_{49} = 145$)

4) حساب المجموع S بحيث، $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{49}$:

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{49} = (49 - 0 + 1)\left(\frac{u_0+u_{49}}{2}\right) = (50)\left(\frac{-2+145}{2}\right)$

ومنه: $S = (50)\left(\frac{143}{2}\right) = (50)(71,5) = 3575$.

5) لدينا: (v_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ بالعبارة: $v_n = 2u_n + 3$.

حساب المجموع S' بحيث، $S' = v_0 + v_1 + \cdots + v_{49}$:

لدينا: $v_n = 2u_n + 3$،

ومنه: $S' = (2u_0 + 3) + (2u_1 + 3) + \cdots + (2u_{49} + 3)$

وعليه: $S' = 2(u_0 + u_1 + \cdots + u_{49}) + 3(94 - 0 + 1)$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

وبالتالي: $S' = 2S + 3(50) = 2(3575) + 150 = 7300$.

حل التمرين 19: (06 نقاط) بكالوريا 2017_د01// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغ أ.

لدينا: (u_n) متتالية **هندسية حدودها موجبة تماما**، معرّفة على $\mathbb{N}$ حيث $u_1 = 20$ و $u_3 = 320$.

1)تبيان أنّ أساس المتتالية (u_n) هو 4 وحدّها الأول هو 5:

لدينا: $u_n = u_p \times q^{n-p}$ ومنه: $u_3 = u_1 \times q^{3-1}$

وعليه: $320 = 20 \times q^2$

ويكون: $q^2 = \frac{320}{20} = 16$

وبالتالي: $\boxed{q = \sqrt{16} = 4}$ أو $\boxed{q = -\sqrt{16} = -4}$ **(مرفوض)**

إذن: $\boxed{q = 4}$ لأنّها حدود (u_n) **موجبة تماما**.

2)كتابة عبارة الحد العام للمتتالية (u_n) بدلالة n:

بمـأنّ (u_n) **هندسية** معرفة على $\mathbb{N}$ فـإنّ حدّها الأوّل هو: $u_0 = \frac{u_1}{q} = \frac{20}{4} = 5$.

وبالتالي: $u_n = u_0 \times q^n$ إذن: $\boxed{u_n = 5 \times 4^n}$.

استنتاج قيمة حدّها السابع:

الحد السابع هو: $u_6 = 5 \times 4^6 = 5(4096) = 20480$.

3)أ) حساب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S حيث، $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$:

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0\left(\frac{1-q^{n-0+1}}{1-q}\right) = 5\left(\frac{1-4^{n+1}}{1-4}\right) = \frac{5}{-3}(1 - 4^{n+1})$

ومنه: $S = \frac{5}{3}(4^{n+1} - 1)$.

ب) استنتاج قيمة المجموع S' حيث، $S' = u_0 + u_1 + \cdots + u_6$:

حسب السؤال السابق أ) نجد: $S' = u_0 + u_1 + \cdots + u_6 = \frac{5}{3}(4^{6+1} - 1) = \frac{5}{3}(4^7 - 1)$

ومنه: $S' = \frac{5}{3}(16384 - 1) = \frac{5}{3}(16383) = 27305$.

حل التمرين 20: (06 نقاط) بكالوريا 2017_د01// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغ أ.

لدينا: (u_n) متتالية **حسابية** معرّفة على المجموعة $\mathbb{N}$ بحدّها **الأوّل** $u_0 = -5$ و $u_3 + u_7 = 50$.

1)تعيين الأساس r للمتتالية (u_n):

نكتب u_3 و u_7 بدلالة u_0

لدينا: $u_n = u_0 + nr$ ومنه: $\begin{cases} u_3 = u_0 + (3)r = -5 + 3r \\ u_7 = u_0 + (7)r = -5 + 7r \end{cases}$

بالتعويض في العلاقة $u_3 + u_7 = 50$ نجد: $(-5 + 3r) + (-5 + 7r) = 50$

ومنه: $10r - 10 = 50$

وعليه: $10r = 60$ إذن: $\boxed{r = \frac{60}{10} = 6}$.

2)تبيان أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 6n - 5$:

لدينا: $u_n = u_0 + nr$ ومنه: $\boxed{u_n = -5 + 6n}$.

3)اثبات أنّ العدد 2017 حد من حدود المتتالية (u_n)، مع تعيين رتبته:

نضع: $u_n = 2017$ نجد: $-5 + 6n = 2017$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

ومنه: $6n = 2022$

وبالتالي: $\boxed{n = \frac{2022}{6} = 337 \in \mathbb{N}}$ $(u_{337} = 2017)$

إذن: العدد 2017 حد من حدود المتتالية (u_n)، **رتبته:** 338 لأنّ الحد الأوّل هو u_0.

4)حساب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S حيث $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$:

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n - 0 + 1)\left(\frac{u_0 + u_n}{2}\right) = (n + 1)\left(\frac{-5 + (-5 + 6n)}{2}\right)$

ومنه: $S = (n + 1)\left(\frac{-10 + 6n}{2}\right) = (n + 1)(-5 + 3n)$.

حل التمرين 21: (06 نقاط) بكالوريا 2017_د02// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغ أ.

لدينا: (u_n) متتالية **حسابية** معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها **الأول** u_0 وأساسها r.

1)حساب الحد u_4 علما أنّ $u_3 + u_5 = 20$:

حسب **خاصية الوسط الحسابي**، لدينا: $\boxed{u_3 + u_5 = 2u_4}$

العلاقة $u_3 + u_5 = 20$ تُصبح: $2u_4 = 20$ إذن: $\boxed{u_4 = \frac{20}{2} = 10}$.

2)حساب الحد u_5 علما أنّ $2u_4 - u_5 = 7$:

$2u_4 - u_5 = 7$ تُكافئ: $2(10) - u_5 = 7$

ومنه: $-u_5 = 7 - 20$ وعليه: $-u_5 = -13$ إذن: $\boxed{u_5 = 13}$.

3)استنتاج قيمة r وحساب u_0:

بمأنّ (u_n) متتالية **حسابية**، ولدينا: $u_4 = 10$؛ $u_5 = 13$ **إذن:** $\boxed{r = u_5 - u_4 = 13 - 10 = 3}$.

حساب u_0:

لدينا: $u_n = u_0 + nr$ ومنه: $u_4 = u_0 + 4r$، وعليه: $10 = u_0 + 4(3)$ إذن: $\boxed{u_0 = 10 - 12 = -2}$.

4)التحقّق أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = 3n - 2$:

لدينا: $u_n = u_0 + nr$ ومنه: $\boxed{u_n = -2 + 3n}$.

5)حساب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S_n، $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$:

لدينا: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (n - 0 + 1)\left(\frac{u_0 + u_n}{2}\right) = (n + 1)\left(\frac{-2 + (3n - 2)}{2}\right)$

ومنه: $S_n = (n + 1)\left(\frac{3n - 4}{2}\right) = \frac{(n+1)(3n-4)}{2} = \frac{3n^2 - n - 4}{2}$.

6)ايجاد العدد الطبيعي n حيث، $S_n = 33$:

$S_n = 33$ معناه: $\frac{3n^2 - n - 4}{2} = 33$

ومنه: $3n^2 - n - 4 = 2(33)$

وعليه: $3n^2 - n - 70 = 0$

مميزها: $\mathbf{0}$ $\Delta = (-1)^2 - 4(3)(-70) = 1 + 840 = 841 >$

للمعادلة حلين متمايزين هما:

$n' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{841}}{2(3)} = \frac{1 + 29}{6} = \frac{30}{6} = 5 \in \mathbb{N}$

و$n'' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{841}}{2(3)} = \frac{1 - 29}{6} = \frac{-28}{6} = \frac{-14}{3} \notin \mathbb{N}$

إذن: $\boxed{n = 5}$ ($S_5 = 33$).

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

حل التمرين 22: (06 نقاط) بكالوريا 2017_د02// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغ أ.

تعيين الإقتراح الصحيح مع التعليل:

1)الحد السّادس لمتتالية حسابية أساسها -3 وحدّها الأول 1 هو: **ب)** -14 .

التبرير:

- **الطريقة 01:** إذا كان: $\boxed{u_0 = 1}$ هو **الحد الأوّل** للمتتالية **الحسابية** التي أساسها $\boxed{r = -3}$

فإنّ: حدّها **السادس** هو u_5 وبالتالي: $\boxed{u_5 = u_0 + 5r = 1 + 5(-3) = -14}$.

- **الطريقة 02:** إذا كان: $\boxed{u_1 = 1}$ هو **الحد الأوّل** للمتتالية **الحسابية** التي أساسها $\boxed{r = -3}$

فإنّ: حدّها **السادس** هو u_6 وبالتالي: $\boxed{u_6 = u_1 + (6-1)r = 1 + 5(-3) = -14}$.

2)مجموع 100 حدٍ الأولى لمتتالية هندسية حدّها الأول هو 1 وأساسها 3 هو: **ج)** $\frac{3^{100}-1}{2}$.

لأنّ: المجموع $= \text{الحد الأول}\left(\frac{1-q^{\text{عدد الحدود}}}{1-q}\right) = 1\left(\frac{1-3^{100}}{1-3}\right) = \left(\frac{1-3^{100}}{-2}\right) = \frac{3^{100}-1}{2}$

3)لدينا: $a = 2x + 2$، $b = 6x - 3$، $c = 4x$.

الأعداد الحقيقية a، b، c بهذا الترتيب تُشكل حدودا متتابعة لمتتالية **حسابية** عندما يكون: أ) $x = \frac{4}{3}$

التبرير:

بمأنّ: الأعداد الحقيقية a، b، c بهذا الترتيب تُشكل حدودا متتابعة لمتتالية **حسابية**

فإنّ: **حسب خاصية الوسط الحسابي** $\boxed{a + c = 2b}$ ومنه: $(2x + 2) + (4x) = 2(6x - 3)$

وعليه: $6x + 2 = 12x - 6$،

وبالتالي: $-6x = -8$ إذن: $\boxed{x = \frac{-8}{-6} = \frac{4}{3}}$.

4)المتتالية العددية (u_n) المعرّفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ هي متتالية: **جـ)** لا حسابية ولا هندسية.

لأنّ: **العلاقة** $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$، **ليست من الشكل** $\boxed{u_{n+1} = u_n + r}$ **وليست من الشكل** $\boxed{u_{n+1} = qu_n}$.

حل التمرين 23: (06 نقاط) بكالوريا 2018// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

تعيين الإقتراح الصحيح، مع التبرير:

1)(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = n^2 - 1$

المتتالية (u_n): أ) متزايدة تماما، **لمعرفة اتجاه تغيّر متتالية ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$**

لدينا: $u_n = n^2 - 1$، ومنه: $u_{n+1} = (n+1)^2 - 1 = n^2 + 1^2 + 2(n)(1) - 1 = n^2 + 2n$

وعليه: $u_{n+1} - u_n = (n^2 + 2n) - (n^2 - 1) = 2n + 1 > 0$،

إذن: المتتالية (u_n) **متزايدة تماما**.

2)(v_n) متتالية هندسية حدّها الأوّل $v_1 = 3$ وأساسها $q = 2$،

عبارة الحد العام للمتتالية (v_n) هي: **ب)** $v_n = 3 \times 2^{n-1}$، لأنّ: $v_n = v_1 \times q^{n-1} = 3 \times 2^{n-1}$.

المجموع $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$ يُساوي: أ) $3(2^n - 1)$،

لأنّ: $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n = v_1\left(\frac{1-q^{n-1+1}}{1-q}\right) = 3\left(\frac{1-2^n}{1-2}\right) = 3\left(\frac{1-2^n}{-1}\right) = 3(2^n - 1)$.

3) **الاحتمالات**.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

حل التمرين 24: (06 نقاط) بكالوريا 2018// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(u_n) متتالية **هندسية حدودها موجبة تماما**، حدّها الأول u_0 وأساسها q حيث:
$u_0 \times u_2 = 576$ و $u_0 + u_1 = 30$.

1)تبيان أنّ $u_1 = 24$:

حسب **خاصية الوسط الهندسي**، لدينا: $u_0 \times u_2 = {u_1}^2$

ومنه: $u_0 \times u_2 = 576$

تُصبح: ${u_1}^2 = 576$

وعليه: $\boxed{u_1 = \sqrt{576} = 24}$ أو $\boxed{u_1 = -\sqrt{576} = -24}$ **(مرفوض)**

إذن: $\boxed{u_1 = 24}$ لأنّ حدود (u_n) **موجبة تماما**.

استنتاج قيمة u_0: لدينا: $u_0 + u_1 = 30$ ومنه: $u_0 = 30 - u_1 = 30 - 24 = 6$.

2)تبيان أنّ $q = 4$: لدينا: $q = \frac{u_1}{u_0} = \frac{24}{6} = 4$.

كتابة عبارة الحد العام u_n بدلالة n:

لدينا: $u_n = u_0 \times q^n$ ومنه: $\boxed{u_n = 6 \times 4^n}$.

3)اثبات أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1} - u_n = 18 \times 4^n$:

لدينا: $u_n = 6 \times 4^n$ ومنه: $u_{n+1} = 6 \times 4^{n+1} = 6 \times 4^n \times 4^1$

وعليه: $u_{n+1} - u_n = (24 \times 4^n) - (6 \times 4^n) = 18 \times 4^n$

استنتاج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n):

بمـأنّ $u_{n+1} - u_n = 18 \times 4^n > 0$، فإنّ (u_n) **متزايدة تماما**.

4)حساب 4^4: $4^4 = 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$.

التحقّق أنّ العدد 1536 حد من حدود المتتالية (u_n) وتعيين رتبته:

نضع: $u_n = 1536$ نجد: $6 \times 4^n = 1536$

ومنه: $4^n = \frac{1536}{6}$

أي: $4^n = 256$

وعليه: $4^n = 4^4$ (لأنّ $4^4 = 256$)

إذن: $\boxed{n = 4}$ ($u_4 = 1536$)، **رتبته:** 5 لأنّ الحد الأوّل هو u_0.

5)حساب بدلالة n المجموع، $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$:

لدينا: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = u_1\left(\frac{1-q^{n-1+1}}{1-q}\right) = 24\left(\frac{1-4^n}{1-4}\right) = \frac{24}{-3}(1-4^n)$

ومنه: $S_n = -8(1-4^n) = 8(4^n+1)$.

حل التمرين 25: (06 نقاط) بكالوريا 2019// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية عددية معرّفة **على** $\mathbb{N}^*$ بـ: $u_n = \frac{2}{5}n - 1$.

1)تبيان أنّ المتتالية (u_n) حسابية أساسها $\frac{2}{5}$ يُطلب حساب حدّها الأول u_1:

نُبين أنّ الفرق $u_{n+1} - u_n$ عدد ثابت $\frac{2}{5}$.

لدينا: $u_n = \frac{2}{5}n - 1$، ومنه: $u_{n+1} = \frac{2}{5}(n+1) - 1 = \frac{2}{5}n + \frac{2}{5} - 1 = \frac{2}{5}n + \frac{2-5}{5} = \frac{2}{5}n - \frac{3}{5}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

وعليه: $u_{n+1}-u_n=\left(\frac{2}{5}n-\frac{3}{5}\right)-\left(\frac{2}{5}n-1\right)=\frac{2}{5}n-\frac{3}{5}-\frac{2}{5}n+1=-\frac{3}{5}+1=\frac{-3+5}{5}$

وبالتالي: $\boxed{u_{n+1}-u_n=\frac{2}{5}}$،

إذن: المتتالية (u_n) **حسابية** أساسها $\frac{2}{5}$، وحدّها الأول $u_1=\frac{2}{5}(1)-1=\frac{2}{5}-1=\frac{2-5}{5}=\frac{-3}{5}$.

2)تعيين رتبة الحد الذي قيمته 575:

نضع: $u_n=575$ نجد: $\frac{2}{5}n-1=575$

ومنه: $\frac{2}{5}n=576$

وعليه: $2n=5(576)$

أي: $2n=2880$ وبالتالي: $n=\frac{2880}{2}=1440\in\mathbb{N}$ $(u_{1440}=575)$

إذن: رتبة الحد الذي قيمته 575 هي 1440 لأنّ الحد الاوّل هو u_1.

3)حساب قيمة المجموع S حيث، $S=u_1+u_2+\cdots+u_{1440}$:

لدينا: $S=u_1+u_2+\cdots+u_{1440}=(1440-1+1)\left(\frac{u_1+u_{1440}}{2}\right)=(1440)\left(\frac{\frac{-3}{5}+575}{2}\right)$

ومنه: $S=\frac{1440}{2}\left(\frac{-3}{5}+575\right)=720\left(\frac{-3+5(575)}{5}\right)=720\left(\frac{-3+2875}{5}\right)=720\left(\frac{2872}{5}\right)$

وعليه: $S=720(574,4)=413568$.

4)(v_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}^*$ كما يلي: $v_n=4^{5u_n+6}$.

أ) تبيان أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول v_1:

(نُبين أنّ حاصل القسمة $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ عدد ثابت)

لدينا: $v_n=4^{5u_n+6}$ ومنه: $v_{n+1}=4^{5u_{n+1}+6}$

وبمأنّ (u_n) **حسابية** فـإنّ $u_{n+1}=u_n+r$، أي: $\boxed{u_{n+1}=u_n+\frac{2}{5}}$.

وعليه: $v_{n+1}=4^{5u_{n+1}+6}=4^{5\left(u_n+\frac{2}{5}\right)+6}=4^{5u_n+2+6}=4^{(5u_n+6)+2}=4^{5u_n+6}\times 4^2$

وبالتالي: $\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{4^{5u_n+6}\times 4^2}{4^{5u_n+6}}=4^2=16$

إذن: (v_n) متتالية **هندسية** أساسها $\boxed{q=16}$، وحدّها الأول

$v_1=4^{5u_1+6}=4^{5\left(\frac{-3}{5}\right)+6}=4^{-3+6}=4^3=64$ **لأنّها** معرّفة على $\mathbb{N}^*$.

ب) حساب بدلالة n المجموع، $S_n=v_1+v_2+\cdots+v_n$:

لدينا: $S_n=v_1+v_2+\cdots+v_n=v_1\left(\frac{1-q^{n-1+1}}{1-q}\right)=64\left(\frac{1-16^n}{1-16}\right)=\frac{64}{-15}(1-16^n)$

إذن: $\boxed{S_n=\frac{64}{15}(16^n-1)}$.

حل التمرين 26: (04 نقاط) بكالوريا 2019// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) المتتالية **الحسابية** التي حدّها الأول u_0 وأساسها r.

1)علماً أنّ: $u_0+u_1+u_2=6$، تعيين u_1:

حسب **خاصية الوسط الحسابي** لدينا: $\boxed{u_0+u_2=2u_1}$،

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

العلاقة $u_0+u_1+u_2=6$ تُصبح: $u_1+2u_1=6$ ومنه: $3u_1=6$ إذن: $\boxed{u_1=\frac{6}{3}=2}$.

2)علماً أنّ: $2u_0-3u_1=-10$، تعيين الحد الأول u_0، ثم استنتاج قيمة r أساس المتتالية (u_n):

$2u_0-3u_1=-10$ تُكافئ: $2u_0-3(2)=-10$

ومنه: $2u_0=-10+6$ أي: $2u_0=-4$ إذن: $\boxed{u_0=\frac{-4}{2}=-2}$.

استنتاج قيمة r أساس المتتالية (u_n):

بمأنّ (u_n) **حسابية**؛ ولدينا: $u_1=2$، $u_0=-2$ فـإنّ $\boxed{r=u_1-u_0=2-(-2)=4}$.

3)كتابة عبارة الحد العام u_n بدلالة n:

لدينا: $u_n=u_0+nr$ ومنه: $\boxed{u_n=-2+4n}$.

4)أ) تعيين قيمة n حتى يكون $u_n=2018$:

نضع: $u_n=2018$ نجد: $-2+4n=2018$

ومنه: $4n=2020$ وبالتالي: $\boxed{n=\frac{2020}{4}=505\in\mathbb{N}}$ $(u_{505}=2018)$

ب) حساب الحد الخامس عشر للمتتالية (u_n):

بمـأنّ **الحد الأوّل** هو u_0 فـإنّ **الحد الخامس عشر** هو: $\boxed{u_{14}=-2+4(14)=54}$.

5)حساب بدلالة n المجموع S_n حيث، $S_n=u_0+u_1+u_2+\cdots+u_n$:

لدينا: $S_n=u_0+u_1+u_2+\cdots+u_n=(n-0+1)\left(\frac{u_0+u_n}{2}\right)$

ومنه: $S_n=(n+1)\left(\frac{-2+(-2+4n)}{2}\right)=(n+1)\left(\frac{-4+4n}{2}\right)=(n+1)(2n-2)$.

6)تعيين العدد الطبيعي n حتى يكون، $S_n=96$:

$S_n=96$ معناه: $(n+1)(2n-2)=96$

ومنه: $2n^2-2n+2n-2=96$

وعليه: $2n^2=98$

أي: $n^2=49$

وبالتالي: $n=\sqrt{49}=7$ **أو** $n=-\sqrt{49}=-7$ (مرفوض)

إذن: $\boxed{n=7}$ ($S_7=96$).

حل التمرين 27: (06 نقاط) بكالوريا 2020// الموضوع 01// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **حسابية، حدّها الأوّل u_0، وأساسها r** حيث: $\begin{cases}u_2-u_0=4\\u_1+u_3=16\end{cases}$.

1)حساب الحدّ u_2:

حسب **خاصية الوسط الحسابي،** $u_1+u_3=2u_2$ وبالتعويض في العلاقة: $\underbrace{u_1+u_3}_{2u_2}=16$

نجد: $2u_2=16$

ومنه: $u_2=\frac{16}{2}=8$؛ إذن: $\boxed{u_2=8}$

حساب الحدّ u_0:

لدينا: $\begin{cases}u_2-u_0=4\\u_2=8\end{cases}$، ومنه: $8-u_0=4$ وعليه: $-u_0=-4$ إذن: $\boxed{u_0=4}$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com · نجاح 213

استنتاج الأساس r للمتتالية (u_n):

لدينا: $\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_2 = 8 \end{cases}$، بالتعويض في العلاقة: $u_n = u_0 + nr$

نجد: $u_2 = u_0 + 2r$

وعليه: $8 = 4 + 2r$

وبالتالي: $2r = 4$ إذن: $\boxed{r = 2}$.

2)أ. تبيان أنّ الحدّ العام للمتتالية (u_n) معرّف بـ $u_n = 4 + 2n$:

بمأنّ: (u_n) **متتالية حسابية، حدّها الأوّل $u_0 = 4$، وَأساسها $r = 2$**؛ فإنّ: $u_n = u_0 + nr$

وبالتعويض نجد: $\boxed{u_n = 4 + 2n}$ (وهو المطلوب).

ب. تحديد مع التّبرير اتجاه تغيّر المتتالية (u_n):

لتحديد **اتجاه تغيّر** متتالية (u_n) **بصفة عامة؛ ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$،**

وبمأنّ: (u_n) **حسابية** فإن: $u_{n+1} - u_n = r = 2 > 0$ إذن: المتتالية (u_n) **متزايدة تماما**.

3)تبيان أنّ العدد 2020 حدّ من حدود المتتالية (u_n)، محدّداً رُتبته:

نضع: $\boxed{u_n = 2020}$ نجد: $4 + 2n = 2020$

ومنه: $2n = 2020 - 4$

أي: $n = \frac{2016}{2} = 1008 \in \mathbb{N}$ $(u_{1008} = 2020)$

إذن: 2020 حد من حدود المتتالية (u_n)، **رتبته:** 1009 لأنّ الحد الأوّل هو u_0.

4)حساب المجموع S المعرّف بـ $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{1008}$:

لدينا: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{1008} = (1008 - 0 + 1)\left(\frac{u_0 + u_{1008}}{2}\right) = 1009\left(\frac{4+2020}{2}\right)$

ومنه: $S = 1009\left(\frac{2024}{2}\right) = 1009(1012) = 1021108$.

حل التمرين 28: (06 نقاط) بكالوريا 2020// الموضوع 02// الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لدينا: (u_n) متتالية **هندسية، حدّها الأوّل u_1، حدودها موجبة تماما** حيث: $u_3 \times u_5 = 2916$.

1)حساب الحد u_4:

حسب **خاصية الوسط الهندسي**، $u_3 \times u_5 = {u_4}^2$

وبالتعويض في العلاقة: $\underbrace{u_3 \times u_5}_{{u_4}^2} = 2916$،

نجد: ${u_4}^2 = 2916$

وعليه: $\boxed{u_4 = \sqrt{2916} = 54}$ أو $\boxed{u_4 = -\sqrt{2916} = -54}$ **(مرفوض)**

إذن: $\boxed{u_4 = 54}$ لأنّ حدود (u_n) **موجبة تماما**.

2)علما أنّ $u_3 = 18$، التحقّق أنّ أساس المتتالية (u_n) هو 3:

بمأنّ: (u_n) **متتالية هندسية**، ولدينا: $\begin{cases} u_3 = 18 \\ u_4 = 54 \end{cases}$؛ فإن **أساسها** هو: $\boxed{q = \frac{u_4}{u_3} = \frac{54}{18} = 3}$.

3)حساب الحدّ الأوّل u_1، ثمّ كتابة عبارة الحد العام u_n بدلالة n:

بمأنّ: (u_n) **متتالية هندسية، حدّها الأوّل u_1، وَأساسها $q = 3$**؛ فإنّ: $\boxed{u_n = u_1 \times q^{n-1}}$

ولدينا من جهة أخرى: $u_3 = 18$، بالتعويض نجد: $u_3 = u_1 \times q^{3-1}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

أي: $18 = u_1 \times 3^2$

وهذا يعني: $9u_1 = 18$ إذن: $\boxed{u_1 = \frac{18}{9} = 2}$.

أو ولدينا من جهة أخرى: $u_4 = 54$، بالتعويض نجد: $u_4 = u_1 \times q^{4-1}$

أي: $54 = u_1 \times 3^3$

وهذا يعني: $27u_1 = 54$ إذن: $\boxed{u_1 = \frac{54}{27} = 2}$.

كتابة عبارة الحد العام u_n بدلالة n:

بالتعويض في: $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ نجد: $\boxed{u_n = 2 \times 3^{n-1}}$.

4)تعيين رتبة الحدّ الذي قيمته 1458: (بملاحظة: $729 = 3^6$)

نضع: $u_n = 1458$ نجد: $2 \times 3^{n-1} = 1458$

ومنه: $3^{n-1} = \frac{1458}{2}$

أي: $3^{n-1} = 729$

وعليه: $3^{n-1} = 3^6$ (لأنّ $3^6 = 729$)

وبالتالي: $n - 1 = 6$

إذن: $\boxed{n = 7}$ ($u_7 = 1458$)، **رتبته:** 7 لأنّ الحد الأوّل هو u_1.

5)حساب بدلالة n المجموع S_n حيث، $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$:

لدينا: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = u_1\left(\frac{1-q^{n-1+1}}{1-q}\right) = 2\left(\frac{1-3^n}{1-3}\right) = \frac{2}{-2}(1-3^n)$

ومنه: $S_n = -(1-3^n) = 3^n + 1$.

الحمد لله.

جمع الأستاذ بوعزة مصطفى.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com