najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية المسيلة

إمتحان بكالوريا تجربية للتعليم الثانوي — ثانوية: المجاهد طويري محمد

الشعبة: آداب وفلسفة + لغات أجنبية — دورة ماي 2021

إختبار في مادة: الرياضيات — المدة: 02 سا و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الأتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (05 نقاط)

1) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 5.

2) عين باقي القسمة الإقليدية للعدد 1442^{2021} على 5.

3) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2^{4n} \equiv 1[5]$.

4) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $2^{412} + 2^{8n+2} - 5 \equiv 0[5]$.

5) عين العدد الطبيعي n بحيث يكون العدد: $2^{4n} + 2^n + 41$ مضاغف للعدد 5.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

✍ (u_n) متتالية هندسية وحدودها موجبة، حدها الأول u_1 أساسها q حيث: $u_3 = 8$ و $u_5 \times u_7 = 4096$.

1) احسب u_6 والأساس q.

2) احسب u_1، ثم اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

3) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

4) احسب المجموع S_n بدلالة n، حيث: $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$.

5) علما أن: $2^9 = 512$، عين العدد الطبيعي n بحيث: $S_n = 2044$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمـرين الثالث: (09 نقاط)

✍ نعتبر الدالة العددية f ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$.

(C_f) المنحنى البياني البياني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1) احسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

2) ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها.

3) بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين احداثييها.

4) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = (x-1)(2x^2 - x - 1)$.

5) عين احداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات.

6) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة $x_0 = \frac{1}{2}$.

7) أنشئ (T) و (C_f) في نفس المعلم السابق.

8) m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا وحسب قيم m، عدد حلول المعادلة: $f(x) = m$.

إنتهى المـوضـوع الأول



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (05 نقاط)

✍ a و b عددان طبيعيان حيث: $a \equiv 3[4]$ و $b \equiv 2[4]$.

1) هل العدد $2a+5b^3$ يقبل القسمة على 4 ؟

2) احسب باقي قسمة العدد a^2-2b^3 على 4.

3) تحقق أن: $a \equiv -1[4]$.

4) استنتج باقي قسمة العدد $a^{1442} \times a^{2021}$ على 4.

5) استنتج أن: $a^{2021}+a^{1442} \equiv 0[4]$.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

✍ لتكن (u_n) متتالية حسابية حدها الأول u_0 وأساسها r، حيث: $u_3=1$ و $u_{12}=19$.

1) عين الأساس r والحد الأول u_0 لهذه المتتالية.

2) اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n، ثم احسب u_{18}.

3) عين العدد الطبيعي n حتى يكون: $u_n=2021$.

4) احسب بدلالة n المجموع: $S_n=u_0+u_1+u_2+\cdots+U_n$.

5) استنتج المجموع: $A=31+33+35+\cdots+2021$.

التمرين الثالث: (09 نقاط)

✍ نعتبر الدالة f للمتغير الحقيقي x المعرفة على $]-\infty;-2[\cup]-2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x+2}{x+2}$.
(C_f) المنحنى البياني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -2: $f(x)=2-\dfrac{2}{x+2}$.

2) أ) احسب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}-2} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}-2} f(x)$.

ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3) عين الدالة المشتقة f' للدالة f وادرس اشارتها.

4) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها على مجموعة تعريفها.

5) عين احداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات.

6) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.

7) أنشئ (T) و (C_f).

8) ناقش بيانيا تبعا لقيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $f(x) = m$.

إنتهى المـوضـوع الثاني

الزمن	اكتوبر 2020	جوان 2021
(أنا)′	+	
أنا	0	البـاك

الارادة الصادقة للإنسان...
تشبه قوة خفية تسير خلف ظهره، وتدفعه دفعا للأمام على طريق النجاح...
وتتنامى مع الوقت حتى تمنعه من التوقف أو التراجع.

☺ بالتوفيق والنجاح في شهادة بكالوريا 2021. ☺
أتمنى لكم حياة جامعية أفضل ... 🎓



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تصحيح إمتحان بكالوريا تجربية للتعليم الثانوي
الشعبة: آداب وفلسفة + لغات أجنبية

ثانوية: المجاهد طويري محمد
دورة ماي 2021

تصحيح المـوضـوع الأول

حل التـمـرين الأول 05 ن

1 • دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 5: 1.5 ن

◃ من أجل $n=0$ نجد: $2^0 \equiv 1[5]$
◃ من أجل $n=1$ نجد: $2^1 \equiv 2[5]$
◃ من أجل $n=2$ نجد: $2^2 \equiv 4[5]$
◃ من أجل $n=3$ نجد: $2^3 \equiv 3[5]$
◃ من أجل $n=4$ نجد: $2^4 \equiv 1[5]$

نلخص بواقي قسمة 2^n على 5 في الجدول التالي:

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$	$k \in \mathbb{N}$
$2^n \equiv$	1	2	4	3	[5]

ومنه:
◃ بواقي قسمة 2^{4k} على 5 هي 1.
◃ بواقي قسمة 2^{4k+1} على 5 هي 2.
◃ بواقي قسمة 2^{4k+2} على 5 هي 4.
◃ بواقي قسمة 2^{4k+3} على 5 هي 3.

2 تعيين باقي القسمة الإقليدية للعدد 1442^{2021} على 5: 1 ن

لدينا: $1442 \equiv 2[5]$ حسب خواص الموافقات: $1442^{2021} \equiv 2^{2021}[5]$ ونكتب: $1442^{2021} \equiv 2^{2\times 1010+1}[5]$

ولدينا: $2^{3k+1} \equiv 2[5]$ حسب خاصية التعدي ينتج: $1442^{2021} \equiv 2[5]$

ومنه باقي القسمة الإقليدية للعدد 1442^{2021} على 5 هو: 2.

3 تبيين أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2^{4n} \equiv 1[5]$ 0.5 ن

لدينا: $2^4 \equiv 1[5]$ وبإستعمال خاصية الرفع إلى قوى n نجد: $(2^4)^n \equiv 1^n[5]$ ومنه: $2^{4n} \equiv 1[5]$.

4 تبيين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $2^{412} + 2^{8n+2} - 5 \equiv 0[5]$ 1 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

لدينا:

$$2^{412}+2^{8n+2}-5\equiv 2^{4\times 103}+2^{2(4n+1)}-5[5]$$
$$2^{412}+2^{8n+2}-5\equiv 2^{4\times 103}+(2^{4n+1})^2-5[5]$$
$$2^{412}+2^{8n+2}-5\equiv 1+(2)^2-5[5]$$
$$2^{412}+2^{8n+2}-5\equiv 1+4-5[5]$$
$$2^{412}+2^{8n+2}-5\equiv 0[5]$$

5 تعيين العدد الطبيعي n بحيث يكون العدد: $2^{4n}+2^n+41$ مضاغف للعدد 5: 1 ن

لدينا: $2^{4n}+2^n+41$ مضاغف لـ 5 معناه $2^{4n}+2^n+41\equiv 0[5]$

ومنه: $2^{4n}+2^n+41\equiv 0[5]$ يكافئ $1+2^n+1\equiv 0[5]$ يكافئ $2^n\equiv -2[5]$ يكافئ $2^n\equiv 3[5]$

ومن الجدول نجد: $n=4k+3$ حيث: $k\in\mathbb{Z}$.

حل التمـرين الثاني 06 ن

1 • حساب u_5: 1 ن

لدينا: ❶ $\cdots u_5\times u_7=4096$

وحسب خاصية الوسط الهندسي في الممتالية الهندسة نجد: ❷ $\cdots u_5\times u_7=(u_5)^2$

من ❶ و ❷ نجد: $(u_6)^2=4096$ أي: $u_6=\sqrt{4096}=64$ أو $u_5=-\sqrt{4096}=-64$

بما أن حدود المتتالية (u_n) موجبة فإن: $u_5=64$.

• حساب الأساس r: 1 ن

لدينا: $u_6=u_3\times q^{6-3}$ أي $64=8\times q^3$ أي $q^3=\frac{32}{2}$ ومنه $q^3=8$

(بما أن $2^3=8$ فإن: $q^3=2^3$) ومنه $q=2$.

2 • حساب u_1: 0.5 ن

لدينا: $u_3=u_1\times q^{3-1}$ أي: $8=u_1\times 2^2$ أي: $u_1=\frac{8}{4}$ ومنه: $u_1=2$.

• عبارة حد العام u_n بدلالة n: 1 ن

تعطى عبارة الحد العام لمتتالية هندسية حدها الأول u_1 بالعلاقة التالية: $u_n=u_1\times q^{n-1}$

بعد التعويض نجد: $u_n=2\times 2^{n-1}$ أي $u_n=2^{n-1+1}$ ومنه $u_n=2^n$.

3 اتجاه تغير المتتالية u_n: 0.5 ن

بما أن $q=2>1$ و $u_1=2>1$ فإن المتتالية u_n متزايدة تماما.

4 حساب المجموع S_n بدلالة n: 1 ن

لدينا: $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n=u_1\times\left(\frac{q^n-1}{q-1}\right)=2\times\left(\frac{2^n-1}{2-1}\right)=2\times(2^n-1)$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

5) علما أن: $2^9 = 512$، عين العدد الطبيعي n بحيث: $S_n = 2044$ **1 ن**

لدينا: $S_n = 2044$ معناه: $2 \times (2^n - 1) = 2044$ معناه: $(2^n - 1) = 511$ معناه: $2^n = 512$

بالمطابقة مع $2^9 = 512$ نجد $n = 9$.

حل التمـرين الثالث **09 ن**

1) حساب النهايات **0.5 ن** + **0.5 ن**

$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} x^3 = +\infty$

2) دراسة إتجاه تغير الدالة f:

- حساب الدالة المشتقة f' للدالة f: **0.5 ن**

الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = 6x^2 - 6x$

- دراسة إشارة $f'(x)$ **0.5 ن**

لدينا: $f'(x) = 0$ تكافئ $6x^2 - 6x = 0$ نكافئ $6x(x-1) = 0$

نكافئ $6x = 0$ أو $x - 1 = 0$ تكافئ $x = 0$ أو $x = 1$.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

إذن من أجل: **0.5 ن**

- ◁ $x \in]-\infty;0]$; $f'(x) > 0$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على مجال $]-\infty;0]$
- ◁ $x \in [0;1]$; $f'(x) < 0$ ومنه الدالة f متناقصة تماما على مجال $[0;1]$
- ◁ $x \in [1;+\infty[$; $f'(x) > 0$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على مجال $[1;+\infty[$

- جدول تغيرات الدالة f **0.5 ن**

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	0	↗	$+\infty$

3) تبيين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين احداثييها: **1 ن**

نحسب الدالة المشتقة الثانية f'' للدالة f وندرس إشارتها:

الدالة f' قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f'' حيث: $f''(x) = 12x - 6$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

لدينا: $f''(x)=0$ تكافئ $12x-6=0$ تكافئ $12x=6$ تكافئ $x=\frac{1}{2}$

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

إذن الدالة المشتقة الثانية f'' تنعدم من أجل $x=\frac{1}{2}$ مغيرة إشارتها.

ومنه المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف w حيث: $w\left(\frac{1}{2};f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ أي $w\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.

4) التحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)=(x-1)(2x^2-x-1)$: 0.5 ن

من أجل كل x من $\mathbb{R}$: لدينا:

$$(x-1)(2x^2-x-1)=2x^3-x^2-x-2x^2+x+1=2x^3-3x^2+1=f(x)$$

5) تعيين احداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات:

• مع محور الفواصل: 0.5 ن + 0.5 ن

معناه $y=0$ معناه $f(x)=0$ معناه $(x-1)(2x^2-x-1)=0$ معناه $(x-1)=0$ أو $(2x^2-x-1)=0$

لدينا: $x-1=0$ يكافئ $x=1$

ولدينا: $(2x^2-x-1)=0$ نحسب المميز Δ فنجد: $\Delta=(-1)^2-4(2)(-1)=9$

ومنه للمعادلة حلان: $x_1=\frac{1+\sqrt{9}}{2\times 2}=\frac{4}{4}=1$ أو $x_2=\frac{1-\sqrt{9}}{2\times 2}=\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2}$

وبالتالي المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطتين A و B حيث: $A(1;0)$ و $B\left(-\frac{1}{2};0\right)$.

• مع محور التراتيب: 0.5 ن

معناه $x=0$ أي نحسب: $f(0)$ ومنه: $f(0)=2(0)^3-3(0)^2+1=1$


وبالتالي المنحنى (C_f) يقطع محور التراتيب في النقطة C حيث: $C(0;1)$.

6) كتابة معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة $x_0=\frac{1}{2}$: 1 ن

$(T):f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+f\left(\frac{1}{2}\right)$ تكافئ $(T):-\frac{3}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}$ تكافئ $(T):-\frac{3}{2}x+\frac{5}{4}$

7) إنشاء المماس (T) 0.5 ن والمنحنى (C_f): 0.5 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com



8 مناقشة تبعا لقيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $f(x)=m$ 1 ن

- من أجل $m \in]-\infty;0[$ يوجد حل وحيد
- من أجل $m=0$ يوجد حل مضاعف $x_0=1$ و حل $x_1=-\frac{1}{2}$
- من أجل $m \in]0;1[$ يوجد ثلاثة حلول
- من أجل $m=1$ يوجد حل مضاعف $x_2=0$ وحل $x_3=\frac{3}{2}$
- من أجل $m \in]1;+\infty[$ يوجد حل وحيد

إنتهى تصحيح المـوضـوع الأول

najah213.com · نجاح 213

تصحيح المـوضـوع الثاني

حل التمـرين الأول 05 ن

1) نبحث إن كان العدد $2a+5b^3$ يقبل القسمة على 4: 1 ن

نقول عن العدد $2a+5b^3$ أنه يقبل القسمة على 4 إذا كان $2a+5b^3\equiv 0[4]$.

لدينا: $a\equiv 3[4]$ يكافئ $2a\equiv 6[4]$ يكافئ ❶ $\cdots 2a\equiv 2[4]$

ولدينا: $b\equiv 3[4]$ يكافئ $b^3\equiv 2^3[4]$ يكافئ $b^3\equiv 8[4]$ يكافئ $b^3\equiv 0[4]$

يكافئ ❷ $\cdots 5b^3\equiv 0[4]$

بجمع الموافقة ❶ والموافقة ❷ طرف لطرف ينتج: $2a+5b^3\equiv 2[4]$.

ومنه العدد $2a+5b^3$ لا يقبل القسمة على 4.

2) حساب باقي قسمة العدد a^2-2b^3 على 4: 1 ن

لدينا: $a\equiv 3[4]$ يكافئ $a^2\equiv 3^2[4]$ يكافئ $\cdots a^2\equiv 9[4]$ يكافئ ❸ $\cdots a^2\equiv 1[4]$

ولدينا: $b^3\equiv 0[4]$ يكافئ ❹ $\cdots 2b^3\equiv 0[4]$

نطرح الموافقة ❸ من الموافقة ❹ نجد: $a^2-2b^3\equiv 1[4]$.

ومنه باقي قسمة العدد a^2-2b^3 على 4 هو 1.

3) حساب باقي قسمة العدد a^2-2b^3 على 4: 1 ن

لدينا: $a\equiv 3[4]$ يكافئ $a+1\equiv 3+1[4]$ يكافئ $a+1\equiv 4[4]$

وبما أن: $4\equiv 0[4]$ فإن (حسب خاصية التعدي): $a+1\equiv 0[4]$

يكافئ $a+1-1\equiv 0-1[4]$ يكافئ $a\equiv -1[4]$

4) استنتاج باقي قسمة العدد $a^{2021}\times b^{1442}$ على 4 1 ن

لدينا: $a\equiv -1[4]$ يكافئ $a^{2021}\equiv (-1)^{2021}[4]$

بما أن العدد 2021 فردي فإن: $a^{2021}\equiv -1[4]$ أي: ❺ $\cdots a^{2021}\equiv 3[4]$

لدينا: $a\equiv -1[4]$ يكافئ $a^{1442}\equiv (-1)^{1442}[4]$

بما أن العدد 1442 زوجي فإن: ❻ $\cdots a^{1442}\equiv 1[4]$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

نضرب الموافقة ❺ في الموافقة ❻ نجد: $a^{2021} \times a^{1442} \equiv 3 \times 1[4]$

يكافئ $a^{2021} \times a^{1442} \equiv 3[4]$

ومنه باقي قسمة العدد $a^{2021} \times a^{1442}$ على 4 هو 3.

5 استنتاج أن: $a^{2021} + a^{1442} \equiv 0[4]$. 1 ن

بجمع الموافقة ❺ والموافقة ❻ نجد: $a^{2021} + a^{1442} \equiv 3 + 1[4]$ يكافئ $a^{2021} \times a^{1442} \equiv 4[4]$

وبما أن: $4 \equiv 0[4]$ فإن (حسب خاصية التعدي): $a^{2021} + a^{1442} \equiv 0[4]$

حل التمـرين الثاني 06 ن

1 • تعيين الأساس r 1 ن

⋆ طريقة 1

بما أن u_n متتالية حسابية فإن: $\begin{cases} u_3 = u_0 + 3r \\ u_{12} = u_0 + 12r \end{cases}$ وبالتعويض نجد: $\begin{cases} 1 = u_0 + 3r \cdots (I) \\ 19 = u_0 + 12r \cdots (II) \end{cases}$

بطرح (I) من (II) طرف لطرف ينتج: $(19 - 1) = (u_0 - u_0) + (12 - 3)r$

أي: $18 = 9r$ ومنه: $r = \frac{18}{9} = 2$.

⋆ طريقة 2

لدينا: $u_12 = u_3 + (12 - 3)r$ ومنه: $19 = 1 + 9r$ أي: $19 - 1 = 9r$ أي: $18 = 9r$ إذن: $r = \frac{18}{9} = 2$

• تعيين الحد الأول u_0 0.5 ن

نعوض قيمة r في المعادلة (I) ينتج: $1 = u_0 + 3 \times 2$ أي $u_0 = 1 - 6$ إذن: $u_0 = -5$.

2 • عبارة حد العام u_n بدلالة n: 1 ن

تعطى عبارة الحد العام u_n لمتتالية حسابية حدها الأول u_0 وأساسها r بالعلاقة التالية: $u_n = u_0 + n \times r$

بعد التعويض والترتيب نجد: $u_n = 2n - 5$.

• حساب u_{18}: 0.5 ن

بالتعويض في عبارة الحد العام نجد: $u_{18} = 2(18) - 5 = 36 - 5 = 31$.

3 تعيين العدد الطبيعي n حتى يكون : $u_n = 2021$ 1 ن

$u_n = 2021$ تكافئ $2n - 5 = 2021$ تكافئ $2n = 2021 + 5$ تكافئ $2n = 2026$ تكافئ $n = \frac{2026}{2} = 1013$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

4) حساب بدلالة n المجموع : $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ — 1 ن

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (n+1)\left(\frac{u_0 + u_n}{2}\right)$$
$$= (n+1)\left(\frac{-5 + 2n - 5}{2}\right)$$
$$= (n+1)\left(\frac{2n-10}{2}\right) = (n+1)\left(\frac{2(n-5)}{2}\right) = (n+1)(n-5)$$

5) إستنتاج المجموع: $A = 31 + 33 + 34 + \cdots + 2021$ — 1 ن

$$A = 31 + 33 + 34 + \cdots + 2021 = u_1 8 + u_1 9 + u_{20} + \cdots + u_{1013}$$
$$= (1013 - 18 + 1)\left(\frac{31 + 2021}{2}\right) = 1021896$$

حل التمـرين الثالث 09 ن

1) تبيين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -2: $f(x) = 2 - \frac{2}{x+1}$ — 0.5 ن

⋆ طريقة 1

$$f(x) = \frac{2x+2}{x+2} = \frac{2x+2+4-4}{x+2} = \frac{2x+4-2}{x+2} = \frac{2(x+2)}{x+2} - \frac{2}{x+2} = 2 - \frac{2}{x+2}$$

⋆ طريقة 2

$$2 - \frac{2}{x+2} = \frac{2(x+2)}{x+2} - \frac{2}{x+2} = \frac{2x+4-2}{x+2} = \frac{2x+2}{x+2} = f(x)$$

أي $f(x) = 2 - \frac{2}{x+1}$

2) ا) حساب النهايات

0.5 ن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{2x+2}{x+2} = \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{2x}{x} = 2$

0.5 ن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2x+2}{x+2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2x}{x} = 2$

إشارة المقام $x+2$

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$	

0.5 ن $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}-2} f(x) = \lim\limits_{x\overset{<}{\to}-2} \frac{2x+3}{x+2} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$

0.5 ن $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}-2} f(x) = \lim\limits_{x\overset{>}{\to}-2} \frac{2x+3}{x+2} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$

ب) استنتاج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مع تعيين معادلة لكل منهما:

(التفسير الهندسي) 0.5 ن + 0.5 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

◁ لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=2$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=2$.

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y=2$ مستقيم مقارب أفقي للمنحنى (C_f) بجوار $(+\infty)$ وبجوار $(-\infty)$.

◁ ولدينا: $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}-2} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}-2} f(x)=-\infty$ ومنه المستقيم ذو المعادلة $x=-2$ مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

3 • تعيين الدالة المشتقة f' للدالة f: 1 ن

الدالة f قابلة للإشتقاق على $]-\infty;-2[\cup]-2;+\infty[$ و دالتها المشتقة f'

حيث: $f'(x)=\dfrac{(2x+2)'(x+2)-(x+2)'(2x+2)}{(x+2)^2}=\dfrac{2(x+2)-(2x+2)}{(x+2)^2}=\dfrac{2}{(x+2)^2}$

• دراسة إشارة $f'(x)$: 0.5 ن

بما أن: $(x+2)^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة البسط ومنه $f'(x)>0$

• إتجاه تغير الدالة f 0.5 ن

إذن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجال $]-\infty;-2[$ والمجال $]-2;+\infty[$

4 جدول تغيرات f 0.5 ن

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$	2	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	2

5 تعيين احداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات:

• مع محور الفواصل: 0.5 ن

معناه $y=0$ معناه $f(x)=0$ معناه $\dfrac{2x+2}{x+2}=0$ معناه $2x+2=0$ معناه $2x=-2$ أي $x=-\dfrac{2}{2}=-1$.

وبالتالي المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطة A حيث: $A(-1;0)$.

• مع محور التراتيب: 0.5 ن

معناه $x=0$ أي نحسب: $f(0)$ ومنه: $f(0)=\dfrac{2(0)+2}{(0)+2}=\dfrac{2}{2}=1$

وبالتالي المنحنى (C_f) يقطع محور التراتيب في النقطة B حيث: $B(0;1)$.


6 كتابة معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0: 0.5 ن

$(T): f'(0)(x-0)+f(0)$ تكافئ $(T): \dfrac{1}{2}x+1$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

7 إنشاء المماس (T) 0.5 ن والمنحنى (C_f): 0.5 ن



8 مناقشة تبعا لقيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $f(x) = m$ 0.5 ن

- من أجل $m \in]-\infty;2[\cup]2;+\infty[$ يوجد حل وحيد.
- من أجل $m = 2$ لا يوجد حلول.

إنتهى تصحيح المـوضـوع الثاني

