
najah213.com · نجاح 213



سنة ثانية ثانوي

الشعب:

علوم تجريبية | رياضيات | تقني رياضي

تقويم تشخيصي 01

[مع حل مقترح]

إعداد الأستاذ:

عبدة أحمد

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com


najah213.com · نجاح 213

تقويم تشخيصي 01

من إعداد الأستاذ عبدة أحمد

التمرين الأول

لتكن الدالتين f و g المعرفتين على المجال $[-1,4]$ بتمثيليهما البيانيين (C_f) و (C_g).



1) عين $f(0)$, $f(1)$, $f(3)$, $g(0)$, $g(1)$, $g(3)$, $g(-1)$ و $g(2)$

2) عين إتجاه تغير الدالة g على المجال $[-1,3]$ ثم شكل جدول تغيراتها

3) حدد القيمتين العضمى و الصغرى للدالة g على المجال $[-1,3]$

4) شكل جدول إشارة الدالة g على المجال $[-1,3]$

5) حدد وضعية (C_f) بالنسبة إلى (C_g) على المجال $[-1,3]$

6) استنتج حلول المتراجحة $g(x) \leq f(x)$

7) ماهو عدد حلول المعادلة $g(x) = 0$ ؟

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثاني

I. لتكن f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x)=x^2-4x+3$ ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس.

1. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $f(x)=(x-2)^2$

2. أعط طريقة لرسم (C_f) إنطلاقا من تمثيل بياني لدالة مألوفة، ثم أرسمه

3. حل، بيانيا المعادلة $f(x)=3$ ثم استنتج حلول المتراجحة $f(x)>3$ ذات المجهول الحقيقي x

II. 1. أجب بصحيح أو خطأ مع تعليل الإجابة في كل حالة:

2. الجدول الآتي يمثل جدولا لقيم دالة مقلوب

x	1	$\sqrt{2}$	$1+\sqrt{3}$	10^{-2017}
f(x)	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{1}-\frac{1}{2}$	10^{2017}

3. التمثيل البياني للدالة $f(x)=\frac{2x-1}{x-1}$ هو صورة التمثيل البياني للدالة مقلوب بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(2,1)$

التمرين الثالث

I. 1. علم على الدائرة المثلثية، الأعداد A, B و C صور الأعداد $-\frac{197\pi}{4}$, $\frac{304\pi}{3}$ و $\frac{2017\pi}{6}$ على الترتيب

2. عين جيب (sin) و جيب تمام (cos) الأعداد الحقيقية السابقة

II. 1. ليكن x عددا حقيقيا من المجال $[\pi,\frac{3\pi}{2}]$ حيث: $cosx=-\frac{1+\sqrt{2}}{4}$.
أحسب $sinx$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2. عين ثلاث أعداد حقيقية تحقق:

ا) $cosx = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

ب) $sinx = -\frac{1}{2}$

3. أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $(1 + sinx + cosx)^2 = 2(1 + cosx)(1 + sinx)$

من إعداد الأستاذ: عبدة أحمد

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

حل التمرين الأول

1) تعيين: $f(0)=0$ $f(1)=-2$ $f(3)=0$ $g(0)=0$ $g(1)=-2$ $g(3)=0$
$g(-1)=-4$ $g(2)=-4$

2) إتجاه تغير الدالة g على المجال $[-1,3]$:

- الدالة g متزايدة على المجال $[-1,0]\cup[2,4]$
- الدالة g متناقصة على المجال $[0,2]$

جدول التغيرات:

x	-1		0		2		3
$g(x)$	-4	↗	0	↘	-4	↗	0

3) • القيمة الحدية الصغرى هي -4 عند $x=2$
• القيمة الحدية العظمى هي 0 عند $x=0$

4) جدول إشارة الدالة g على المجال $[-1,3]$:

x	-1		0		3
$g(x)$		$-$	0	$-$	0

5) وضعية (C_f) بالنسبة إلى (C_g) على المجال $[-1,3]$:

- على المجال $[-1,0[\cup]1,3]$, (C_f) فوق (C_g)
- على المجال $]0,1[$, (C_f) تحت (C_g)
- عند القيمتين $x=0$ و $x=1$, (C_f) يقطع (C_g)

6) استنتاج حلول المتراجحة $g(x)\leq f(x)$:
$S=[-1,0]\cup[1,3]$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


7) عدد حلول المعادلة $g(x) = 0$:
للمعادلة حلان: $x = 0$ و $x = 3$

حل التمرين الثاني

I. $f(x) = x^2 - 4x + 3$
$D_f = \mathbb{R}$

1. التحقق ان: $f(x) = (x-2)^2 - 1$
$f(x) = (x-2)^2 - 1$
$= x^2 + 4 - (x)(2) - 1$
$f(x) = x^2 - 4x + 3$

2. طريقة رسم (C_f) إنطلاقا من منحنى دالة مألوفة:
منحنى الدالة f هو صورة منحنى الدالة مربع بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(-b,k)$ أي $\vec{v}(2,-1)$
الرسم:



3. حل بيانيا:
❄ حلول هذه المعادلة:

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$$f(x) = 3$$

ومنه:

$$x = 0$$

و

$$x = 4$$

❄ حلول هذه المتراجحة:

$$f(x) > 3$$

$$x \in]-\infty, 0[\cup]4, +\infty[$$

II. الإجابة بصحيح أو خطأ مع تعليل الإجابة في كل حالة :

1. الجدول الآتي يمثل جدولا لقيم دالة مقلوب . صحيح، لأن:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(1) = 1$$

$$f(\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$f(10^{-2017}) = \frac{1}{10^{-2017}} = 10^{2017}$$

$$f(1+\sqrt{3}) = \frac{1}{1+\sqrt{3}} \times \frac{1-\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}} = \frac{1-\sqrt{3}}{-2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}$$

2. التمثيل البياني للدالة $f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$ هو صورة التمثيل البياني للدالة مقلوب بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(2,1)$. خطأ، لأن:
صورة الدالة مقلوب بالإنسحاب $\vec{u}(2,1)$ هي:

$$f(x) = \frac{1}{x-2} + 1 = \frac{1+x-2}{x-2} = \frac{x-1}{x-2}$$

حل التمرين الثالث

I. 1. تعليم النقاط على الدائرة:

$$-\frac{197\pi}{4} = -\frac{(49\times4+1)\pi}{4} = -49\pi - \frac{\pi}{4} + \pi - \pi$$

$$= (-\frac{\pi}{4} + \pi) - 50\pi$$

$$= \frac{3\pi}{4} + 2\pi(-25)$$


$$\frac{304\pi}{3} = \frac{(101\times3+1)\pi}{3}$$

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

$$= 101\pi + \frac{\pi}{3} + \pi - \pi = (\frac{\pi}{3} - \pi) + 102\pi$$
$$= \frac{-2\pi}{3} + 2\pi(51)$$

$$\frac{2017\pi}{6} = \frac{(336\times6+1)\pi}{6}$$
$$= 336\pi + \frac{\pi}{6}$$
$$= \frac{\pi}{6} + 2\pi(168)$$



2. تعيين جيب و حيب تمام كلا من الأعداد السابقة:

$$cos(\frac{304\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$sin(\frac{304\pi}{3}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$cos(\frac{304\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$$
$$sin(\frac{304\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$cos(\frac{2017\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$sin(\frac{2017\pi}{6}) = \frac{1}{2}$$

II. 1. حساب $sinx$:

$$cos^2x + sin^2x = 1$$
$$(\frac{-1+\sqrt{2}}{4})^2 + sin^2x = 1$$
$$sin^2x = 1 - \frac{(1+\sqrt{2})^2}{16}$$
$$sin^2x = \frac{16-1-2-2\sqrt{2}}{16}$$

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$$sin^2x = \frac{13-2\sqrt{2}}{16}$$

مقبول $sin = \longrightarrow \frac{13-2\sqrt{2}}{16}$

مرفوض $\searrow -\frac{13-2\sqrt{2}}{16}$

على المجال $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$: $sin = \frac{13-2\sqrt{2}}{16}$

2. تعيين ثلاث أعداد حقيقية تحقق: $(cosx, sinx) = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$

$$x = -\frac{\pi}{6}$$
$$x = \frac{11\pi}{6}$$
$$x = \frac{23\pi}{6}$$

3. إثبات أن: $(1+sinx+cosx)^2 = 2(1+cosx)(1+sinx)$

$$(1+sinx+cosx)^2 = (1+sinx)^2 + cos^2x + 2(1+sinx)cosx$$
$$= 1 + sin^2x + 2sinx + cos^2x + 2cosx + 2cosxsinx$$
$$= 1 + cos^2x + sin^2x + 2cosx + 2sinx + 2cosxsinx$$
$$= 2(1 + cosx + sinx + cosxsinx)$$
$$2(1+cosx)(1+sinx) = 2(1+cosx+sinx+cosxsinx)$$

ومنه العلاقة مبرهنة

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com