najah213.com · نجاح 213

ثانوية عبد الحق بن حمودة – سبرات – مستغانم

السنة الدراسية : 2018/2017

المستوى: 2 ع.ت(2,1)

المدة: ساعتان $\lim\limits_{x \to 1} x$

الفرض الأول للفصل الثاني

التمرين الأول:

I. ليكن X المتغير العشوائي المحدد بالجدول التالي:

X	-4	-3	1	3	4
$P(X=x)$	0.25	a	b	0.05	0.25

- جد a و b إذا علمت أن : $E(X)=0$

II. يحتوي كيس على خمس كرات حمراء و ثلاث كرات خضراء و كرتين بيضاء غير متمايزة عند اللمس.

نسحب عشوائيا كرتين على التوالي دون إرجاع و نعتبر أن كل الكرات لها نفس الاحتمال .

1) مثل الوضعية بواسطة شجرة الاحتمالات .

2) أحسب احتمال الحصول على :

أ) A "كرتين من نفس اللون " .

ب) B "كرة خضراء في السحب الأول " .

3) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب لكرتين بيضاء.

أ) عين القيم الممكنة التي يأخذها المتغير العشوائي X و عرف قانون احتماله .

ب) أحسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ و الانحراف المعياري $\sigma(X)$.

التمرين الثاني:

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كمايلي : $f(x)=\dfrac{x^2-2x+5}{x-1}$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$

1. أحسب النهايات للدالة f عند أطراف مجموعة التعريف D_f ثم فسر النتائج هندسيا.
2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$: $f(x)=x-1+\dfrac{4}{x-1}$.
3. بين أن : $f'(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$ ، استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .
4. أثبت أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (D) .
5. بين أن $f(x)+f(2-x)=0$، ماذا تستنتج؟
6. أنشئ (D) و (C_f) .

أستاذ المادة: فغلول

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تصحيح الفرض الأول للفصل الثاني

التمرين الأول :

I. إيجاد a و b :

نعلم أن $\sum_{i=1}^{5} P_i = 1$ أي : $0.25 + a + b + 0.05 + 0.25 = 1$

و منه : $a + b = 0.45 \ldots\ldots\ldots (1)$

وكذلك $E(X) = 0$ أي :

$(-4 \times 0.25) + (-3 \times a) + (b \times 1) + (3 \times 0.05) + (4 \times 0.25) = 0$

$-3a + b = -0.15 \ldots\ldots\ldots (2)$


من (1) و (2) نجد : $a = 0.15$ و $b = 0.30$

II.

شجرة الاحتمالات: نرمز بـ:

B للكرة البيضاء ، V للكرة الخضراء ، R للكرة الحمراء .

1) شجرة الاحتمالات :



2) حساب احتمال:

أ) A "كرتين من نفس اللون"

الحدث A هو : VV أو BB أو RR :

$$P(A) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{2}{10} \times \frac{1}{9} + \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{28}{90}$$

ب) B "كرة خضراء في السحب الأول"

الحدث B هو : VV أو VB أو VR :

$$P(B) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{27}{90}$$

3) أ) تعيين القيم الممكنة التي يأخذها المتغير العشوائي X و تعريف قانون احتماله .

المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب لكرتين بيضاء إذن ممكن أن نسحب كرتين أو كرة واحدة أو لا نسحب أي كرة بيضاء.

أ) القيم التي يأخذها X هي : $0، 1، 2$

قانون احتمال X لدينا :

$$P(X=0) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{5}{9} + \frac{5}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{56}{90}$$

$$P(X=1) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{2}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{2}{10} \times \frac{5}{9} + \frac{5}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{32}{90}$$

$$P(X=2) = \frac{2}{10} \times \frac{1}{9} = \frac{2}{90}$$

نلخص النتائج في الجدول التالي :

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{56}{90}$	$\frac{32}{90}$	$\frac{2}{90}$

ب) حساب الأمل الرياضياتي $E(X)$ و الانحراف المعياري للمتغير العشوائي $\sigma(X)$

$$E(X) = 0 \times \frac{56}{90} + 1 \times \frac{32}{90} + 2 \times \frac{2}{90}$$

$$E(X) = 0.4$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الانحراف المعياري:

أولا نحسب التباين $V(X)$:

$$V(X)=\sum_{i=1}^{3}(x_i-E(X))^2 p_i$$

$$V(X)=(0-0.4)^2\frac{56}{90}+(1-0.4)^2\frac{32}{90}+(2-0.4)^2\frac{2}{90}$$

$$V(X)\simeq 0.284$$

إذن الانحراف المعياري هو :

$$\sigma(X)=\sqrt{V(x)}=\sqrt{0.284}=0.53$$

$$\sigma(X)\simeq 0.53$$

التمرين الثاني:

مجموعة تعريف الدالة f: $D_f=]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$

1. حساب النهايات:

نهايات الدالة f عند $+\infty$ ، $-\infty$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x}=\lim_{x\to-\infty} x=-\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x}=\lim_{x\to+\infty} x=+\infty$$

نهايات الدالة f عند 1 بقيم أكبر و أصغر منه :

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x)=\frac{4}{0^+}=+\infty$$

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x)=\frac{4}{0^-}=-\infty$$

التفسير الهندسي :

المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب موازي لمحور التراتيب معادلته $x=1$.

2. تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x\neq 1$:

$$f(x)=x-1+\frac{4}{x-1}$$

$$x-1+\frac{4}{x-1}=\frac{(x-1)(x-1)+4}{x-1}$$

$$=\frac{x^2-2x+1+4}{x-1}=\frac{x^2-2x+5}{x-1}=f(x)$$

3. تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x\neq 1$:

$$f'(x)=\frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$$

الدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{1\}$:

$$f'(x)=\frac{(2x-2)(x-1)-1\times(x^2-2x+5)}{(x-1)^2}$$

$$=\frac{2x^2-4x+2-x^2+2x-5}{(x-1)^2}=\frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$$

استنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها:

إشارة $f'(x)$ من نفس اشارة البسط x^2-2x-3

ثلاثي حدود من الدرجة الثانية مميزه $\Delta=16$ يقبل جذرين $x'=3$ و $x''=-1$

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

الدالة f متزايدة تماما على المجالين $]-\infty,-1]$ و $[3,+\infty[$

ومتناقصة تماما على المجالين $[1,3]$ و $[-1,1[$.

جدول التغيرات

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	$+$	-4	$-$	‖	$+\infty$	$-$	4	$+\infty$

4. إثبات أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ثم دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (D).

$$\lim_{x\to-\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{4}{x-1}=0$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{4}{x-1}=0$$

ومنه المستقيم (D) مقارب مائل لـ (C_f).

دراسة الوضعية النسبية لـ (C_f) و (D) :

ندرس إشارة الفرق: $f(x)-(x-1)=\frac{4}{x-1}$

إشارة الفرق من إشارة $x-1$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)-y$		$-$	‖	$+$	
	(D) تحت (C_f)			(D) فوق (C_f)	

5. تبيين أن $f(2-x)+f(x)=0$

$$f(2-x)=2-x-1+\frac{4}{2-x-1}=-x+1+\frac{4}{-x+1}=-x+1-\frac{4}{x-1}$$

$$f(2-x)+f(x)=-x+1-\frac{4}{x-1}+x-1+\frac{4}{x-1}=0$$

نلاحظ أن :

$$f(2(a)-x)+f(x)=2\times b$$
$$f(2(1)-x)+f(x)=2\times 0$$

ومنه نستنتج أن النقطة $\Omega(1;0)$ مركز تناظر المنحنى (C_f).

6. إنشاء (D) و (C_f)

