najah213.com · نجاح 213

مديرية التربية لولاية الجلفة — متوسطة : المجاهد زرقاوي غانم - بحاسي فدول -

مستوى : ثالثة متوسط (3 م 1 , 2 , 3 - فوج 01 -) — المدة الممنوحة : 90 دقيقة

الفرض المحروس للفصل الثاني في مادة الرياضيات.

السنة الدراسية : 2020-2021 — تاريخ اجتياز الفرض : 04 ماي 2021

◄ ملاحظتان مهمتان ! • يُسمح باستعمال الآلة الحاسبة العلمية غير المبرمجة.
• يكتب بخط واضح ومقروء على ورقة التحرير اسم ونسب المترشح (ة) بالحروف العربية.

التمرين الأوّل : (08 نقاط)

■ عزيزي النجيب، تأمل قليلاً في المعادلة $(\mathcal{E}_t)$ المعرّفة على الصيغة التالية :

$$(\mathcal{E}_t) \qquad 3t-4=-2t+26$$

. حسب معلوماتك السابقة، حُل المعادلة $(\mathcal{E}_t)$، مع توضيح طريقة حلك بالتفصيل.


■ يرمز x إلى عددٍ صحيح.
. نعتزم إثبات أنّ :

$$(\mathcal{E}_x) \qquad (3x-4)(2x+3)=(3x-2)(x+6)+3x(x-5)$$

1. أُنشر وبسّط العبارة $\mathcal{A}=(3x-4)(2x+3)$.
2. أُنشر وبسّط العبارة $\mathcal{B}=(3x-2)(x+6)+3x(x-5)$.
3. أُحسب قيمة العبارة $\mathcal{A}$ من أجل $x=-1$، مرّة باستعمال العبارة الأصلية ومرّة أخرى باستعمال العبارة المبسّطة.
. ماذا تُلاحظ؟.
4. تحقّق من أنّ ناتجي $\mathcal{A}$ و $\mathcal{B}$ متساويان.

التمرين الثاني : (08 نقاط)

■ $\mathcal{ABC}$ مثلث قائم الزاوية في $\mathcal{A}$ حيث :
$\mathcal{AB}=12cm$ ، $\mathcal{AC}=3cm$ و $\mathcal{AL}=2cm$.



تأمّل الرسم المقابل (الرسم غير مرسوم بالأطوال الحقيقية)، ثم أجب على الأسئلة الموالية :
1. أُحسب طول الضلع $[\mathcal{LK}]$.
2. أُحسب قيمة مقرّبة إلى الجزء من المائة لطول الضلع $[\mathcal{BC}]$.
3. أُحسب قيمة مقرّبة إلى الجزء من المائة لقيس الزاوية $\widehat{\mathcal{B}}$.
4. بطريقتين مختلفتين، أعط قيمة مقرّبة إلى $0,01$ لقيس الزاوية $\widehat{\mathcal{C}}$.

التمرين الثالث : (04 نقاط)

■ عُمْر أب هو 64 سنة و عُمْر ابنه 18 سنة.
. بعد كم سنة يُصبح عُمْر الأب ثلاث أمثال عُمْر ابنه؟.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الرابع : **(05 نقاط إضافية)**

⌣ تنبيه!!! على الممتحن أن يعالج مشكلا واحدا فقط ⌣

◄ المشكل الأوّل :

⊡ ليكن ABC مثلّثاً قائم الزّاوية في A و H المسقط العمودي للنّقطة A على المستقيم (BC).

1. إذا علمت أنّ $BC = BH + HC$. أثبت العلاقة التالية، $BC^2 = (BH^2 + HC^2 + 2BH \times HC)$.

2. برهن صحة المساويتين التاليتين : $BH^2 = AB^2 - AH^2$ و $CH^2 = AC^2 - AH^2$.

3. حسب ما سبق، استنتج المساواة الموالية : $AH^2 = HB \times HC$.

◄ المشكل الثاني :

⊡ لدينا قطعتيْ مستقيم $[OE]$ و $[OF]$ طولهما على التّوالي α و β حيث : α و β عددين طبيعيين غير معدومين.

. اقترح طريقة رياضيّة لرسم قطعة مستقيم طولها $\sqrt{\alpha\beta}$.

◄ المشكل الثالث :

⊡ ABC مثلث قائم الزاوية في A، سنشير بالرمز التالي S_{ABC} إلى مساحة المثلث ABC.

1. أثبت صحة العلاقة التالية : $S_{ABC} < \dfrac{BC^2}{4}$.

2. متى تحدث المساواة؟ (أقصد صحة العلاقة : $S_{ABC} = \dfrac{BC^2}{4}$).

◄ المشكل الرابع :

⊡ في متجر لبيع باقات الزهور، تم في الصباح بيع $\frac{2}{3}$ من مجموع الباقات المتوفرة، ثم بيعت بعد الزوال $\frac{1}{2}$ من ما تبقى.

⊡ إذا علمت أنّ 337 باقات لم تبع.

. أوجد العدد الأصلي للباقات.

◄ المشكل الخامس :

⊡ خصّص معمل أدوية **12** عبوة لتعبئة إنتاجها من أقراص معالجة مرض السكري.

قالت العاملة :

" . جرّبتُ تعبئة الأقراص في 10 عبوات، فزاد 15 قرصاً.

. لملء جميع العبوات ينقص 35 قرصاً".

1. أصحيح أنّ سعة العبوة هي **20** قرصاً؟ **30** قرصاً؟.

⊡ يرمز x إلى سعة العبوة الواحدة.

2. عبّر بطريقتين مختلفتين عن عدد الأقراص التي أنتجها المعمل.

3. أُكتب المعادلة التي تعبّر عن مضمون نص المسألة ثم حلها.

4. ما سعة كل عبوة من العبوات المخصّصة لتلك الأقراص؟.

5. ما عدد الأقراص التي أنتجها المعمل.

***** أستاذكـم جيوخ العربي يتمنى لكم النجاح والتوفيق *****

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التصحيح التفصيلي للفرض المحروس للفصل الثاني مادة الرياضيات.

حل التمرين الأوّل : (08 نقاط)

حل المعادلة $(\mathcal{E}_t)$ بالتفصيل :

قبل أن نتطرق في حل هذا السؤال، نُذكّر بكيفية حل معادلة من الدرجة الأولى وبمجهول واحد.
لهذا الغرض، نتبّع المراحل التالية :

- نقل كل الحدود التي تشمل المجهول t في الطرف الأيسر للمعادلة.
- نقل كل الحدود التي لا تتضمن المجهول t في الطرف الأيمن للمعادلة.
- حساب قيمة المجهول t.

لدينا : $3t-4=-2t+26$ بإضافة $2t$ إلى طرفي المعادلة $(\mathcal{E}_t)$ فنتحصّل على ما يلي : $\underbrace{3t+2t}_{=5t}-4=\underbrace{-2t+2t}_{=0}+26$

وهذا ما يُكافئ العلاقة : $5t-4=+26$ ولنضيف $+4$ لطرفي العلاقة الاخيرة، فنجد : $5t\underbrace{-4+4}_{=0}=\underbrace{+26+4}_{=30}$

وعليه : $5t=30$ أي : $\frac{5t}{5}=\frac{30}{5}$ وأخيراً نتحصّل على أنّ : $t=6$.

1. نشر وتبسيط العبارة $\mathcal{A}=(3x-4)(2x+3)$:

- ننشر ونبسّط الجداءات ثمّ نبسّط المجموع الجبري.
- نرتّب عبارة المجموع حسب قوى x تنازلياً.

$$\mathcal{A}=(3x-4)(2x+3)$$
$$\mathcal{A}=3x(2x+3)-4(2x+3)$$
$$\mathcal{A}=3x\times 2x+3x\times 3-4\times 2x-4\times 3$$
$$\mathcal{A}=6x^2+\underbrace{9x-8x}_{(9-8)x=x}-12$$
$$\mathcal{A}=6x^2+x-12$$

2. نشر وتبسيط العبارة $\mathcal{B}=(3x-2)(x+6)+3x(x-5)$:

نطبّق الخاصيّة التوزيعية ونبسّط الجداءات ثمّ نبسّط المجهول الجبري.

$$\mathcal{B}=3x(x+6)-2(x+6)+3x(x-5)$$
$$\mathcal{B}=3x\times x+3x\times 6-2x-2\times 6+3x\times x-3x\times 5$$
$$\mathcal{B}=3x^2+18x-2x-12+3x^2-15x$$
$$\mathcal{B}=(3+3)x^2+(18-2-15)x-12$$
$$\mathcal{B}=6x^2+x-12$$

3. حساب قيمة العبارة $\mathcal{A}$ وهذا من أجل $x=-1$:

- باستعمال العبارة الأصلية :

نعوّض x بالعدد -1 في العلاقة $\mathcal{A}=(3x-4)(2x+3)$ ، فنجد :

$$\mathcal{A}=(3\times(-1)-4)(2\times(-1)+3)=-7\times 1=-7$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

. باستعمال العبارة المبسّطة :

نعوّض x بالعدد -1 في العلاقة $6x^2+x-12$ فنجد : $6-1^2-1-12=6-1-12=-7$.

نلاحظ أنّ من أجل $x=-1$ فإنّ للعبارتين نفس القيمة، ومنه أن يكونا متساويين.

4. التحقّق من أنّ ناتجي $\mathcal{A}$ و $\mathcal{B}$ متساويان :

حسب ما فات، لدينا : $\mathcal{A}=6x^2+x-12$ و $\mathcal{B}=6x^2+x-12$ من هذا يُمكن الحكم على أنّ : $\mathcal{A}=\mathcal{B}$.

حل التمرين الثاني : (08 نقاط)

1. حساب طول الضلع $[\mathcal{LK}]$

$\mathcal{ABC}$ مثلث فيه. $\mathcal{L}\in(\mathcal{AB})$ و $\mathcal{K}\in(\mathcal{BC})$ و $(\mathcal{AC})//(\mathcal{LK})$.

إذن حسب نظرية طالس :

$$\frac{\mathcal{BL}}{\mathcal{BA}}=\frac{\mathcal{BK}}{\mathcal{BC}}=\frac{\mathcal{LK}}{\mathcal{AC}}$$

بالتعويض : $\frac{10}{12}=\frac{\mathcal{LK}}{3}$ ومنه نجد أنّ : $\mathcal{LK}=\frac{10\times 3}{12}$ إذن : $\mathcal{LK}=2,5cm$.

2. حساب الطول $\mathcal{BC}$:

♢ بما أنّ : $\mathcal{ABC}$ مثلث قائم في $\mathcal{A}$، حسب خاصيّة فيثاغورس، نجد :

$$\mathcal{BC}^2=\mathcal{AB}^2+\mathcal{AC}^2$$
$$\mathcal{BC}^2=12^2+3^2$$
$$\mathcal{BC}^2=144+9$$
$$\mathcal{BC}^2=153$$
$$\sqrt{\mathcal{BC}^2}=\mathcal{BC}=\sqrt{153}$$
$$\mathcal{BC}\simeq 12,37$$

إذن : $\mathcal{BC}=\sqrt{153}\simeq 12,37cm$.

3. حساب قيس الزاوية $\widehat{\mathcal{B}}$:

بما أنّ المثلث $\mathcal{ABC}$ قائم في $\mathcal{A}$. ونعلم أيضاً : **جيب تمام زاوية حادّة = طول الضلع المجاور لهذه الزاوية ÷ طول الوتـر.**

بمعنى آخر :

$$cos\widehat{\mathcal{B}}=\frac{\mathcal{AB}}{\mathcal{BC}}$$
$$cos\widehat{\mathcal{B}}=\frac{12}{\sqrt{153}}$$
$$cos\widehat{\mathcal{B}}=0,9701425$$

باستعمال الآلة الحاسبة (**عزيزي الحاذق تأكد بأنّ الآلة الحاسبة الخاصّة بك على الوضع DEG**).

الآن، نجد : $\mathcal{B}\simeq 14,04°$.

4. بطريقتين مختلفتين، حساب قيس الزاوية $\widehat{\mathcal{C}}$:

◄ طريقة أولى :

تذكير مهم : سبق لك أن لاحظت أنّ : " مجموع أقياس الزوايا الداخلية لمثلث هو $180°$ ".

وعليه : $\widehat{\mathcal{A}}+\widehat{\mathcal{B}}+\widehat{\mathcal{C}}=180°$ وبالتالي : $\widehat{\mathcal{C}}=180°-\widehat{\mathcal{A}}-\widehat{\mathcal{B}}$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

حسب ما فات، نجد أنّ : $\widehat{\mathcal{C}} = 180° - 90° - 14,04° = 75,96°$. وأخيراً ... نجد : $\widehat{\mathcal{C}} = 75,96°$.

◄ طريقة ثانية :

بما أنّ المثلث $\mathcal{ABC}$ قائم الزاوية في $\mathcal{A}$، وعليه :

$$cos\widehat{\mathcal{C}} = \frac{\mathcal{AC}}{\mathcal{BC}}$$
$$cos\widehat{\mathcal{C}} = \frac{3}{\sqrt{153}}$$
$$cos\widehat{\mathcal{C}} \simeq 0,242535625$$

باستعمال الآلة الحاسبة، نجد القيمة التقريبية للزاوية $\widehat{\mathcal{C}}$. إذن : $\widehat{\mathcal{C}} = 75,96°$.

حل التمرين الثالث : (04 نقاط)

نفرض أن عدد السنوات هو x يُصبح عُمْر الأب $x + 64$ وعُمْر ابنه $x + 18$، بعد ترجمة معطيات نص التمرين، فنتحصّل المعادلة الموالية :

$$x + 64 = 3(x + 18)$$
$$x + 64 = 3x + 54$$
$$64 - 54 = 3x - x$$
$$10 = 2x$$
$$\frac{10}{2} = \frac{2x}{2}$$
$$5 = x$$

عدد السنوات هو : 5.

حل التمرين الرابع : (05 نقاط إضافية)

◄ حل المشكل الأوّل :

1. إثبات العلاقة $\mathcal{BC}^2 = (\mathcal{BH}^2 + \mathcal{HC}^2 + 2\mathcal{BH} \times \mathcal{HC})$:


عملاً بمعطيات نص المشكل الأوّل، فنجد أنّ : $\mathcal{BC} = \mathcal{BH} + \mathcal{HC}$. بالتربيع طرفي العلاقة السابقة، فنتحصّل على $\mathcal{BC}^2 = (\mathcal{BH} + \mathcal{HC})^2$ وهذا ما يعني أنّ : $\mathcal{BC}^2 = \mathcal{BH}^2 + 2\mathcal{BH} \times \mathcal{HC} + \mathcal{HC}^2$.

2. برهان صحة المساويتين $\mathcal{BH}^2 = \mathcal{AB}^2 - \mathcal{AH}^2$ و $\mathcal{CH}^2 = \mathcal{AC}^2 - \mathcal{AH}^2$:

يتضّح من معطيات نص المشكل، أنّ $\mathcal{AHB}$ مثلث قائم الزاوية في $\mathcal{H}$. من هذا يمكّننا أنْ نطبّق خاصيّة فيتاغورس المباشرة على المثلث $\mathcal{AHB}$. إذن : $\mathcal{AB}^2 = \mathcal{AH}^2 + \mathcal{HB}^2$ ومنه : $\mathcal{HB}^2 = \mathcal{AB}^2 - \mathcal{AH}^2$.

بما أنّ $\mathcal{AHC}$ مثلث قائم الزاوية في $\mathcal{H}$. من هذا يمكّننا أنْ نطبّق خاصيّة فيتاغورس المباشرة على المثلث $\mathcal{AHC}$.

إذن : $\mathcal{AC}^2 = \mathcal{AH}^2 + \mathcal{HC}^2$ ومنه : $\mathcal{HC}^2 = \mathcal{AC}^2 - \mathcal{AH}^2$.



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3. استنتاج المساواة $\mathcal{AH}^2 = \mathcal{HB} \times \mathcal{HC}$:

حسب ما سبق، لدينا العلاقات التالية

$\mathcal{BC}^2 = \mathcal{BH}^2 + 2\mathcal{BH} \times \mathcal{HC} + \mathcal{HC}^2$ و $\mathcal{HB}^2 = \mathcal{AB}^2 - \mathcal{AH}^2$ و $\mathcal{HC}^2 = \mathcal{AC}^2 - \mathcal{AH}^2$ ومنه :

$$\mathcal{BC}^2 = \mathcal{BH}^2 + 2\mathcal{BH} \times \mathcal{HC} + \mathcal{HC}^2$$

$$\mathcal{BC}^2 = (\mathcal{AB}^2 - \mathcal{AH}^2) + 2\mathcal{BH} \times \mathcal{HC} + (\mathcal{AC}^2 - \mathcal{AH}^2)$$

$$\mathcal{BC}^2 = \mathcal{AB}^2 + \mathcal{AC}^2 - 2\mathcal{AH}^2 + 2\mathcal{HB} \times \mathcal{HC}$$

ولوْ تأملنا قليلاً -ولدي الحبيب- في المثلث $\mathcal{ABC}$ فنجده مثلثاً قائماً في $\mathcal{A}$ (**من المعطيات**) وبعد تطبيق خاصيّة فيتاغورس المباشرة عليه، فنجد العلاقة $\mathcal{BC}^2 = \mathcal{AB}^2 + \mathcal{AC}^2$ وعليه : $\mathcal{BC}^2 = \mathcal{BC}^2 - 2\mathcal{AH}^2 + 2\mathcal{HB} \times \mathcal{HC}$

وهذا ما يلزم أنْ يكون : $2\mathcal{AH}^2 = 2\mathcal{HB} \times \mathcal{HC}$ وبعبارة أجملْ وأرْوع : $\mathcal{AH}^2 = \mathcal{HB} \times \mathcal{HC}$.

◄ حل المشكل الثاني :

1. اقتراح طريقة رياضية لإنشاء قطعة مستقيم طولها $\sqrt{\alpha\beta}$:

نعتبر ثلاث نقاط $\mathcal{B}$ ، $\mathcal{C}$ و $\mathcal{H}$ على استقامية واحدة، بحيث : $\mathcal{HB} = \alpha$ و $\mathcal{HC} = \beta$.


$(\mathcal{C})$ الدّائرة التي قطرها $[\mathcal{BC}]$ و (Δ) المستقيم العمودي على $(\mathcal{BC})$ في النّقطة $\mathcal{H}$.

لتكن $\mathcal{A}$ إحدى نقطتي تقاطع (Δ) و $(\mathcal{C})$.

النّقطة $\mathcal{A}$ تنتمي إلى الدائرة $(\mathcal{C})$ التي قطرها $[\mathcal{BC}]$ والتّالي فإنّ المثلث $\mathcal{ABC}$ قائم الزاوية في $\mathcal{A}$.

لدينا (Δ) عمودي على $(\mathcal{BC})$ في النّقطة $\mathcal{H}$ وهذا يوحي أنّ $\mathcal{H}$ هي المسقط العمودي للنقطة $\mathcal{A}$ على $(\mathcal{BC})$.

وحسب **المشكل الأوّل** نجد أنّ $\mathcal{AH}^2 = \mathcal{HB} \times \mathcal{HC}$ وهذا ما يعني : $\mathcal{AH}^2 = \alpha\beta$ وعليه : $\mathcal{AH} = \sqrt{\alpha\beta}$.



◄ حل المشكل الثالث :

1. إثبات صحة العلاقة $\mathcal{S}_{\mathcal{ABC}} < \frac{\mathcal{BC}^2}{4}$:

تذكير مهم : مساحة المثلث = (القاعدة × الارتفاع) ÷ 2.

من خلال التذكير السابق، نجد أنّ $\mathcal{S}_{\mathcal{ABC}} = \frac{\mathcal{AB} \times \mathcal{AC}}{2}$ (تذكّر -عزيزي الشطور- أنّ $\mathcal{ABC}$ مثلث قائم في $\mathcal{A}$). إذن :

$$2\mathcal{S}_{\mathcal{ABC}} = \mathcal{AB} \times \mathcal{AC} \qquad (1)$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

هذا من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية، لدينا : ABC مثلث قائم الزاوية في A إذن حسب خاصية فيتاغورس المباشرة، لدينا العلاقة الموالية $BC^2 = AB^2 + AC^2$ وعليه : $BC^2 - 2AB \times AC = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC$.
أيْ : $BC^2 - 2AB \times AC = (AB - AC)^2 > 0$ إذن : $BC^2 - 2AB \times AC > 0$ وهذا يُكافي العبارة (2) حيث :

$$BC^2 > 2AB \times AC \qquad (2)$$

نستنتج من خلال العبارتين (1) و (2) ما يلي : $BC^2 > 2 \times 2S_{ABC}$ أيْ : $BC^2 > 4S_{ABC}$.
وأخيراً نجد العبارة المرجوة $S_{ABC} < \dfrac{BC^2}{4}$.

2. متى تحدث المساواة $S_{ABC} = \dfrac{BC^2}{4}$ ؟ :

تحدث المساواة إذا تحقّق الشرط التالي $AB = AC$ وهذا يعني أنّ ABC مثلث قائم ومتساوي الساقين في A.

◄ حل المشكل الرابع :

لترييض مشكل يتطلب منا بالمرور على المراحل التالية :

- اختيار المجهول، وليكن على سبيل الحظ! α.
- ترجمة كل المعطيات الواردة في النص بدلالة α.
- إيجاد معادلة مناسبة تعبّر عن المشكل المطروح علينا.
- حل المعادلة المستخرجة.
- التصريح بالحل.
- التحقّق من صحة النتيجة بالعودة إلى نص المشكل.

. إيجاد العدد الأصلي للباقات :

ليكن α : هو العدد الأصلي للباقات.
$\frac{2}{3}\alpha$: عدد الباقات التي بيعت في الفترة الصباحية.
$\frac{1}{3}\alpha$: عدد الباقات المتبقية من الفترة الصباحية.
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\alpha = \frac{1}{6}\alpha$: عدد الباقات التي بيعت بعد الزوال.
337 : عدد الباقات التي لمْ تبع.

⊡ صياغة المعادلة :

$\frac{2}{3}\alpha + \frac{1}{6}\alpha + 337 = \alpha$.

⊡ حل المعادلة :

لدينا : $\frac{2}{3}\alpha + \frac{1}{6}\alpha + 337 = \alpha$ نقوم بتوحيد المقامات للكسرين $\frac{2}{3}\alpha$ و $\frac{1}{6}\alpha$ إذن : $\frac{4}{6}\alpha + \frac{1}{6}\alpha + 337 = \alpha$
ومنع : $337 = \alpha - \frac{5}{6}\alpha$ وبالتالي : $337 = \frac{6-5}{6}\alpha = \frac{1}{6}\alpha$.
إذن : $\alpha = 2022$. العدد الأصلي للباقات هو : 2022 باقة.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

◄ حل المشكل الخامس :

1. أصحيح أنّ سعة العبوة هي 20 قرصاً؟ 30 قرصاً؟ :

. لنفترض أنّ سعة العبوة 20 قرصاً.

◄ في الحالة الأولى عدد الأقراص هي : $20 \times 10 + 15 = 215$ قرصاً.

◄ في الحالة الثانية عدد الأقراص هي : $20 \times 12 - 35 = 205$ قرصاً.

عدد الأقراص اختلف في الحالتين، وهذا ما يعني أنّ عدد الأقراص ليس 20 قرصاً.

■ **بأسلوب مماثل لنثبت أنّ عدد الأقراص ليس 30 قرصاً.**

. لنفترض أنّ سعة العبوة 30 قرصاً.

◄ في الحالة الأولى عدد الأقراص هي : $30 \times 10 + 15 = 315$ قرصاً.

◄ في الحالة الثانية عدد الأقراص هي : $30 \times 12 - 35 = 325$ قرصاً.

عدد الأقراص اختلف في الحالتين، وهذا ما يعني أنّ عدد الأقراص ليس 30 قرصاً.

2. التعبّير بطريقتين مختلفتين عن عدد الأقراص التي أنتجها المعمل :

. **طريقة أولى :** $10x + 15$. **طريقة ثانية :** $12x - 35$. (حيث x : سعة العبوة الواحدة.)

3. كتابة المعادلة التي تعبّر عن مضمون نص المسألة، وحلها :

تظهر جليّاً المعادلة التي تعبّر عن مضمون نص المشكل $10x + 15 = 12x - 35$.

حل المعادلة السابقة :

$$10x + 15 = 12x - 35$$

$$10x - 12x = -35 - 15$$

$$(10 - 12)x = -(35 + 15)$$

$$-2x = -50$$

$$x = 25$$

4. سعة كل عبوة من العبوات المخصّصة لتلك الأقراص :

سعة كل عبوة من العبوات المخصّصة لتلك الأقراص : 25 قرصاً.

5. عدد الأقراص التي أنتجها المعمل :

عدد الأقراص التي أنتجها المعمل : $25 \times 10 + 15 = 265$ قرصاً.

"انتهى حل هذا الفرض -بفضل الله تعالى-، ويليها التطبيقات الإضافية وهي جميلة جداً سنتركها للقارئ الحلو والحلول ستكون في صفحتنا عبر الفيسبوك -إن شاء الله-."

*****وفقنا الله وإيّاكـــــــــم*****

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com