najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية الوطنية لولاية باتنة

ثانوية: صلاح الدين الأيوبي، الإخوة العمراني، الطاهر بن فليس، الرائد مصطفى بوستة – تكوت، عبد المجيد عبد الصمد – المعذر، الإخوة قالة – منعة، ثانوية مروانة الجديدة، ثانوية عبد الرحمان بوشمال – عين توتة، ثانوية عمار زواكري – رأس العيون، – الإخوة يلوز وادي الطاقة.

الشعبة: تقني رياضي — دورة ماي 2023

الامتحان التجريبي في مادة: التكنولوجيا (هندسة الطرائق) — المدة: 4 سا 30د

الموضوع الأول

التمرين الأول: (7 نقاط)

I- M مونومير يدخل في تركيب البوليمير P ومن اجل الحصول عليه نجري سلسلة التفاعلات التالية :

1) $A + H_2 \xrightarrow{Pd} B$

2) $B + O_3 \xrightarrow{H_2O} C + H_3C-CH_2-\underset{H}{\overset{O}{\overset{\|}{\underset{|}{C}}}} + H_2O_2$

3) $C \xrightarrow[H_2O]{LiAlH_4} D + H_2O$

4) $D + PCl_5 \longrightarrow E + POCl_3 + HCl$

5) $E + Mg \xrightarrow{ROR} F$

6) $F + Cl-\underset{\|}{\overset{O}{C}}-C_6H_5 \xrightarrow{-60\ °C} G$

7) $G \xrightarrow{Zn/HCl} H + H_2O$

8) $H + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} J\ (para) + H_2O$

9) $J \xrightarrow{?} K$

10) $K \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} M + 2CO_2 + 3H_2O$

إذا علمت ان المركب (C) مركب عضوي صيغته العامة $C_nH_{2n}O$ ونسبة كل من الهيدروجين والكربون هي 64,63%.

1) جد الصيغة نصف المفصلة للمركب (C).

2) استنتج نسبة كل من الهيدروجين والكربون بالمركب (C).

يعطى: $M(H)=1g/mol$, $M(C)=12g/mol$, $M(O)=16g/mol$

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3) أكتب الصيغ النصف مفصلة للمركبات: A، B، D، E، F، G، H، J، K، M.

4) ما هو ناتج التفاعل (2) لو استعملنا المؤكسد $KMnO_4$ المركز والوسط الحمضي؟

5) أعط اسم الوسيط الذي يمكن استعماله في ارجاع المركب (J)؟

6) ما هو الناتج الرئيسي عند تغيير شروط التفاعل رقم (6) (درجة الحرارة)؟

7) كيف يمكن الحصول على المركب (D) انطلاقا من اماهة ألسين وكواشف كيميائية أخرى من اختيارك؟

8) أكتب تفاعل الحصول على البوليمير (P) انطلاقا من المونومير (M).

II- يتم تحضير مركب بروم الايثيل مخبريا بمزج 0,174 mol من المركب (D) و 0,21 mol من بروميد البوتاسيوم KBr وفي وجود حمض الكبريت.

1) احسب الكتلة العملية المتحصل عليها من بروم الايثيل (m_p) إذا علمت ان مردود التفاعل هو84.43%؟

يعطى: M(Br)= 80g/mol , M(H)=1g/mol , M(C)= 12g/mol , M(O)= 16g/mol

التمرين الثاني: (7 نقاط)

I- إماهة ثنائي غليسيريد DG قرينة يوده I_i=206.84 تعطي الحمضين الدهنيين (A) و(B) و الغليسرول حيث:

الحمض الدهني(A) صيغته العامة $C_nH_{2n-8}O_2$ نسبة الهيدروجين فيه % 10.145 له أول رابطة في الكربون رقم 6.

لحساب قيمة قرينة التصبن لعينة تحتوي على DG قمنا بتسخين كتلة منه 2.5g مع حجم قدره 11.8 ml من محلول KOH تركيزه (1 mol/l) حتى الغليان، ثم قمنا بمعايرة الفائض من الـ KOH بمحلول HCl تركيزه (0.5 mol/l) عند التكافؤ تحصلنا على حجم $V_E(HCl)$=7.3 ml.

1) اعط عبارة قرينة التصبن I_S لـ DG، ثم احسبها.

2) أوجد الصيغة المجملة للحمض الدهني (A)، ثم أعط رمزه.

3) استنتج عدد الروابط المضاعفة لـ DG.

الحمض الدهني (B) هو أحد الأحماض الدهنية الموجودة في الجدول التالي:

حمض الستياريك	حمض الأوليييك	حمض اللينوليك
C18 :0	C18 :1 Δ^9	C18 :2 $\Delta^{9.12}$

4) استنتج صيغة الحمض الدهني (B) المشكل لـ DG .

5) استنتج الصيغ نصف المفصلة الممكنة لـ DG.

6) عينة من مادة دهنية (Y) تتكون من 25% من ثنائي غليسيريد DG و % 75 من الحمض الدهني (A).

- أحسب قرينة اليود لهذه العينة (Y).

يعطى: M_I:127g/mol M_H:1g /mol M_O :16g/mol M_C :12g/mol M_K : 39g /mol

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

II- يدخل 18 حمض أميني في تركيبة الشعر من بينها الميثيونين، ثريونين، الأرجنين بالإضافة إلى السيستئين الذي يملك خاصية تسمح بصلابة وتماسك الشعر.

الحمض الأميني	الجذر	pKa_1	pKa_2	pKa_R	pH_i
ثيريونين Thr	$H_3C—\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{CH}}—$	2.09	.....		5.60
سيستئين Cys	$HS—CH_2—$	1.96	10.28	8.18	.....
الأرجنين Arg	$H_2N—\underset{\displaystyle NH}{\underset{\Vert}{C}}—NH—(CH_2)_3-$	2.17	9.04	.....	10.76
الميثيونين Meth	$H_3C-S—(CH_2)_2—$	.....	9.21		5.74

1) أكمل الجدول ثم صنف الأحماض الأمينية.

2) بأي نوع من التماكب تمتاز به هذه المركبات؟ علل.

3) أعط تمثيل فيشر للحمض لأميني سيستئين مع توضيح الصورة D و L.

4) أعط الصيغ الأيونية للأرجنين حسب تغير قيم الـ pH.

5) أعط نسب الصيغ الأيونية للثريونين عند pKa_1، pKa_2 ، pH_i.

6) تم اخضاع مزيج من الحمضين الأمينيين سيستئين والأرجنين للهجرة الكهربائية عند pH=5.07.

أ) حدد موضع الأحماض الأمينة على شريط الهجرة الكهربائية.

ب) اكتب الصيغ الأيونية السائدة لهذه الأحماض الأمينية عند هذه القيمة من الـ pH.

التمرين الثالث: (6 نقاط)

I- حمض اللاكتيك أو حمض اللبن هو مركب عضوي يدخل في العديد من العمليات الكيميائية الحيوية أثناء الأيض مثلا، صيغته نصف مفصلة $CH_3CHOHCOOH$ وينتج في العضلات عند الحركة وذلك بتفكك الغلوكوز وفق المعادلة التالية:

$$C_6H_{12}O_{6(s)} \longrightarrow 2C_3H_6O_{3(l)} \qquad \Delta H_r^\circ = ?$$

1) أحسب ΔH_r° أنطالبي هذا التفاعل عند 25°C.

2) أحسب أنطالبي تشكل حمض اللاكتيك الغازي $\Delta H^\circ_{f(C_3H_6O_{3(g)})}$.

المعطيات:

$\Delta H_{f(C_6H_{12}O_{6(s)})}$	$\Delta H_{f(C_3H_6O_{3(l)})}$	$\Delta H_{vap(C_3H_6O_3)}$
1248,3kJ/mol	673kJ/mol	174,8kJ/mol

II- نجري في مسعر حراري تفاعل احتراق كتلة من حمض اللاكتيك السائل فكان أنطالبي تفاعل الاحتراق ΔH°_{comb}=-1364kJ/mol عند 25°C.

1) أكتب ووازن معادلة تفاعل احتراق حمض اللاكتيك السائل.

2) أحسب أنطالبي تشكل حمض اللاكتيك السائل وتأكد أنها تساوي إلى القيمة المعطاة في الجزء (I).

يعطى: $\Delta H_{f(H_2O_{(l)})} = 286kJ/mol$, $\Delta H_{f(CO_{2(g)})} = 393kJ/mol$

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3) أحسب مقدار التغير في الطاقة الداخلية لهذا التفاعل عند 25°C.

4) أحسب كمية الحرارة المرافقة لاحتراق كتلة 45g من حمض اللاكتيك.

يعطى:

$M(C) = 12g/mol\,, M(O) = 16g/mol\,, M(H) = 1g/mol\,, R = 8{,}314J/mol.K$

5) عند أي درجة حرارة يكون أنطالبي تفاعل احتراق حمض اللاكتيك السائل مساويا لـ ΔH_T=-1232,903kJ/mol علما أن حمض اللاكتيك السائل لا تتغير حالته الفيزيائية.

يعطى: $T_{eb(H_2O)} = 100°C$, $\Delta H_{vap(H_2O)} = 40{,}7kJ/mol$

المركب	$O_{2(g)}$	$CO_{2(g)}$	$H_2O_{(l)}$	$C_3H_6O_{3(l)}$	$H_2O_{(g)}$
Cp(J/mol.K)	29,37	37,45	75,24	130	33,58

6) أحسب طاقة الرابطة C=O في حمض اللاكتيك السائل.

يعطى: $\Delta H_{sub(C_{(s)})} = 717kJ/mol$

الرابطة	C-O	O-H	C-H	C-C	O O	H-H
E(kJ/mol)	351	464	414,3	347	502	436

انتهى الموضوع الأول

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (7 نقاط)

مركب عضوي أكسيجيني (A) كثافة بخاره بالنسبة للهواء هي 2.07 ، ينتج عن الاحتراق التام لـ 4g من (A) 5.87g من ثنائي أكسيد الكربون CO_2 و 2.34g من الماء H_2O

1) أوجد الصيغة النصف المفصلة لـ (A)

يعطى: $M(H)=1g/mol$, $M(C)=12g/mol$, $M(O)=16g/mol$

من أجل الحصول على بوليمير ذو أهمية كبيرة في حياتنا اليومية نجري سلسلة التالية انطلاقا من (A):

1) $A \xrightarrow[\Delta]{OH} B$

2) $B + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} C + HCl$

3) $C + Mg \xrightarrow{ROR} D$

4) $D +$  $\longrightarrow E$

5) $E \xrightarrow{2H_2O} F + NH_3$

6) $F + H_2 \xrightarrow{Ni} G$

7) $G \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4} H$

8) $n\,H \longrightarrow P$

2) جد صيغ المركبات B، C، D، E، F، G، H، P.

3) حضر المركب (F) انطلاقا من (A) والبنزن وكواشف كيميائية أخرى.

4) أكتب معادلة تفاعل المركب (H) مع:

أ) $KMnO_4$ المركز والوسط الحمضي.

ب) $KMnO_4$ المخفف.

II) –

1) برهن أن دالة التفاعل من الرتبة الأولى هي: $\ln[A]=Kt \quad \ln[A_0]$

2) دراسة تفاعل اماهة السكاروز (S) أعطت النتائج التالية:

t(min)	0	100	200	300	1000
[S] mol/l	0 .5	0.435	0.380	0.33	0.125

أ) أثبت بيانيا أن تفاعل الاماهة السكاروز من الرتبة الأولى.

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ب) جد قيمة ثابت السرعة K بيانيا.

ج) أحسب سرعة التفاعل عند اللحظة t=500 min

د) ما هو الزمن اللازم لإماهة 60% السكاروز؟

التمرين الثاني: (7 نقاط)

I- إليك المركبات التالية:

أحادي غليسيريد MG	ارتباط حمض دهني مشبع بالغليسرول في الموقع β I_s=145.07
حمض دهني AG_X	I_i=0 تتفاعل كتلة m=11.4g من الحمض الدهني مع كتلة m=2.8g من هيدروكسيد البوتاسيوم
حمض دهني AG_Y	نواتج أكسدته بـ $KMnO_4$ المركز بوجود حمض مركز: CH_3-CH_2-COOH , 2 HOOC-CH_2-COOH , HOOC-$(CH_2)_7$-COOH
ثلاثي غليسيريد TG	يتشكل من ارتباط أحماض دهنية X و Y بأحادي غليسيريد.

1) جد الصيغ نصف المفصلة لكل من: أحادي غليسيريد و الحمض الدهني X و الحمض الدهني Y و ثلاثي غليسيريد TG.

2) أنسب درجتي الانصهار T_{fus}: 76°C , 11°C لكل من الحمضيين الدهنيين X و Y.

3) أكتب تفاعل هدرجة ثلاثي غليسيريد TG.

4) أحسب دليل التصبن I_s واليود I_i لثلاثي غلسيريد TG.

5) عينة من الزيت دليل اليود لها I_i=91 تتكون من نسبة A% من الحمض الدهني X و2% من الحمض الدهني Y و نسبة B% من ثلاثي غليسيريد TG .

أ) جد نسبة B% ثلاثي غليسيريد في عينة الزيت.

ب) أحسب قرينة الحموضة لهذه العينة I_a.

يعطى: M_C:12g /mol , M_H:1g/mol , M_O:16g /mol , M_K:39g /mol , M_I:127g /mol

II- الببتيد (P): A-B-C-D-E. يدخل في تركيب بروتين النيكليوبروتين الذي يرتبط هيكليا مع الحمض النووي ADN أو ARN وللتعرف على الأحماض الامينية المكونة للببتيد أجرينا عملية الفصل الموضحة في الشكل (1).

1) ما اسم عملية الفصل.

2) سم الكاشف المستعمل في عملية الفصل وما دوره؟

3) استنتج الأحماض الأمينية المكونة للببتيد P.


www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

للتعرف على ترتيب الأحماض الأمينية المكونة للببتيد أجريت اختبارات أخرى على الببتيدP فنتج ما يلي:


1) بالاعتماد على الوثيقتين (1) و(2) حدد صيغ الأحماض الأمينيةَ A.B.C.D.E مع التعليل. ثم صنفها.



الوثيقة (01)



الشكل (01)



الوثيقة (02)

2) اكتب الصيغة النصف المفصلة للببتيد P ثم سمه.

3) اكتب الصيغة الأيونية للببتيد P عند pH=1 و pH=12.

4) أعط الصيغة الأيونية للحمض الأميني D لما يتغير pH من 1 إلى 12.

أ) جد الصيغ الأيونية المتواجدة للحمض D عند pH=5.97

ب) حدد الصيغة السائدة للحمض D عند pH=5.97 .

علما أن: $pKa_R=3.66$, $pKa_2=9.60$, $pKa_1=1.88$

5) ماهي نتيجة تفاعل الببتيد P مع كاشف بيوري وكزانتوبروتييك؟ علل.

يعطى:

الحمض الأميني	الليزين (Lys)	الأسبارجين (Asn)	حمض الأسبارتيك (Asp)	فينيل ألانين (Phe)	إيزولوسين (Ile)
الجذر	$(CH_2)_4-NH_2$	$(CH_2)-C(=O)-NH_2$	$(CH_2)-C(=O)-OH$	$(CH_2)-C_6H_5$	$HC(-CH_3)(-CH_2-CH_3)$
pH_i	9.74	5.41	2.77	5.48	6.02

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثالث: (6 نقاط)

I- يحتوي مسعر حراري على $m_0=100g$ من الماء عند $T_0=16°C$ ثم نضيف له كمية من الماء كتلتها $m_1=200g$ ودرجة حرارتها $T_1=40°C$ بعد التحريك تستقر درجة الحرارة عند القيمة $T_f=31°C$

1) احسب السعة الحرارية للمسعر C_{cal} .

2) احسب كتلة المكافئ المائي للمسعر μ.

3) من أجل تعيين الحرارة النوعية لانصهار الجليد L_f نضع في المسعر الحراري السابق وهو فارغ كتلة $m_2=350g$ من الماء ونسجل درجة الحرارة $T_2=20°C$ ثم نضيف له قطعة من الجليد كتلتها $m_3=30g$ ودرجة حرارتها $T_3 = -12°C$ عند الانصهار الكلي لقطعة الجليد نقيس بواسطة محرار درجة حرارة التوازن فنجدها $T'_f=12°C$.

أ- احسب الحرارة النوعية لانصهار الجليد L_f .

ب-أحسب أنطالبي انصهار الجليد.

ج-أكتب المعادلة الحرارية لانصهار الجليد.


د- مثل البيان الذي يصف تغير درجة حرارة قطعة الجليد بدلالة الزمن $T=f(t)$.

حيث T: درجة الحرارة بالدرجة المئوية و t: الزمن بالدقيقة min.

المعطيات:

$M(H)=1g.mol^{-1}$ ، $M(O)=16g.mol^{-1}$ ، $c_e=75,33J.mol^{-1}.K^{-1}$ ، $c_g=2,1Jg^{-1}.K^{-1}$

II- يخضع غاز مثالي إلى التحولات الموضحة في المخطط التالي:



حيث:

$V_1= 0.01m^3$ ، $T_2= 500\ K$ ، $T_1= 300\ K$

$P_A= 10^5Pa$ ، $V_2= 0.0067\ m^3$

1) ما نوع التحولات:

« AB » ، « BC » ، « CD » و « DA »

2) أحسب عدد المولات لهذا الغاز المثالي.

3) أحسب متغيرات الحالة (P,V,T) من أجل النقاط (الحالة) : B ، C و D .

4) أحسب العمل W، كمية الحرارة Q والطاقة الداخلية ΔU من أجل كل تحول .

5) هل المبدأ الأول للديناميكا الحرارية محقق من أجل هذه الدورة؟ علل.

يعطى: $R= 8.314\ J/mol.K$ ، $C_P= 1.4R$ (C_P: السعة الحرارية عند ضغط ثابت) .

انتهى الموضوع الثاني

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com