najah213.com · نجاح 213

ثانوية محمد خميستي - مستغانم

المستوى : ثانية تقني رياضي

السنة الدراسية : 2022 – 2023

اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات

120 دقيقة

التمرين الأول

(I) نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بحدها الأول $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \dfrac{4u_n}{u_n + 2}$

❶ احسب u_1 و u_2.

❷ بين أن : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{-u_n^2 + 2u_n}{u_n + 2}$ ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) علما أن $1 \leqslant u_n \leqslant 2$.

(II) لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n}$.

❶ بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ ثم عين حدها الأول v_0.

❷ اكتب v_n بدلالة n ثم بين أن : $u_n = \dfrac{2}{1 + \left(\dfrac{1}{2}\right)^n}$ ، لاحظ أن : $\dfrac{u_n - 2}{u_n} = 1 - \dfrac{2}{u_n}$

❸ احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$ ، ماذا تستنتج.

❹ نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_1 = v_0 + v_1 + \cdots\cdots + v_n$ و $S_2 = \dfrac{1}{u_0} + \dfrac{1}{u_1} + \cdots\cdots + \dfrac{1}{u_n}$


◄ احسب S_1 ثم بين أن : $S_2 = \dfrac{n+1}{2} + \left[1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$

التمرين الثاني

(I) $ABCD$ مستطيل حيث $AD = DF = 2$ ، $AE = \sqrt{37}$ و $AB = 6$ ، لتكن E منتصف $[BC]$ و H هي المسقط العمودي للنقطة F على $[AE]$.

❶ احسب : $\overrightarrow{FH}.\overrightarrow{AE}$ ، $\overrightarrow{EC}.\overrightarrow{EB}$ و $\overrightarrow{DF}.\overrightarrow{FC}$.

❷ بين أن $\overrightarrow{AF}.\overrightarrow{AE} = 14$ ثم استنتج قيس الزاوية $\widehat{EAF}$.



(2) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$

نعتبر النقط : $A(1,3)$ ، $B(3,3)$ و $C(3,1)$ و لتكن (C_1) مجموعة النقط $M(x,y)$ حيث : $(C_1) : x^2 + y^2 - 8x + 2y + 12 = 0$

❶ بين أن (C_1) دائرة يطلب تعيين مركزها ω_1 و نصف قطرها r_1.

❷ بين أن المثلث ABC قائم في B ثم جد معادلة الدائرة (C_2) المحيطة به.

❸ هل الدائرتان (C_1) و (C_2) متماستان ؟ برر ذلك.

❹ جد معادلة للمستقيم (T) مماس الدائرة (C_2) في النقطة B.

❺ بين أن المستقيم (T) يقطع الدائرة (C_1) ثم جد نقط تقاطعهما.

❻ أوجد (C') صورة (C_1) بالتحاكي h الذي مركزه النقطة A و نسبته 3.



www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الإجابة النموذجية

حل التمرين الأول

(I) **❶ حساب** : $u_1 = \frac{4}{3}$ و $u_2 = \frac{8}{5}$.

❷ تبيان أن : $u_{n+1} - u_n = \frac{-u_n^2 + 2u_n}{u_n + 2}$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n}{u_n+2} - u_n = \frac{4u_n - u_n(u_n+2)}{u_n+2} = \frac{-u_n{}^2 + 2u_n}{u_n+2} \frac{4u_n}{u_n+2} = \frac{-u_n{}^2 + 2u_n}{u_n+2}$$

◄ استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

u_n	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$u_{n+1} - u_n$		$-$ 0 $+$		$+$ 0 $-$	

ومنه المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

(II) **❶ اثبات أن (v_n) متتالية هندسية** :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-2}{u_{n+1}} = \frac{\frac{4u_n}{u_n+2} - 2}{\frac{4u_n}{u_n+2}} = \frac{4u_n - 2u_n - 4}{4u_n} = \frac{2u_n - 4}{4u_n} = \frac{2}{4}\left[\frac{u_n - 2}{u_n}\right] = \frac{1}{2}v_n$$

ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ و حدها الأول : $v_0 = \frac{u_0 - 2}{u_0} = \frac{1-2}{1} = -1$.

❷ كتابة v_n بدلالة n : $v_n = v_0 \times q^n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

◄ استنتاج u_n بدلالة n : لدينا $v_n = 1 - \frac{2}{u_n}$ أي $1 - v_n = \frac{2}{u_n}$ اذن : $u_n = \frac{2}{1 - v_n}$ أي $u_n = \frac{2}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

❸ نهاية (u_n) : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{2}{1 + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^n}_{0}} = 2$ و منه نستنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.

❹ حساب S_1 : $S_1 = \left(\frac{\text{الحد الأول}}{1-q}\right) \times [1 - q^{\text{عدد الحدود}}] = \frac{v_0}{1-q}(1 - q^{n-0+1}) = -2\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$.

▲ استنتاج S_2 : لدينا $\frac{1}{u_n} = \frac{1}{2}(1 - v_n)$ و بالتالي :

$$S_2 = \frac{1}{2}(1 - v_0) + \cdots + \frac{1}{2}(1 - v_n) = \frac{1}{2}\left[1(n - 0 + 1) - \left(\underbrace{v_0 + \cdots + v_n}_{S_1}\right)\right] = \frac{(n+1)}{2} + \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$$

حل التمرين الثاني

(I) **❶ حساب** : $\overrightarrow{FH}.\overrightarrow{AE} = 0$ لأنهما متعامدان ، $\overrightarrow{EC}.\overrightarrow{EB} = -EC.EB = -1 \times 1 = -1$ لأنهما متوازيان و متعاكسان في الإتجاه.

$\overrightarrow{DF}.\overrightarrow{FC} = DF.FC = 2 \times 4 = 8$ لأنهما متوازيان و لهما نفس الإتجاه.

❷ تبيان أن $\overrightarrow{AF}.\overrightarrow{AE} = 14$: في المثلث AEF لدينا : $\overrightarrow{AF}.\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(AF^2 + AE^2 - EF^2) = \frac{1}{2}(8 + 37 - 17) = 14$

▲ استنتاج قيس الزاوية $\widehat{EAF}$: $\overrightarrow{AF}.\overrightarrow{AE} = AF \times AE \times cos\left(\widehat{EAF}\right)$ أي $cos\left(\widehat{EAF}\right) = \frac{14}{\sqrt{37}.\sqrt{8}} \approx 0.81$ ومنه $\widehat{EAF} \approx 35.54°$

(II) **❶ تبيان أن (C_1) دائرة** : $(C_1) : x^2 + y^2 - 8x + 2y + 12 = 0$ أي $(C_1) : (x-4)^2 - 4^2 + (y+1)^2 - 1^2 + 12 = 0$

ومنه $(C_1) : (x-4)^2 + (y+1)^2 = (\sqrt{5})^2$ اذن (C_1) دائرة مركزها $\omega_1(4, -1)$ و نصف قطرها $r_1 = \sqrt{5}$.

❷ تبيان أن المثلث ABC قائم في B : $\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}$ ومنه $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC} = 0$ اذن المثلث ABC قائم في B.

يمكن استعمال طريقة فيثاغورث.

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

▲ ايجاد معادلة الدائرة (C_2) :

طريقة أولى : لتكن $\omega_2(2,2)$ منتصف $[AC]$ و مركز الدائرة (C_2) و ليكن نصف قطرها $r_2 = \frac{AC}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$

اذن $(C_2) : (x-2)^2 + (y-2)^2 = (\sqrt{2})^2$.

طريقة ثانية : نحسب الجداء $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MC} = 0$ نجد $(x-x_A)(x-x_C) + (y-y_A)(y-y_C) = 0$ أي $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0$

اذن : $(C_2) : (x-2)^2 + (y-2)^2 = \left(\sqrt{2}\right)^2$.

❸ هل الدائرتان (C_1) و (C_2) متماستان : لا لأن $\omega_1\omega_2 = \sqrt{13} \neq r_1 + r_2 = \sqrt{5} + \sqrt{2}$.

❹ معادلة المستقيم (T) : بما أن (T) مماس فإن شعاعه الناظمي هو $\overrightarrow{\omega_1 B}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ أي $(T) : x + y + c = 0$

بما أن $B \in (T)$ فإن : $x_B + y_B + c = 0$ أي $c = -6$ اذا معادلة المستقيم هي : $(T) : x + y - 6 = 0$.

❺ تبيان أن (T) يقطع (C_1) : $d_{(\omega_1,(T))} = \frac{|1.x_{\omega_1} + 1.y_{\omega_1} - 6|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} < r_1$ اذن المستقيم (T) يقطع الدائرة (C_1).

▲ تعيين احداثييهما : لدينا $(*) \cdots y = -x + 6$ نعوض العلاقة $(*)$ في معادلة الدائرة (C_2) نجد $2x^2 - 22x + 60 = 0$ نحل المعادلة

من أجل $x = 5$ نعوض في $(*)$ نجد $y = 1$ اذن $E(5,1)$ و من أجل $x = 6$ نعوض في $(*)$ نجد $y = 0$ اذن $F(6,0)$.

❻ ايجاد (C') صورة (C_1) : مركز الدائرة (C') : $\overrightarrow{A\omega'}\begin{pmatrix}x'-x_A\\y'-y_A\end{pmatrix} = 3\overrightarrow{A\omega_1}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$ أي $x' - x_A = 3 \times 3$

و $y' - y_A = 3 \times (-4)$ ومنه $\omega'(10,-9)$.

نصف قطر الدائرة : $r' = |k|.r_1 = 3\sqrt{5}$ و بالتالي : $(C') : (x-10)^2 + (y+9)^2 = \left(3\sqrt{5}\right)^2$.

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com