najah213.com · نجاح 213

ثانوية عبد الحق بن حمودة - سيرات- مستغانم **السنة الدراسية : 2019/2018**

المستـــوى: 1 ج.م.ع.ت **المـــدة : 120 دقيقة**

إختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول

أجب بصح أو خطأ مع التبرير:

1. $a = 0.02$ ، الكتابة العلمية لـ a^5 هي 3.2×10^{-9}
2. إذا كان $I=[-3,4]\cup[2,4]$ و $J=[1,6]$ فإن: $I\cap J=[1,6]$
3. x عدد حقيقي ، $-3x+2\geq 0$ يكافئ $x\in]3;+\infty[$
4. إذا كان $x<0$ فإن: $\sqrt{x^2}=-x$
5. إذا كان $a\in]2;b[$ و $B=\sqrt{a-2}-\sqrt{b-2}$ فإن إشارة B سالبة

التمرين الثاني

f دالة معرفة بجدول تغيراتها الآتي :

x	-4		-1		0		1		3		5
$f(x)$	1.5	↘	0	↘	-2	↗	0	↗	2	↘	1

1. عين مجموعة تعريف الدالة f
2. حدد اتجاه تغير الدالة f
3. أذكر القيم الحدية للدالة f ، من أجل أي قيم لـ x تبلغ f قيمها الحدية
4. حل في المجال $[-4,5]$ المعادلة $f(x)=0$
5. حدد إشارة الدالة f على المجال $[-4,5]$
6. قارن بين العددين $f(-3)$ ، $f(-2)$ و بين العددين $f\left(\frac{1}{2}\right)$ ، $f(2)$ مع التعليل
7. أرسم المنحنى البياني (C_f) الممثل للدالة f في المستوي المنسوب معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$ على المجال $[-4,5]$
8. حدد شفعية الدالة f مع التعليل

التمرين الثالث

لتكن العبارتين الآتيتين : $P(x)=|x+1|-2$ و $Q(x)=|x-4|+2$

1. أحسب $P\left(\frac{1}{3}\right)$ ، $Q\left(\sqrt{3}+2\right)$
2. حل المتراجحة $Q(x)-2\leq P(x)+2$
3. نضع $A(x)=P(x)+Q(x)$

أ- أكتب $A(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

ب- حل المعادلة $A(x)=12$

بالتوفيق للجميع

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com


najah213.com · نجاح 213

تصحيح اختبار الفصل الأول

الأستاذ : فغلول.ع

عناصر الإجابة	النقطة
التمرين الأول (6 نقاط)	
الإجابة بصح أو خطأ مع التبرير:	
1. (صح) : $a=0.02=2\times10^{-2}$ إذن $a^5=\left(2\times10^{-2}\right)^5=32\times10^{-10}$ ومنه الكتابة العلمية للعدد a^5 هي 3.2×10^{-9}	1
2. (خطأ) : $I\cap J=[1,4]$	1
3. (خطأ) : $-3x+2\geq0$ معناه $x\leq\frac{2}{3}$ أي $x\in\left]-\infty,\frac{2}{3}\right]$	1
4. (صح) : إذا كان $x<0$ فإن $\sqrt{x^2}=\lvert x\rvert=-x$	1
5. (صح) : إذا كان $a\in]2;b[$ معناه $2<a\leq b$ أي $0<a-2\leq b-2$ أي $b-2\geq a-2>0$ أي $\sqrt{a-2}-\sqrt{b-2}\leq0$ أي B سالب	1
التمرين الثاني (9 نقاط)	
1. مجموعة تعريف الدالة f هي $D_f=[-4,5]$	1
2. اتجاه تغير الدالة f : الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0,3]$ ومتناقصة تماما على المجالين $[-4,0]$ و $[3,5]$	1.5
3. تعيين القيم الحدية للدالة f : توجد قيمة حدية عظمى هي (2) من أجل $x=3$ و قيمة حدية صغرى هي (-2) من أجل $x=0$	1
4. حل في المجال $[-4,5]$ المعادلة $f(x)=0$: من خلال جدول التغيرات نجد أن الدالة تنعدم من أجل $x=-1$ و $x=1$ أي $S=\{-1,1\}$	1
5. تحديد إشارة الدالة f على المجال $[-4,5]$	1
6. مقارنة العددين : $f(-3)<f(-2)$ لأن الدالة f متناقصة تماما على المجال $[-4,0]$ (الدالة تعكس الترتيب) ، و $f(2)>f\left(\frac{1}{2}\right)$ لأن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0,3]$ (الدالة تحفظ الترتيب)	1.5
7. رسم المنحنى البياني (C_f) على المجال $[-4,5]$	1
8. شفعية الدالة f : مجموعة التعريف $D_f=[-4;5]$ ليست متناظر بالنسبة إلى 0 و بالتالي فهي ليست فردية و لا زوجية.	1

x	-4		-1		1		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

التمرين الثالث (6 نقاط)

لتكن العبارتين الآتيتين: $P(x)=|x+1|-2$ و $Q(x)=|x-4|+2$

1+1

1. حساب: $P\left(\frac{1}{3}\right)=\left|\frac{1}{3}+1\right|-2=\frac{4}{3}-2=\boxed{-\frac{2}{3}}$ ، $Q\left(\sqrt{3}+2\right)=\left|\sqrt{3}+2-4\right|+2=\left|\sqrt{3}-2\right|+2=2-\sqrt{3}+2=\boxed{4-\sqrt{3}}$

2. حل المتراجحة $Q(x)-2\le P(x)+2$:

$Q(x)-2\le P(x)+2$ تكافئ $|x-4|+2-2\le|x+1|-2+2$ أي $|x-4|\le|x+1|$

1

نحل المتراجحة بيانيا: $|x-4|\le|x+1|$ تكافئ $\boxed{MA\le MB}$ هذا يعني أن النقطة M تكون أقرب من النقطة A عنه من B. إذا فرضنا I منتصف $[AB]$، فإن النقطة M تكون أقرب من النقطة A عندما تكون قبل I أي من أجل كل النقاط ذات فاصلة أصغر أو تساوي $\frac{4-1}{2}=\frac{3}{2}$. ومنه مجموعة حلول المتراجحة: $S=[1.5,+\infty[$

3. نضع $A(x)=P(x)+Q(x)$

أ) كتابة $A(x)$ دون رمز القيمة المطلقة: $A(x)=|x-4|+|x+1|$

نضع: $|x-4|=0$ تكافئ $x=4$ و $|x+1|=0$ تكافئ $x=-1$

1.5

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$
$x-4$	$-$	$-$	0	$+$
$\lvert x+1\rvert$	$-x-1$	$x+1$	$x+1$	
$\lvert x-4\rvert$	$4-x$	$4-x$	$x-4$	
$A(x)$	$3-2x$	5	$2x-3$	

$$A(x)=\begin{cases}3-2x & ;\ x\in]-\infty;-1[\\ 5 & ;\ x\in[-1\ ;4]\\ 2x-3 & ;\ x\in]4;+\infty[\end{cases}$$

ب) حل المعادلة $A(x)=12$

☒ لما $x\in]-\infty;-1[$

$A(x)=12$ تكافئ $-2x+3=12$ تكافئ $-2x=9$ تكافئ $x=\frac{-9}{2}$ و $\frac{-9}{2}\in]-\infty;-1[$ إذن: $\boxed{S_1=\left\{-\frac{9}{2}\right\}}$

☒ لما $x\in[-1\ ;4]$

1.5

عندئذ $A(x)=12$ تكافئ $5=12$ وهذا مستحيل إذن $\boxed{S_2=\{\ \}}$

☒ لما $x\in]4;+\infty[$

عندئذ $A(x)=12$ تكافئ $2x-3=12$ تكافئ $x=\frac{15}{2}$ و $\frac{15}{2}\in]4;+\infty[$ إذن: $\boxed{S_3=\left\{\frac{15}{2}\right\}}$

الخلاصة: مجموعة الحلول هي $\boxed{S_1\cup S_2\cup S_3=\left\{-\frac{9}{2},\frac{15}{2}\right\}}$