najah213.com · نجاح 213

المادّة: العلوم الفيزيائيّة
المستوى: سنة أولى ج م ع ت

التّاريخ: 2023/03/07
المدّة: ساعتان


اختبار الثلاثي الثّـاني

الجزء الأول: (10 نقاط)

لعبة الكرة الحديدية، تعتمد على رمي اللاّعب للكرة الحديدية باتجاه كرة الهدف -كرة ملونة-، التي تُرْمى مسبقا وتكون من الخشب أو الإيبونيت. في البداية يقوم اللاعب برسم دائرة صغيرة على أرضية الملعب، يرمى من داخلها اللاعب كرة الهدف إلى مسافة محصورة بين $6m$ إلى $8m$.


يهدف التمرين إلى دراسة حركة الكرة الحديدية لأجل رميها لأقرب ما يمكن من كرة الهدف.

يقذف اللاعب **سِراج** من داخل الدائرة، كرة حديدية كتلتها m باتجاه كرة الهدف من الموضع A على ارتفاع h من سطح الأرض وبسرعة ابتدائية v_0 يصنع حامل شعاعها زاوية α مع الأفق، لدراسة محاكاة حركة هذه الكرة الحديدية وباستعمال برنامج مناسب، أعطى التصوير المتعاقب لمركز الكرة الحديدية كما هو موضح في (الشكل01).



الدراسة البيانية (دراسة نتائج التصوير المتعاقب)

1. ماذا يمثل المنحنى الممثل في (الشكل 01)؟ ماذا يمثل المنحنيين (1) و(2) الموضحين في (الشكل 02).
2. حدّد طبيعة حركة مركز الكرة الحديدية على المحورين (ox) و (oy) مع التبرير.
3. حدّد قيّم المقادير التالية: الارتفاع h، مركّبتي السرعة الابتدائية v_{0x} وv_{0y}.
4. ما هي قيمة كل من: زاوية القذف α و السرعة الابتدائية التي قذفت بها الكرة الحديدية v_0؟
5. كيف تسمى المسافة الأفقية (OP)؟ عرّفها ثمّ استنتجها.
6. كيف نسمي النقطة (s)؟ عيّن زمن بلوغ هذه النقطة.
7. مثّل السرعة $\vec{v}_s$ ، $1cm \rightarrow 1{,}50m/s$.
8. هل تمكّن سِرَاجْ من تحقيق الرقم المطلوب للفوز؟ علّل.



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


9. بعد ارتطام الكرة بسطح الأرض وحدث لها التوازن.

اذكر نص القانون الثالث لنيوتن. ومثّل الفعلين المتبادلين بين الكرة الحديدية (b) والسطح (s).

الجزء الثاني: (10 نقاط) "التمارين الثلاثة مستقلة عن بعضها البعض"

التمرين الأول:

مادة الكلوروفيل أو اليخضور صيغته الكيميائية $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$، توجد في النباتات والطّحالب وبعض الأنواع من البكتيريا (البكتيريا الزرقاء)، تعتبر هذه المادة هي المسؤولة عن إتمام عملية البناء الضوئي لإنتاج الغذاء ، ويعتبر كذلك عنصر المغنيزيوم أهم عنصر كيميائي مكوّن لها، وتتم هذه العملية بتحويل الطاقة الضوئية المستمدة من أشعّة الشمس إلى طاقة كيميائية كامنة، ويحدث خلالها تحويل غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء إلى سكر العّنب وثنائي الأكسجين.



« Chlorophyll »

Chloros: أخضر / phyllo :ورق

1. احسب الكتلة المولية لمادة الكلوروفيل.

بفرض أنه لديك عينة من مادة الكلوروفيل كتلتها $m_1 = 44,6\ g$.

2. استنتج كمية المادة المتواجدة في هذه العينة.

نعلم أنه في غياب الضوء، يتوقف النبات عن عملية التركيب الضوئي ويُطرح خلالها غاز CO_2. نفرض نبات ما طرح حجماً من غاز ثنائي أكسيد الكربون $V = 4,25l$ خلال فترة زمنية (t)، في درجة حرارة $T = 23°C$ وتحت ضغط $P = 4\ atm$.

3. احسب كمية المادة لغاز ثنائي أكسيد الكربون المُفرز (الناتجة) من طرف النبات في هذه الشروط.

4. أوجد حجم واحد مول $(1\ mol)$ من غاز الأكسجين الممتص من طرف النبات في نفس الشروط السابقة. ثم احسب كمية المادة لحجم غاز الأكسجين قدره $V = 4,25l$.

التمرين الثاني:

بهدف تحضير محلول (S_1) من كبريتات المغنيزيوم 'الملح الإنجليزي' $(Mg^{2+}, SO_4^{2-})_{aq}$ تركيزه المولي $C = 0,2mol/L$. أخذت عينة كتلتها m من علبة مسحوق كبريتات المغنيزيوم مكتوب على ملصقتها $(P = 96\%)$، وأذيبت في حجم $V = 100mL$ من الماء المقطر.



1. ماذا تعني الكتابة $(P = 96\%)$؟ عرِّفْها.

2. استنتج كتلة العينة النّقية m. ثمّ احسب كمية مادة العيّنة المذابة في المحلول m_0.

3. استنتج التركيز الكتلي للمحلول (S_1) بطريقتين مختلفتين.

نأخذ حجما $V_1 = 10mL$ من المحلول (S_1) ونمدّده 50 مرّة بواسطة الماء المقطر.

4. اذكر البروتكول التجريبي الموافق لهذه العملية مع ذكر الزجاجيات المستعملة باختصار.

5. جِدْ قيمة التركيز الجديد (C_2) للمحلول الجديد (S_2).

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثالث:

حمض الأسكوربيك (فيتامين C) مركب كيميائي يعمل على معالجة مرض الشعيرات الدموية، يوجد في الحمضيات (اللّيمون والبرتقال) وكذلك في بعض الخضار، صيغته الكيميائية من الشكل $\mathbf{C_nH_{n+2}O_n}$، نذيب قرص واحد من (فيتامين C) النقي ذو الكتلة $\mathbf{m = 4g}$ في حجم $\boldsymbol{V = 100mL}$ في الماء المقطر، فنحصل عل محلول مائي $(\boldsymbol{S_0})$ تركيزه $\boldsymbol{C_0}$، نقوم بتمديده 20 مرة فنحصل على محلول ممدد تركيزه:



$\boldsymbol{C_1 = 1,14 \times 10^{-2} mol/L}$.

1. استنتج التركيز $\boldsymbol{C_0}$ للمحلول $(\boldsymbol{S_0})$.
2. احسب الكتلة المولية لحمض الأسكوربيك (الفيتامين C).
3. اذا علمت أن الكتلة المولية $\boldsymbol{M(C_nH_{n+2}O_n) = 176g/mol}$،

   استنتج الصيغة الجزيئية لحمض الأسكوربيك.

قارورة من محلول حمض الأسكوربيك توجد بها ملصقة مكتوب عليها:

$\boldsymbol{M = 176g/mol\ .P = 11\%\ .d = 1,6\ .V = 250mL}$.

4. احسب تركيز هذا المحلول الحمضي. ثم استنتج كتلة الأسكوربيك المُنْحَلَة في القارورة.
5. استنتج عدد الأقراص الواجب إذابتها للحصول على محلول له نفس تركيز المحلول الموجود بالقارورة.

المعطيات: $M(\mathrm{H}) = 1g/mol\ ,\ M(\mathrm{O}) = 16g/mol\ ,\ M(\mathrm{N}) = 14g/mol$

$M(\mathrm{Mg}) = 24g/mol\ ,\ M(\mathrm{C}) = 12g/mol\ ,\ M(\mathrm{S}) = 32g/mol,\quad R = 8,31SI$

$1atm = 1,013 \times 10^5 Pa$

---

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تصحيح اختبار الفصل الثاني: مارس 2023 ؛ العلوم الفيزيائية: 1ج م ع: الأستاذين: محمادي

الجزء الأول:

① = المنحنى الأفضل في الشكل ① : التصوير المناسب لدراسة حركة مركز الكرة
← المنحنى (1): تغيرات السرعة على المحور (ox) بدلالة الزمن (t)
← المنحنى (2): تغيرات السرعة على المحور (oy) بدلالة الزمن (t)

② = طبيعة الحركة:
على المحور (ox): المسار: مستقيم، السرعة: ثابتة: فالحركة مستقيمة منتظمة
على المحور (oy): مرحلة الصعود: المسار: مستقيم، السرعة: متناقصة
مرحلة النزول: المسار: مستقيم، السرعة: متزايدة
فالحركة مستقيمة متباطئة بانتظام ؛ (ΔP) ثابت
فالحركة مستقيمة متسارعة بانتظام.

③ = الارتفاع (h): $h = H - h_1 = \frac{1,5 \times 3}{2} - \frac{1 \times 2}{2} = 1,25\,m$
من البيان: $v_{0x} = 3\,m/s$ ؛ $v_{0y} = 2\,m/s$
مركبتي السرعة عند اللحظة (t=0)

④ زاوية القذف:
$\tan\alpha = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 33,7°$
$\cos\alpha = \frac{v_{0x}}{v_0} \Rightarrow v_0 = \frac{v_{0x}}{\cos\alpha} \Rightarrow v_0 = 3,6\,m/s$ قيمة السرعة v_0


⑤ المسافة (OP) = المدى: هي المسافة الأفقية التي يقطعها الجسم (النقطة) بين نقطة (موضع) القذف وموضع السقوط.
$OP = S = b \times c = 3 \times (5 \times 0,5) = 7,5\,m$

⑥ تسمى النقطة (S) ← الذروة ← اللحظة الموافقة لها

⑦ عند (S): $v_S = 3\,m/s$

⑧ نعم، اقترب سراج من تحقيق الرقم المطلوب للفوز.

⑨ نص قانون مبدأ القطيع لنيوتن: إذا أثرت الكرة الحديدية (b) على السطح (s) بقوة $\vec{F}_{b/s}$، فإن السطح يؤثر أيضاً على الكرة (b) بقوة $\vec{F}_{s/b}$ حيث يكون للقوتان: منفس الحامل، حجم متعاكستان ونفس الطويلة.
$\vec{F}_{b/s} = -\vec{F}_{s/b}$



الجزء الثاني:

التمرين الأول:

$V = 4,25\,L = 4,25.10^{-3}\,m^3$
$P = 4\,atm = 4,052.10^5\,Pa$
$T = 23°C = 296\,K$

③ $P.V = nRT$
$n = \frac{PV}{RT} = \frac{4,1,013.10^5 . 4,25.10^{-3}}{8,31 . 296}$
$n = 0,7\,mol$

④ حجم واحد مول $(n = 1\,mol ;\ V = V_M)$
$PV = nRT \Rightarrow PV_M = 1.R.T \Rightarrow V_M = \frac{RT}{P} = \frac{8,31 . 296}{4,1,013.10^5}$
$V_M = 0,00607\,m^3/mol = 6,07\,L.mol^{-1}$

حساب كمية المادة $n = \frac{V_g}{V_M} = \frac{4,25}{6,07} = 0,7\,mol$

① الكتابة: P=96% تمثل درجة النقاوة: هي حاصل قسمة كتلة المادة النقية على كتلة المادة الغير نقية. تمثل كتلة النوع الكيميائي (X) المنحل في 100g من محلول (S).

② $m = C.M.V = 0,2 . 120 . 0,1 \Rightarrow m = 2,4\,g$
$M(MgSO_4) = M(Mg) = 24 + 32 + 4.16 = 120\,g.mol^{-1}$
كتلة العينة الطبية في المحلول $P = \frac{m}{m_0} . 100$
$m_0 = \frac{m}{P} . 100 = \frac{2,4}{96} . 100 \Rightarrow m_0 = 2,5\,g$

③ حساب التركيز الكتلي:
$C_m = \frac{m}{V} = \frac{2,4}{0,1} = 24\,g = C_m$
$C_m = C.M = 0,2 . 120 = 24\,g = C_m$

④ البروتوكول التجريبي: بواسطة ماصة إجاص، نرشح حجماً قدره $V = 10\,mL$ ونضعه في حوجلة عيارية سعتها $V = 50\,mL$، نزيف الماء المقطر حتى خط العيار، نرج الحوجلة للحصول على محلول متجانس.

$F = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow V_2 = 5,10 = 50\,mL$
$F = \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow C_2 = \frac{C_1}{F} = \frac{0,2}{50} \Rightarrow C_2 = 0,004\,mol.L^{-1}$

⑤ التركيز المولي: $C_2 = 0,004\,mol.L^{-1}$

التمرين الثاني:

(S_0) $m = 4g$, $V = 100\,mL$, $C_0 = ?$ $\Rightarrow (S_1)$ $F = 20$

① حساب التركيز (C_0): $C_1 = 1,14.10^{-2}\,mol/L$
$F = \frac{C_0}{C_1} \Rightarrow C_0 = F.C_1 = 20 . 1,14.10^{-2} \Rightarrow C_0 = 0,228\,mol/L$

② $m = C.V.M \Rightarrow M = \frac{m}{CV} = \frac{4}{0,1 . 0,228} = 176\,g/mol$

③ $M(C_nH_{2n}O_n) = nM(C) + 2nM(H) + nM(O)$
$= 12n + 2n + 16n = 176 \Rightarrow 29n = 174 \Rightarrow n = 6$
$C_nH_{2n}O_n = C_6H_{12}O_6$ إذن

④ $P = \frac{C_0M}{10d} \Rightarrow C_0 = \frac{10Pd}{M} = \frac{10.11.1,6}{176} = 1\,mol/L$

⑤ $m = C.M.V = 1 . 176 . 0,25 = 44\,g$

⑥ عدد الأقراص: $n_{قرص} = \frac{m}{m_{1قرص}} = \frac{44}{4} = 11$ قرص

التمرين الأول:

① الكتلة المولية: $M(C_{55}H_{72}O_5N_4Mg) = 55M(C) + 72M(H) + 4M(O) + 4M(N) + M(Mg) = 892\,g.mol^{-1}$

② حساب كمية المادة: $n = \frac{m}{M} = \frac{44,6}{892} = 0,05\,mol.$

P: N. MOHAMADI

www.dzexams.com
www.ecolerradja.com
AnyScanner
www.fb.com/ecolerradja
فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com