najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية : المعمورة الجديدة – سعيدة — المستوى : ثالثة علوم تجريبية

2020 – 2019 | إختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات | المدة : 03 سا

تجنّب الشطب و استعمال المصحّح.

التمرين الأول: (04 نقاط)

بين صحة و خطأ كل من الجمل التالية مع التعليل:

1. مهما يكن العدد الحقيقي x: $\dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$.
2. $\ln(3e^{\pi}) = \pi + \ln 3$.
3. الدالة $x \longmapsto e^{-2x}$ هي حل المعادلة التفاضلية $y' = 2y$.
4. المتراجحة $e^{1-2x} > e^{x+1}$ لا تقبل حلول $\mathbb{R}$.
5. $\lim\limits_{x \to -\infty} \ln(e^x + 4) = 2\ln 2$.

التمرين الثاني: (08 نقاط)

لتكن الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = (x-1)e^{-x} + 2$.

1. أدرس تغيرات الدالة g .
2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-0.38, -0.37[$.
3. إستنتج إشارة $g(x)$.

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$ ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$) .

1. بين أنه من اجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = g(x)$.
2. أدرس تغيرات الدالة f .
3. بين ان المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x + 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.
4. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (Δ).
5. بين أن المنحنى يقبل نقطة انعطاف .
6. بين أن : $f(\alpha) = \dfrac{2\alpha^2 + \alpha - 1}{\alpha - 1}$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

7 أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم المقارب (Δ) (نأخذ $\alpha = -0.375$) .

✍ (Δ_m) مستقيم معادلته $y = 2x + m$ حيث m عدد حقيقي .

1 عين m حتى يكون (Δ_m) مماسا للمنحنى (C_f) في نقطة يطلب تعيين إحداثياتها.

2 ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة التالية : $\frac{x}{e^x} + 1 - m = 0$.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

✍ نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = \frac{2x^2}{x^2+1} - \ln(x^2+1)$.

1 أدرس اتجاه تغير الدالة g.

2 بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]1;+\infty[$، أحسب $g\left(\frac{3}{2}\right)$ و $g\left(\frac{5}{2}\right)$، أعط حصرا لـ α بتقريب $0,1$.

3 إستنتج اشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

✍ نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(x^2+1)}{x} \ , \ x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

و ليكن (C_f) التمثيل البياني لـ f في معلم متعامد $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ $(\left\|\vec{i}\right\| = 1\,\text{cm} \ ; \ \left\|\vec{j}\right\| = 3\,\text{cm})$.

1 أحسب $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x}$.

2 إستنتج أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند 0 ثم أكتب معادلة T المماس لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

3 تحقق أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f(x) = \frac{2\ln x}{x} + \frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)$، إستنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

4 أثبت أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

5 إستنتج اشارة $f'(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

6 بين أنّ $f(\alpha) = \frac{2\alpha}{(\alpha^2+1)}$ ثم إستنتج حصرا لـ $f(\alpha)$.

7 أنشئ T ثم (C_f).

8 في نفس المعلم أنشئ (C_h) منحنى الدالة h المعرفة على $]-\infty;0[$ بـ: $h(x) = \frac{\ln(x^2+1)}{x}$.

إذا أردت أن تنجح بحق، ستجد طريقا ما، وإذا كنت لا تريد فستجد عذرا .

أستاذ المادة : مريان محمد

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الأستاذ : مزيان محمد — المستوى : ثالثة علوم مرتجى تجريبية

2020 — 2019 | التصحيح النموذجي لإختبار الثلاثي الأول | Bac 2020 Math

إذا أردت أن تنجح بحق، ستجد طريقا ما، وإذا كنت لا تريد فستجد عذرا.

التمرين الأول: (04 نقاط)

نبين صحة أو خطأ الجمل مع التعليل :

1 خطأ لأن : $\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\dfrac{e^x(e^x-e^{-x})}{e^x(e^x+e^{-x})}=\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$.

2 صحيح لأن : $\ln(3e^{\pi})=\ln 3+\ln e^{\pi}=\ln 3+\pi$.

3 خطأ لأن : حلول المعادلة التفاضلية $y'=2y$ هي من الشكل : $y=f(x)=ke^{2x}$, حيث k عدد حقيقي كيفي.

4 خطأ لأن : المتراجحة $e^{1-2x}>e^{x+1}$ لها الحلول $S=]-\infty;0[$.

5 صحيح لأن : $\lim\limits_{x\to-\infty}\ln(e^x+4)=\ln 4=\ln 2^2=2\ln 2$.

التمرين الثاني: (08 نقاط)

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x)=(x-1)e^{-x}+2$

1 $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\boxed{-\infty}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}+2\right)=\boxed{2}$

لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g'(x)=(2-x)e^{-x}$ ومنه إشارة $g'(x)$ من نفس إشارة $(2-x)$ وجدول تغيراتها يعطى بالشكل :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$e^{-2}+2$	↘	2

2 إثبات أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-0.38,-0.37[$.

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]-\infty,2[$ ومنه على المجال : $]-0.38,-0.37[$.

وبما أن $g(-0.37)\times g(-0.38)<0$ فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-0.38,-0.37[$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3 إشارة $g(x)$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

✍ نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=2x+1-xe^{-x}$

1 لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=2-e^{-x}+xe^{-x}=(x-1)e^{-x}+2$ ومنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=g(x)$

2 دراسة تغيرات الدالة f

إشارة $f'(x)$ هي من نفس إشارة $g(x)$ ولدينا ايضا $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$

جدول التغيرات :

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3 لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-2x-1]=\lim\limits_{x\to+\infty}-xe^{-x}=0$ ومنه المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=2x+1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

4 لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (Δ) ندرس إشارة الفرق $f(x)-(2x+1)$

لدينا $f(x)-(2x+1)=-xe^{-x}$ ومنه فإن إشارة الفرق هي عكس إشارة x

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(2x+1)$	$+$	$\|\|$	0		$-$
الوضعية	(C_f) فوق (Δ)	$\|\|$	(C_f) تحت (Δ)		

5 إثبات أن المنحنى يقبل نقطة انعطاف .

لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f''(x)=g'(x)$ ومنه

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	

بما أن $f''(x)$ تعدم مغيرة إشارتها عند 2 فإن النقطة $\left(2;5-\dfrac{2}{e^2}\right)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)


6 إثبات أن : $f(\alpha)=\dfrac{2\alpha^2+\alpha-1}{\alpha-1}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

$e^{-\alpha} = -\dfrac{2}{\alpha - 1}$ تكافئ $g(\alpha) = 0$

ومنه: $f(\alpha) = 2\alpha + 1\alpha - e^{-\alpha} = 2\alpha + 1 + \dfrac{2\alpha}{\alpha - 1} = \dfrac{2\alpha^2 + \alpha - 1}{\alpha - 1}$

7 رسم المنحنى (C_f)



✍ (Δ_m) مستقيم معادلته $y = 2x + m$ حيث m عدد حقيقي

1 تعيين m حتى يكون (Δ_m) مماسا للمنحنى (C_f) في نقطة يطلب تعيين إحداثياتها.

المستقيم $y = 2x + m$ مماسا للمنحنى (C_f) في نقطة x_0 منه يعني : $f'(x_0) = 2$ اي أن $g(x) = 2$ ومنه $(x-1)e^{-x} = 0$ وبالتالي $x_0 = 1$

لدينا : $f(1) = 3 - e^{-1}$ ومنه معادلة المماس هي $y = 2x + 1 - e^{-1}$ بالمطابقة نجد $m = 1 - e^{-1}$

2 المناقشة البيانية :

$m = -xe^{-x} + 1$ يعني $\dfrac{x}{e^x} + 1 - m = 0$ بإضافة $2x$ للطرفين نجد $m + 2x = -xe^{-x} + 1 + 2x$ أي أن $m + 2x = f(x)$

ومنه حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم (Δ_m), لدينا عندئذ :

✍ إذا كان $m \in]-\infty, 1 - e^{-1}[$ المعادلة لا تقبل حلولا .

✍ إذا كان $m = 1 - e^{-1}$ للمعادلة حل مضاعف .

✍ إذا كان $m \in]1 - e^{-1}, 1[$ للمعادلة حلان .

✍ إذا كان $m \succ 1$ للمعادلة حل وحيد.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

✍ g هي الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = \dfrac{2x^2}{x^2+1} - \ln(x^2+1)$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

1 دراسة اتجاه تغير الدالة g:

♥ النهايات: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

♥ الدالة المشتقة: g تقبل الاشتقاق على $]0;+\infty[$ و لدينا: $g'(x) = \frac{4x}{(x^2+1)^2} - \frac{2x}{x^2+1}$

أي: $g'(x) = \frac{-2x^2(x-1)}{(x^2+1)^2}$

♥ جدول التغيرات:

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	0	↗	$1-\ln(2)$	↘	$-\infty$

2 الدالة g معرفة ، مستمرة و متناقصة تماما على المجال $]1;+\infty[$ و $g(1) = 1-\ln 2 > 0$

و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ أي: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) < 0 \times g(1)$. إذن : حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]1;+\infty[$.

♥ ايجاد حصر لـ α :

$g(\frac{3}{2}) = \frac{9}{13} - \ln(\frac{13}{4}) \simeq 0.21$ و $g(\frac{5}{2}) = \frac{25}{29} - \ln(\frac{29}{4}) \simeq -0.26$ ومنه: $g(\frac{3}{2}) \times g(\frac{5}{2}) < 0$

و بما أن $]1;+\infty[\supset \left[\frac{3}{2};\frac{5}{2}\right]$ فإن $\frac{3}{2} < \alpha < \frac{5}{2}$ و منه $\boxed{1.9 < \alpha < 2}$

x	1.7	1.8	1.9	2
$g(x)$	0.13	0.08	0.04	-0.01

3 إشارة $g(x)$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	0	$+$	0	$-$	

✍ f هي الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(x^2+1)}{x}\ , \ x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1 $\lim\limits_{x\to0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim\limits_{x\to0} \frac{\ln(x^2+1)}{x^2} = \lim\limits_{t\to0} \frac{\ln(t+1)}{t} = 1$

2 بما أن $\lim\limits_{x\to0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 1$ فإن f تقبل الاشتقاق عند 0 و لدينا $f'(0) = 1$

♥ معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0. $(T) : y = f'(0)(x-0) + f(0)$

و منه $(T) : y = x$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

3 التحقق أنه من أجل كل x من $]0,+\infty[$ $x \in$

$$\begin{aligned}\frac{2\ln x}{x}+\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right) &= \frac{2\ln x}{x}+\frac{1}{x}\ln\left(\frac{x^2+1}{x^2}\right)\\ &= \frac{2\ln x}{x}+\frac{1}{x}\ln\left(x^2+1\right)-\frac{1}{x}\ln(x^2)\\ &= \frac{2\ln x}{x}+\frac{1}{x}\ln\left(x^2+1\right)-\frac{2\ln x}{x}\\ &= \frac{1}{x}\ln\left(x^2+1\right)\\ &= \boxed{f(x)}\end{aligned} \qquad f(x)=\frac{2\ln x}{x}+\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)$$

♥ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0 \text{ و منه } \begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln x}{x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\ln(1+\frac{1}{x^2})=0\end{cases}$$

4 الاثبات أن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ من أجل $]0,+\infty[$ $x \in$: $f'(x)=\dfrac{\frac{2x}{x^2+1}.x-\ln(x^2+1)}{x^2}=\dfrac{g(x)}{x^2}$

5 إشارة $f'(x)$ مثل إشارة $g(x)$:

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	

♥ جدول تغيرات f:

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0

6 الاثبات أن : $f(\alpha)=\dfrac{2\alpha}{(\alpha^2+1)}$; لدينا : $g(\alpha)=0$ أي: $\dfrac{2\alpha^2}{\alpha^2+1}-\ln(\alpha^2+1)=0$

و منه : $\ln(\alpha^2+1)=\dfrac{2\alpha^2}{\alpha^2+1}$ و بالتالي: $f(\alpha)=\dfrac{\ln(\alpha^2+1)}{\alpha}=\dfrac{2\alpha^2}{\alpha(\alpha^2+1)}=\dfrac{2\alpha}{(\alpha^2+1)}$

♥ حصر $f(\alpha)$: لدينا: $2<\alpha<1.9$ و منه : $4<2\alpha<3.8$ و $5<\alpha^2+1<4.61$

و منه: $\dfrac{1}{4.61}<\dfrac{1}{\alpha^2+1}<\dfrac{1}{5}$ وبالتالي: $\dfrac{4}{4.61}<\dfrac{2\alpha}{\alpha^2+1}<\dfrac{3.8}{5}$ أي: $0.76<f(\alpha)<0.87$


7 انشاء (T) و (C_f)

8 إنشاء (C_h) منحنى الدالة h

إذا كان $x>0$ فإن $-x<0$ و لدينا: $h(-x)=\dfrac{\ln((-x)^2+1)}{-x}=-\dfrac{\ln(x^2+1)}{x}=-f(x)$

ومنه (C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة الى مبدأ المعلم.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com



Bac 2020 Math

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com