najah213.com · نجاح 213

المستوى: 3ع ت + 3 تر الأستاذ: حليس محمد الموسم الدراسي: 2020-2021

المتابعة الزمنية بواسطة المعايرة اللونية

الهدف من التجربة: متابعة تشكل I_2 في تفاعل كيميائي بواسطة معايرته بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+ + S_2O_3^{2-}\right)_{aq}$

التجربة:

نمزج محلول يود البوتاسيوم $\left(K^+ + I^-\right)_{aq}$ له $\left(C_1 = 5\times10^{-1} mol/l; V_1 = 40ml\right)$ مع محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $\left(2K^+ + S_2O_8^{2-}\right)_{aq}$ له $\left(C_2 = 10^{-1} mol/l; V_2 = 10ml\right)$.

I- 1- نلاحظ تحول المزيج من اللون الشفاف الى اللون الأسمر تدريجيا، الى ماذا يرجع هذا اللون الأسمر؟

.....

2- على ضوء ما درست صنف التحول الكيميائي الحادث. .....

3- اكتب معادلة هذا التحول الكيمائي نسميه التفاعل -1- حيث تعطى الثنائيتين: $(I_2 / I^-);(S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-})$

.....

.....

.....


4- ضع جدول التقدم لهذا التفاعل ثم احسب كمية مادة الابتدائية للمتفاعلات.

II- لتعين كمية مادة ثنائي اليود $(I_2)_{aq}$ المتشكلة في الوسط التفاعلي السابق في كل لحظة t نقوم بمعايرته بواسطة محلول *ثيوكبريتات الصوديوم ذو اللون الشفاف* $\left(2Na^+ + S_2O_3^{2-}\right)_{aq}$ تركيزه $(C_3 = 5\times10^{-3} mol/l)$

مبدأ المعايرة

الخطوات التجريبية لبدأ معايرة ثنائي اليود $(I_2)_{aq}$ المتشكل :

- نقسم المزيج التفاعلي الأول الى ثماني عينات مثلا حجم الواحدة $V = 2ml$
- في لحظة معتبرة (في التجربة نأخذ $t = 5\min$) نأخذ العينة رقم 1
- نسكب العينة في بيشر به ماء بارد ثم *نضيف قطرات من صمغ النشأ الذي يلون البيشر باللون الأزرق* ونبدأ بمعايرتها بمحلول *ثيوكبريتات الصوديوم معلوم التركيز* **– كما في الشكل المقابل-** ، *نواصل المعايرة الى ان يختفي*



المخطط التجريبي لعملية المعايرة

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

اللون الأزرق (نقطة التكافؤ) ونسجل حجم التكافؤ V_{eq} ونكمل بنفس الطريقة على باقي

العينات كل **5** دقائق فنحصل على النتائج في الجدول التالي:

$t(\min)$	5	10	15	20	25	30	35	40
$V_{eq}(ml)$	8	12	14	15.2	15.6	16	16	16

1- لماذا نضيف الماء البارد للعينة المراد معايرتها؟

.....

2- اكتب معادلة تفاعل المعايرة نسميه تفاعل -2- ، تعطى الثنائيتين: $(I_2 / I^-);(S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-})$

.....

.....

.....

وماهي خصائص هذا التفاعل؟ .....

3- أنشئ جدول التقدم تفاعل المعايرة.

4- عند التكافؤ: اوجد $n(I_2)$ كمية مادة اليود المتشكلة في حجم $2ml$ عند اللحظة المعتبرة بدلالة $C_3;V_{eq}$ ثم اوجد $n'(I_2)$ المتشكلة عند نفس اللحظة في $V_T = 50ml$.

5- بالاعتماد على جدول التقدم للتفاعل -1- استنتج العلاقة بين x و $n(I_2)$ المتشكل في الوسط الكلي ثم أكمل الجدول التالي:

$t(\min)$	5	10	15	20	25	30	35	40
$n(I_2)$								
$x(mmol)$								

6- ارسم المنحى $x = f(t)$ - ماذا تستنتج؟

7- استنتج تركيب المزيج التفاعلي -1- عند اللحظة $t = 15\min$ (اعتمد على جدول التقدم للتفاعل)

<u>واجب منزلي:</u>

اوجد العلاقة بين $n(S_2O_8^{2-})_t$ **و** $x(t)$ **ثم ارسم المنحنى** $n(S_2O_8^{2-}) = f(t)$ **باستعمال سلم رسم مناسب.**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً