najah213.com · نجاح 213

وزارة التربية الوطنية

ثانوية أحمد طالب الدوسن

الشعبة : 3 تقني رياضي — يوم 03 مارس 2019

اختبار الفصل الثاني في مادة: التكنولوجيا (هندسة الطرائق) — المدة: **03** ســـا

التمرين الأول: (05ن)

I-1 **فحم هيدروجيني عطري** (A) **صيغته العامة من الشكل** C_xH_y **كثافته البخارية** 3.17 **تمثل نسبة الكربون فيه** 91.3%

- **جد الصيغة المجملة للمركب** (A) **واكتب صيغته النصف المفصلة .**

2. **من أجل تحضير** Banzocaine **الذي يستعمل كمخدر نجري على**(A) **سلسلة التفاعلات التالية :**

$$A + Cl_2 \xrightarrow{UV} B + HCl$$

$$B + Mg \xrightarrow{ROR} C$$

$$C + CH_3\text{-}Cl \longrightarrow D + MgCl_2$$

$$D + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} E_{para} + 2\,H_2O$$

$$E \xrightarrow{LiAlH_4/H_2O} F$$

$$F \xrightarrow{KMnO_4/H_2SO_4} G + CO_2 + 2H_2O$$

$$G + \text{Ethanol} \longrightarrow H\ (\text{Banzocaine})$$

أ. **جد الصيغ نصف المفصلة لـ:** B , C , D , E , F , G, H.

ب. **ماهي الوظائف الكيميائية الموجودة في مركب** (Banzocaine)

ج. **اقترح معادلات التفاعلات التي تسمح بتحضير المركب** (A) **انطلاقا من البنزن وكواشف شائعة أخري.**

II- **للحصول على بوليمير**(P) **انطلاقا من المركب** (G) **نجري التفاعل التالي :**

$$nG \longrightarrow P$$

1. **اكتب معادلة التفاعل بإيجاد الصيغة العامة للبوليمير** P .
2. **ما نوع البلمرة الحادثة وصنفها ؟**
3. **نوع البوليمير الناتج .**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

4. اعط أهم استخداماته .

يعطى: C= 12g/mol , O= 16g/mol , H= 1g/mol , I=127g/mol

:

التمرين الثاني (05ن)

I. يحتوي ثلاثي غليسريد متجانس على 10.82% من الأكسجين و يثبت 3mol من اليود .

1. أوجد الكتلة المولية لثلاثي الغليسريد .

2. أوجد صيغة الحمض الدهني المكون لثلاثي الغليسريد .

3. اكتب الصيغة نصف المفصلة لهذا الغليسريد الثلاثي .

II. نزن كتلة m=10g من زيت نباتي ونذيبها في الكحول ونضيف قطرات من الفينول فتالين ثم نعاير دون تسخين بواسطة محلول قاعدي من KOH (0.2N) فيتطلب 3ml .

1. عرف دليل الحموضة I_A.

2. احسب I_A لهذا العينة من الزيت النباتي .

3. إذا علمت أن أكسدة أحد الأحماض الدهنية المشكلة لهذه العينة بواسطة $KMnO_4$ في وسط حمضي أنتجت ثلاث أحماض كربوكسيلية .

الأولي : ثنائية الوظيفة الكربوكسيلية ولها 9ذرات كربون .

الثانية : ثنائية الوظيفة الكربوكسيلية ولها 3 ذرات كربون .

الثالثة : أحادية الوظيفة الكربوكسيلية ولها 6 ذرات كربون .

أ. أوجد الصيغة النصف المفصلة لهذا الحمض الدهني .

ب. أكتب رمزه .

يعطى : $M(M)=39(g/mol).....M(O)=16(g/mol).....M(H)=1(g/mol)$

$C_n:3\Delta^{9.12.15}$ $C_n:0$ $C_n:1\Delta^{9}$. $C_n:2\Delta^{9.12}$.

التمرين الثالث : (05.5ن)

✓ يمكن أن ترتبط الأحماض الأمينية التالية : Gly-Cys-Asp-Phe بروابط ببتيدية .

1) عرف الرابطة الببتيدية .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

2) أكتب الصيغة النصف المفصلة للببتيد وما إسمه ؟

3) يعطي الببتيد السابق نتيجة إيجابية مع كاشف كزانتو بروتيك .ماذا تستنتج ؟

4) أكتب الصيغة الأيونية للببتيد عند PH=13 . PH=1 .

5) حمض فنيل ألانين له : $pKa_1=1.83$, $pKa_2=9.13$.

أ. احسب pH_i لحمض فنيل ألانين Phe

ب. اكتب صيغة فنيل ألانين Phe عند كل من : pH_i , PH= 11 , PH= 1

6) – أخضع مزيج الأحماض الأمينية في الوثيقة (1) إلى عملية الهجرة الكهربائية

على الورق عند PH=5.07

- مثل بمخطط نتائج الهجرة مع التعليل ؟

7) أكمل التفاعلات التالية

2Cys ——— -2H ——— .....

Gly ——— Enzyme ——— .....+ CO_2

Asp + HNO_2 ——— .....+ N_2 + H_2O

يعطى:

صيغة الجذر	سيستئين Cys	حمض النسبارتيك Asp	الغليسين Gly	فنيل ألانين Phe
-R	pH_i= 5 .07	pH_i= 2 .77	pH_i= 5 .97	pH_i= ?
	$HS-CH_2-$	$HOOC-CH_2-$	$H-$	$C_6H_5-CH_2-$

التمرين الرابع (4.5ن)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

✓ يتم تحضير البولي ستيران في المخبر على مرحلتين :

المرحلة الأولى	المرحلة الثانية
نضع في بيشر 20ml من الستيران مع 10ml من NaOH مع الخلط ثم التركيد نفصل الطبقتين نجفف الستيران بإضافة Na_2SO_4 والقطن	في أنبوب اختبار نضع 20ml من الستيران المعالج .نضيف له 0 .5g من فوق اكسيد البنزويل بعد التبريد لمدة عشرين دقيقة نضيف 15ml من الميثانول حتى تشكل راسب ابيض من البولي ستيران

المطلوب :

1. اعط عنوان كل مرحلة من مرا حل تحضير البولي ستيران .
2. ما هو دور NaOH في المرحلة الأولى و فوق أكسيد البنزويل في المرحلة الثانية
3. أحسب كتلة الستيران الابتدائية إذا كانت كثافته d= 0.9
4. احسب مردود تفاعل البلمرة إذا علمت ان كتلة البولي ستيران المتحصل عليها في نهاية التجربة هي 17.1g
5. مثل مقطعا من 4 وحدات بنائية للبولي ستيران .

يعطى: C= 12g/mol ; O= 16g/mol ; H= 1g/mol . N=14g /mol

"انتـــــــــــهى "

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com