najah213.com · نجاح 213

التمرين 01:

1. $(u_n)_{n\in N}$ متتالية حسابية متناقصة حدها الأول u_0 و أساسها r .

أ- عين u_2 و r علما أن

$$\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 24 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 210 \end{cases}$$

ب- استنتج u_n بدلالة n ثم احسب المجموع :

$$s_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$$

2. نعتبر المتتالية $(v_n)_{n\in N}$ المعرفة كما يلي :

$$v_n = e^{14-3n}$$

أ- بين أن $(v_n)_{n\in N}$ متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها

ب- احسب المجمـــــــــوع

$$T_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$$

و الجداء $P_n = v_0 . v_1 . v_2 . \ldots . v_n$

ج - احسب $\lim_{n\to+\infty} T_n$ و $\lim_{n\to+\infty} P_n$

التمرين 02:

لتكن المتتالية $(u_n)_{n\in N}$ المعرفة كما يلي :

$u_0 = \frac{5}{2}$ و $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2$

1. أ- ارسم في معلم متعامد و متجانس $(o,\vec{i},\vec{j})$ ، المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ و المنحنى (d) الممثل للدالة f المعرفة على R ب :

$$f(x) = \frac{2}{3}x + 2$$

ب- باستعمال الرسم السابق مثل على حامل محور الفواصل الحدود : u_0، u_1، u_2 و u_3 و u_4

ج- ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها

2.أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leq 6$

ب- تحقق أن (u_n) متزايدة

ج- هل (u_n) متقاربة ؟ برر إجابتك.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n :

$$v_n = u_n - 6$$

أ- أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

ب- أكتب عبارة u_n بدلالة n ثم استنتج $\lim_{n\to+\infty} u_n$

التمرين 03:

(u_n) متتالية عددية معرفة ب

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{1}{2-u_n} \end{cases}$$

1. احسب الحدود : u_1 ، u_2 و u_3 و ضع تخمينا حول اتجاه التغير (u_n)

2. أثبت أنه لكل عدد طبيعي n فإن : $u_n < 1$

3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) . بين أن (u_n) متقاربة و احسب نهايتها .

4.نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة بـ :

$$v_n = \frac{1}{1-u_n}$$

أ- احسب الحدود : v_0 ، v_1 و v_2

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

ب-برهن أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها .

ج- أحسب v_n ثم u_n بدلالة n ، استنتج من جديد نهاية المتتالية (u_n)

5.احسب المجموع

$$s_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$$

و الجداء : $\pi_n = u_0.u_1 \ldots . u_n$

التمرين 04:

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n\in N}$ المعرفة

كما يلي : $n \in N$ $\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \frac{4u_n+1}{u_n+4} \end{cases}$

1. أ- احسب u_1 و u_2

ب- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ،

$$u_n > 1$$

ج- ادرس رتابة المتتالية $(u_n)_{n\in N}$

ثم استنتج أنها متقاربة

2. نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرفة لكل عدد طبيعي n ب: $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+1}$

أبرهن أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول

ب- احسب v_n بدلالة n

ج – استنتج أن : $u_n = \frac{5^{n+1}+3^{n+1}}{5^{n+1}-3^{n+1}}$

ثم احسب $\lim u_n$

1. احسب بدلالة n كلا من

$$s_n = v_0^2 + v_1^2 + \cdots + v_n^2$$

والجداء $P_n = v_0.v_1.v_2. \ldots . v_n$

التمرين 05:

1. $(u_n)_{n\in N}$ متتالية هندسية حدودها موجبة حيث :

$$\ln u_1 + \ln u_5 = -12$$

$$\ln u_2 - \ln u_4 = 4$$

- عين أساس هذه المتتالية الهندسية وحدها u_0 أحسب u_n بدلالة n

- احسب المجموع

$$s_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$$

ثم $\lim_{n\to+\infty} s_n$

2. المتتالية العددية المعرفة كما يلي $(v_n)_{n\in N}$

$$v_n = \ln u_n + \ln u_{n+1}$$

- بين أن $(v_n)_{n\in N}$ متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها .

- نسمي T_n المجموع :

$T_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$. عين العدد الطبيعي n حتى يكون : $T_n^2 = 2^{30}$

التمرين 06:

I) المتتالية (v_n) معرفة على N ب :

$$v_n = \frac{5^{n+1}}{6^n}$$

1.بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد اساسها وحدها الاول

2. احسب $\lim_{n\to+\infty} v_n$.

II) المتتالية (u_n) المعرفة ب $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6}$

1. برهن بالتراجع من اجل كل عدد طبيعي n : $1 \le u_n \le 6$.

Mohamed

2. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)

3. أ. برهن من اجل كل عدد طبيعي n :

$$6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$$

ب. بين انه من اجل كل عدد طبيعي n :

$$0 \leq 6 - u_n \leq v_n$$

استنتج $\lim_{n \to +\infty} u_n$

التمرين 07:

1. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $I = [1,2]$ بالعبارة

$$f(x) = \frac{x+2}{-x+4}$$

أ-بين أن الدالة f متزايدة تماما على I

ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال I ، $f(x)$ ينتمي إلى I .

2. (u_n) هي المتتالية العددية المعرفة على N كما يأتي : $u_0 = \frac{3}{2}$ و $u_{n+1} = f(u_n)$

أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n، u_n ينتمي إلى I

ب- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة

3. أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 1 + \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n + 1}$

ب- عين النهاية : $\lim_{n \to +\infty} u_n$

التمرين 08:

لتكن المتتالية (u_n) و المتتالية (v_n) المعرفتين كما يلي :

$u_0 = 12$ ، $v_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}$$

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4}$$

نضع من أجل كل عدد طبيعي n :

$w_n = u_n - v_n$ و $t_n = 3u_n + 8v_n$

1. أثبت أن المتتالية (w_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

2. أحسب w_n بدلالة n ما هي نهاية (w_n) ؟

3. أثبت أن المتتالية (t_n) متتالية ثابتة . ما هي نهاية (t_n)؟

4. أثبت أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان .

5. استنتج نهاية u_n و نهاية v_n

التمرين 09:

I) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على N بحدها العام : $u_n = e^{\frac{1}{2}n}$

1. بين أن (u_n)متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الاول.

2. احسب $\lim_{n \to +\infty} u_n$. وماذا تستنتج ؟

3. احسب بدلالة n المجموع S_n حيث

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$$

Mohamed about

II) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من اجل كل عدد طبيعي n : $v_n = \ln(u_n)$.

1. عبر عن v_n بدلالة n ثم استنتج نوع المتتالية (v_n).

2. أ- احسب بدلالة n العدد p_n حيث :

$$p_n = \ln(u_0 \times u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n)$$

ب- عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n بحيث : $p_n + 4n > 0$.

التمرين 10:

(u_n) متتالية معرفة على N بـ

$$u_0 = e^3 \text{ و } u_{n+1} = e\sqrt{u_n}$$

(v_n) متتالية معرفة على N بـ

$$v_n = \ln(u_n) - 2$$

1. بين أن المتتالية (v_n) هندسية ، عين اساسها و حدها الأول .

2. استنتج v_n ثم $\ln(u_n)$ بدلالة n .

3. أ- ما هي نهاية المتتالية (v_n)

ب- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة نحو e^2

التمرين 11:

/) لتكن (v_n) متتالية معرفة كما يلي

$$\begin{cases} v_0 = \alpha \\ v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n + \frac{9}{4} \end{cases}$$

-عين α حتى تكون (v_n) ثابتة

//) نضع $\alpha = 4$

1. احسب v_1 ، v_2 و v_3

2. نعرف (u_n) كمايلي : $u_n = v_n - 3$

أ- أثبت أن (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول

ب- اكتب u_n و v_n بدلالة n

ج- احسب المجموع

$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ بدلالة n

د- احسب المجموع

$S'_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ بدلالة n

ه- احسب المجموع

$$Q_n = u_0 + 4u_1 + 4^2u_2 + 4^3u_3 + .. + 4^n u_n$$

بدلالة n

و- احسب الجداء

$P_n = u_0.u_1.u_2 \dots .u_n$ بدلالة n

التمرين 12:

لتكن (u_n)متتالية معرفة كما يلي :

$$u_0 = 1 \text{ و } u_1 = 2$$

$$u_{n+2} = \frac{3}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$$

1. لتكن (v_n) المتتالية المعرفة كمايلي :

$$v_n = u_{n+1} - u_n$$

-برهن أن (v_n) متتالية هندسية عين أساسها و حدها الأول

2. استنتج v_n بدلالة n

3. برهن أنه من أجل كل n

$$u_n = u_0 + (v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1})$$

4. استنتج u_n بدلالة n

Mohamed abou

najah213.com · نجاح 213

تمرين 01 ص

(u_n) حسابية متناقصة

$$\begin{cases} u_1+u_2+u_3=24 & (1) \\ u_1^2+u_2^2+u_3^2=210 & (2) \end{cases}$$

1) عين u_2 و r

لدينا الوسط الحسابي:

$$u_1+u_3=2u_2$$

نعوض في (1)

$$u_1+u_3+u_2=24$$

$$2u_2+u_2=24$$

$$3u_2=24$$

$$\boxed{u_2=8}$$

الأساس r:

لدينا:

$$u_3=u_2+(3-2)r=8+r$$

$$u_1=u_2+(1-2)r=8-r$$

نعوض في المعادلة (2)

$$u_1^2+u_2^2+u_3^2=210$$

$$(8-r)^2+8^2+(8+r)^2=210$$

$$64+r^2-16r+64+64+r^2+16r=210$$

$$2r^2+192=210$$

$$2r^2=18$$

$$r^2=9$$

أو $\begin{cases} r=3 & \text{مرفوض} \\ r=-3 & \text{مقبول} \end{cases}$

لأنها متناقصة

لدينا:

$$u_0=u_2+(0-2)r$$

$$=8-2(-3)=14$$

ب) u_n بدلالة n

$$u_n=u_0+nr=14-3n$$

المجموع S_n:

$$S_n=u_0+u_1+\dots+u_n$$

$$=\frac{n+1}{2}(u_0+u_n)$$

$$=\frac{n+1}{2}(14+14-3n)$$

$$S_n=\frac{n+1}{2}(28-3n)$$

ج) نعتبر:

$$v_n=e^{14-3n}$$

1) بين (v_n) متتالية هندسية

هاوليك القانون

$$\boxed{v_{n+1}=q\,v_n}$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

لدينا :

$v_n = e^{14-3n}$

$v_{n+1} = e^{14-3(n+1)} = e^{14-3n-3}$

$= e^{-3} \cdot e^{14-3n}$

$v_{n+1} = e^{-3} \cdot v_n$

إذاً المتتالية (v_n) هندسية أساسها e^{-3}

$v_0 = e^{14-3(0)} = e^{14}$

ب) حساب المجموع :

$T_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$

$= v_0 \dfrac{q^{n+1}-1}{q-1} = e^{14} \dfrac{(e^{-3})^{n+1}-1}{e^{-3}-1}$

$= e^{14} \dfrac{e^{-3n-3}-1}{e^{-3}-1}$

الجداء :

$P_n = v_0 \times v_1 \times \cdots v_n$

$= e^{14} \times e^{11} \times e^{8} \times \cdots e^{14-3n}$

$= e^{14+11+8+\cdots(14-3n)}$

عبارة على مجموع متتالية حسابية أساسها -3

وحدها الأول 14

و $14-3n$ آخر حد

$P_n = e^{\frac{n+1}{2}(14+14-3n)}$

$P_n = e^{\frac{n+1}{2}(28-3n)}$

ج) حساب :

$\lim\limits_{n\to+\infty} T_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \left[e^{14} \dfrac{e^{-3n-3}-1}{e^{-3}-1} \right]$

$= \dfrac{-e^{14}}{e^{-3}-1}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} P_n = \lim\limits_{n\to+\infty} e^{\frac{n+1}{2}(28-3n)} = 0$

التمرين 4 (5 نقاط)

$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2 \\ u_0 = \frac{5}{2} \end{cases}$


1) أ) رسم (C_f) وتمثيل الحدود u_2, u_1, u_0

$f(n) = \frac{2}{3}n + 2$

n	0	6
f	2	6

$y = x$

n	0	2
y	0	2



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1) تحقق:

بما أن: $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$

فإن (u_n) متزايدة

وبما أنها تؤول إلى نهاية

محدودة فهي متقاربة نحو 6.

2) البرهان بالتراجع:

$u_n \leq 6$

نثبت صحة الشرط الابتدائي

$u_0 = \frac{5}{2}$ و $\frac{5}{2} \leq 6$

محقق

نفرض $u_n \leq 6$ صحيحة

ونبرهن صحة u_{n+1}

لدينا:

$u_n \leq 6$

$\frac{2}{3}u_n \leq 6 \cdot \frac{2}{3}$

$\frac{2}{3}u_n \leq 4$

$\frac{2}{3}u_n + 2 \leq 6$

$u_{n+1} \leq 6$

صحيحة ومنه $u_n \leq 6$ صحيحة

ب) تحقيق متزايدة:

$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n + 2 - u_n$

$= -\frac{1}{3}u_n + 2$

لدينا:

$u_n \leq 6$

$-\frac{1}{3}u_n \geq -\frac{1}{3}(6)$

$-\frac{1}{3}u_n + 2 \geq -2 + 2$

أي:

$u_{n+1} - u_n \geq 0$

ومنه (u_n) متزايدة

ج) هل متقاربة؟

نعم متقاربة.

بما أنها متزايدة ومحدودة

من الأعلى فهي متقاربة نحو 6

3) نضع:

$v_n = u_n - 6$

أ) إثبات (v_n) هندسية

$v_{n+1} = q v_n$ فأوجد q.

$v_{n+1} = u_{n+1} - 6$

$= \frac{2}{3}u_n + 2 - 6$

$= \frac{2}{3}u_n - 4$

$= \frac{2}{3}\left[u_n - \frac{4}{\frac{2}{3}}\right]$

$v_{n+1} = \frac{2}{3}[u_n - 6] = \frac{2}{3}v_n$

$\frac{2}{3}$ هي أساس المتتالية

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

لدينا (v_n) حسابية حدها الأول v_0 وأساسها q

$v_0 = u_0 - 6 = \frac{5}{2} - 6 = -\frac{7}{2}$

ب) u_n بدلالة n

أول شيء نكتب v_n بدلالة n

$v_n = v_0 \, q^n = -\frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n$

إذا

$u_n = v_n + 6$

$u_n = -\frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n + 6$

استنتاج النهاية

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \lim\limits_{n \to +\infty} \left[-\frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n + 6\right]$

($\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$)

$= 6$

ومنه متقاربة نحو 6

2) $n = 0, 1, 2, 3$

$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{1}{2 - u_n} \end{cases}$

1) حساب الحدود:

$u_1 = \frac{1}{2 - u_0} = \frac{1}{2 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$

$u_2 = \frac{1}{2 - u_1} = \frac{1}{2 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4}$

$u_3 = \frac{1}{2 - u_2} = \frac{1}{2 - \frac{3}{4}} = \frac{4}{5}$

تخمين: نلاحظ $u_0 < u_1 < u_2$

فإن (u_n) متزايدة

2) البرهان:

$u_n < 1$

نثبت صحة الشرط الابتدائي

$u_0 = \frac{1}{2}$ و $\frac{1}{2} < 1$

محقق

نفرض $u_n < 1$ صحيحة

ونبرهن صحة u_{n+1}

لدينا:

$u_n < 1$

$-u_n > -1$

$2 - u_n > 2 - 1$

$2 - u_n > 1$

نقلب:

$\frac{1}{2 - u_n} < 1$

إذا

$u_{n+1} < 1$

$u_n < 1$ صحيحة ومنه

u_{n+1} صحيحة

3) اتجاه التغير:

$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2 - u_n} - u_n$

$= \frac{u_n^2 - 2u_n + 1}{2 - u_n} = \frac{(u_n - 1)^2}{2 - u_n}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

لدينا:

البسط $u_n < 1$

$u_n - 1 < 0$

موجب $(u_n - 1)^2 < 0$

والمقام $u_n < 1$

كما $-u_n > -1$

فإن $2 - u_n > 1$

موجب

وسنه: $u_{n+1} - u_n > 0$

متزايدة

- بما متقاربة:

بما أن (u_n) متزايدة و محدودة من الأعلى فهي متقاربة نحو 1

- النهاية ℓ:

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \ell$

لدينا:

$u_{n+1} = \frac{1}{2 - u_n}$

يكافئ $\ell = \frac{1}{2 - \ell}$

يكافئ $-\ell^2 + 2\ell = 1$

$\ell^2 - 2\ell + 1 = 0$

$(\ell - 1)^2 = 0$

$\ell - 1 = 0$ يكافئ $\boxed{\ell = 1}$

إذا $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 1$

4) نعتبر:

$v_n = \frac{1}{1 - u_n}$

1) الحدود:

$v_0 = \frac{1}{1 - u_0} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$

$v_1 = \frac{1}{1 - u_1} = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 3$

$v_2 = \frac{1}{1 - u_2} = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} = 4$

ب) بم هي (v_n)؟ حسابية.

هذا القانون $\boxed{v_{n+1} - v_n = r}$

لدينا $v_n = \frac{1}{1 - u_n}$

$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{1 - u_{n+1}} - \frac{1}{1 - u_n}$

$= \frac{1}{1 - \frac{1}{2 - u_n}} - \frac{1}{1 - u_n}$

$= \frac{1}{\frac{1 - u_n}{2 - u_n}} - \frac{1}{1 - u_n} = \frac{2 - u_n}{1 - u_n} - \frac{1}{1 - u_n}$

$= \frac{2 - u_n - 1}{1 - u_n} = \frac{1 - u_n}{1 - u_n} = 1$

حسابية أساسها 1

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تمرين 4

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \dfrac{4u_n + 1}{u_n + 4} \end{cases}$$

1) أ) حساب الحدود :

$$u_1 = \frac{4u_0+1}{u_0+4} = \frac{4\times 4+1}{4+4} = \frac{17}{8}$$

$$u_2 = \frac{4.u_1+1}{u_1+4} = \frac{4.\frac{17}{8}+1}{\frac{17}{8}+4} = \frac{\frac{17}{2}+1}{\frac{49}{8}}$$

$$= \frac{19}{2}\times\frac{8}{49} = \frac{76}{49}$$

ب) برهن بالتراجع :

$u_n > 1$

نغيّر شكل المتتالية :

$$u_{n+1} = a + \frac{b}{u_n+4} = \frac{au_n+4a+b}{u_n+4}$$

بالمطابقة :

$a = 4$

$4a+b = 1$ ولدينا $b = 1-16 = -15$

$$u_{n+1} = 4 - \frac{15}{u_n+1}$$

- نثبت صحة الشرط الابتدائي

$u_0 = 4$ و $4 > 1$ محقق

- نفرض $u_n > 1$ صحيحة

ونبرهن صحة u_{n+1}

2) حساب v_n بدلالة n

$$v_n = v_0 + nr = 2 + n(1)$$

$$\boxed{v_n = 2+n}$$

u_n بدلالة n

لدينا :

$$v_n = \frac{1}{1-u_n}$$

$$1-u_n = \frac{1}{v_n}$$

$$-u_n = \frac{1}{v_n} - 1$$

$$u_n = 1 - \frac{1}{v_n} = \frac{v_n - 1}{v_n}$$

$$u_n = \frac{2+n-1}{2+n} = \frac{n+1}{n+2}$$

النهاية من جديد :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n} = 1$$

5) المجموع والجداء :

$$S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = \frac{n+1}{2}(v_0+v_n)$$

$$= \frac{n+1}{2}(2+2+n) = \frac{n+1}{2}(4+n)$$

$$\pi_n = u_0 \times u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_n$$

$$= \frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}\times\cdots\times\frac{n+1}{2+n}$$

$$\pi = \frac{1}{2+n}$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

لدينا: $U_n > 1$

$U_n + 4 > 5$

تقابليا:

$\frac{1}{U_n+4} < \frac{1}{5}$

نضرب في -15

$\frac{-15}{U_n+4} > \frac{-15}{5}$

نضيف 4

$4 - \frac{15}{U_n+4} > -3+4$

$U_{n+1} > 1$

محيحة ومنه $U_n > 1$

ج) الإشارة:

$U_{n+1} - U_n = \frac{4U_n+1}{U_n+4} - U_n$

$= \frac{4U_n+1-U_n^2-4U_n}{U_n+4} = \frac{-U_n^2+1}{U_n+4}$

$= \frac{(1-U_n)(1+U_n)}{U_n+4}$

لدرس الإشارة

لدينا: $U_n > 1$

موجب $1+U_n > 2$

موجب $U_n+4 > 5$

و: $-U_n < -1$

سالب $1-U_n < 0$

إذا

$U_{n+1} - U_n < 0$

متناقصة

استنتاج التقارب:

(U_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة نحو 1

ب) نعتبر:

$V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 1}$

1) برهن (V_n) هندسية:

$V_{n+1} = \frac{U_{n+1}-1}{U_{n+1}+1} = \frac{\frac{4U_n+1}{U_n+4} - 1}{\frac{4U_n+1}{U_n+4} + 1}$

$= \frac{\frac{3U_n-3}{U_n+4}}{\frac{5U_n+5}{U_n+4}} = \frac{3U_n-3}{5U_n+5}$

$= \frac{3}{5}\frac{U_n-1}{U_n+1} = \frac{3}{5}V_n$

هندسية أساسها $\frac{3}{5}$

$V_0 = \frac{U_0-1}{U_0+1} = \frac{4-1}{4+1} = \frac{3}{5}$

2) V_n بدلالة n

$V_n = V_0 \cdot q^n = \frac{3}{5}\left(\frac{3}{5}\right)^n = \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}$

3) استنتاج U_n:

لدينا:

$V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 1}$

بكاقتي

$V_n \cdot U_n + V_n = U_n - 1$

$V_n U_n - U_n = -V_n - 1$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

$u_n(v_n - 1) = -v_n - 1$

$u_n = \dfrac{-v_n - 1}{v_n - 1} = -\dfrac{v_n + 1}{v_n - 1}$

$= -\dfrac{\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} + 1}{\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} - 1} = -\dfrac{\frac{3^{n+1}}{5^{n+1}} + 1}{\frac{3^{n+1}}{5^{n+1}} - 1}$

$= -\dfrac{\frac{3^{n+1} + 5^{n+1}}{5^{n+1}}}{\frac{3^{n+1} - 5^{n+1}}{5^{n+1}}} = -\dfrac{3^{n+1} + 5^{n+1}}{3^{n+1} - 5^{n+1}}$

$u_n = \dfrac{5^{n+1} + 3^{n+1}}{5^{n+1} - 3^{n+1}}$ وهو المطلوب.

حساب النهاية:

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \lim\limits_{n \to +\infty} \left[-\dfrac{v_n + 1}{v_n - 1}\right]$

لدينا:

$\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = \lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} = 0$

أي أن

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \lim\limits_{n \to +\infty} \left[-\dfrac{v_n + 1}{v_n - 1}\right] = 1$

ب) حساب بدلالة n

$S_n = v_0^2 + v_1^2 + \cdots + v_n^2$

لدينا:

متتالية هندسية (v_n)

$v_0 = \frac{3}{5}$ يعني $v_0^2 = \frac{9}{25}$

$q = \frac{3}{5}$ يعني $q^2 = \frac{9}{25}$

أي أن

$S_n = v_0^2 \dfrac{(q^2)^{n+1} - 1}{q^2 - 1}$

$= \dfrac{9}{25} \dfrac{\left(\frac{9}{25}\right)^{n+1} - 1}{\frac{9}{25} - 1} = \dfrac{9}{25} \dfrac{\left(\frac{9}{25}\right)^{n+1} - 1}{-\frac{16}{25}}$

$= -\dfrac{9}{16}\left[\left(\frac{9}{25}\right)^{n+1} - 1\right]$

$= \dfrac{9}{16}\left[1 - \left(\frac{9}{25}\right)^{n+1}\right]$

الجداء

$P_n = v_0 \times v_1 \times v_2 \times \cdots v_n$

$P_n = \left(\frac{3}{5}\right)^1 \times \left(\frac{3}{5}\right)^2 \times \left(\frac{3}{5}\right)^3 \times \cdots \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}$

$= \left(\frac{3}{5}\right)^{1+2+3+\cdots+(n+1)}$

مجموع متتالية حسابية حدها الأول 1، وأخير $n+1$

$P_n = \left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{n+1}{2}(1+1+n)}$

$P_n = \left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{n+1}{2}(2+n)}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تمرين 05 :

(U_n) متتالية هندسية حدودها موجبة

$$\begin{cases} \ln U_2 - \ln U_4 = 4 \quad (1) \\ \ln U_1 + \ln U_5 = -12 \quad (2) \end{cases}$$

- تعيين الأساس q :

من المعادلة (1) نجد :

$$\ln U_2 - \ln U_4 = 4$$

لدينا :

$$U_4 = U_2 q^2$$

نعوض :

$$\ln U_2 - \ln(U_2 \cdot q^2) = 4$$

$$\ln U_2 - (\ln U_2 + \ln q^2) = 4$$

$$-2\ln q = 4$$

$$\ln q = -2$$

$$\boxed{q = e^{-2}}$$

تعيين U_0 :

$$U_5 = U_0 q^5 = U_0 (e^{-2})^5 = U_0 e^{-10}$$

$$U_1 = U_0 q^1 = U_0 e^{-2}$$

نعوض (1) و (2) :

$$\ln U_1 + \ln U_5 = -12$$

$$\ln U_0 e^{-2} + \ln U_0 e^{-10} = -12$$

$$\ln U_0 + \ln e^{-2} + \ln U_0 + \ln e^{-10} = -12$$

$$2\ln U_0 - 2\ln e - 10\ln e = -12$$

$$2\ln U_0 - 2 - 10 = -12$$

$$2\ln U_0 = 0$$

$$\ln U_0 = 0$$

$$U_0 = e^0 = 1$$

$$\boxed{U_0 = 1}$$

عبارة الحد العام U_n بدلالة n :

$$U_n = U_0 q^n = 1(e^{-2})^n$$

$$\boxed{U_n = e^{-2n}}$$

حساب S_n بدلالة n :

$$S_n = U_0 + U_1 + \cdots + U_n$$

$$= U_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = 1 \frac{(e^{-2})^{n+1} - 1}{e^{-2} - 1}$$

$$\lim_{n \to +\infty} S_n = \lim_{n \to +\infty} \left[\frac{e^{-2n-2} - 1}{e^{-2} - 1} \right]$$

$$= -\frac{1}{e^{-2} - 1}$$

لتكن (V_n) متتالية حسابية حيث :

$$V_n = \ln U_n + \ln U_{n+1}$$

لدينا :

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

$$v_{n+1} - v_n = [\ln u_{n+1} + \ln u_{n+2}] - [\ln u_n + \ln u_{n+1}]$$
$$= \ln u_{n+2} - \ln u_n$$
$$= \ln e^{-2(n+2)} - \ln e^{-2n}$$
$$= -2(n+2) + 2n = -4$$

حسابية اساسها -4

المجموع T_n:

$$v_0 = \ln u_0 + \ln u_1$$
$$= \ln e^0 + \ln e^{-2}$$
$$= 0 - 2 = -2$$

ا)ت أ

$$v_n = v_0 + nr = -2 - 4n$$

المجموع:

$$T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$$
$$= \frac{n+1}{2}(v_0 + v_n)$$
$$= \frac{n+1}{2}(-2-2-4n)$$
$$= \frac{n+1}{2}(-4-4n)$$
$$= -2(n+1)(n+1)$$
$$T_n = -2(n+1)^2$$

عين قيمة n:

$$T_n^2 = 2^{30}$$
$$[-2(n+1)]^2 = 2^{30}$$
$$4(n+1)^2 = 2^{30}$$
$$2^2(n+1)^2 = 2^{30}$$
$$(n+1)^2 = \frac{2^{30}}{2^2} = 2^{28}$$
$$n+1 = 2^{14}$$
$$n = 2^{14} - 1$$
$$n = 128 - 1 = 127$$

التمرين 06

1) برهن أن (v_n) هندسية:

$$v_n = \frac{5^{n+1}}{6^n}$$
$$v_{n+1} = \frac{5^{n+1+1}}{6^{n+1}} = \frac{5 \times 5^{n+1}}{6 \times 5^n} = \frac{5}{6} v_n$$

هندسية اساسها $\frac{5}{6}$

الحد الأول:

$$v_0 = \frac{5^{0+1}}{6^0} = \frac{5}{1} = 5$$

2) النهاية:

$$\lim_{n \to +\infty} v_n = \lim_{n \to +\infty} 5\left(\frac{5}{6}\right)^n = 0$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

(II)

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6} \end{cases}$$

1) برهن بالتراجع:

$1 \leq u_n \leq 6$

نتثبت صحة الشرط الابتدائي:

$u_0 = 1$ و $1 \leq 1 \leq 6$

نفرض من $1 \leq u_n \leq 6$ صحيحة

ونبرهن صحة u_{n+1}

لدينا: $1 \leq u_n \leq 6$

نضرب في 5

$5 \leq 5u_n \leq 30$

نضيف 6

$11 \leq 5u_n + 6 \leq 36$

$\sqrt{11} \leq \sqrt{5u_n + 6} \leq 6$

$\sqrt{11} \leq u_{n+1} \leq 6$

صحيحة لأن $1 \leq u_{n+1} \leq 6$

ومنه $1 \leq u_n \leq 6$ صحيحة

2) اتجاه التغير:

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{5u_n + 6} - u_n$$

$$= \frac{(\sqrt{5u_n+6} - u_n)(\sqrt{5u_n+6} + u_n)}{\sqrt{5u_n+6} + u_n}$$

$$= \frac{5u_n + 6 - u_n^2}{\sqrt{5u_n+6} + u_n}$$

$$= \frac{-(u_n^2 - 5u_n - 6)}{\sqrt{5u_n+6} + u_n}$$

$$= \frac{-(u_n+1)(u_n-6)}{\sqrt{5u_n+6} + u_n}$$

لدينا: $1 \leq u_n \leq 6$

سالب $0 \leq u_n - 6 \leq -5$

و $2 \leq u_{n+1} \leq 7$

سالب $-2 \geq -(u_{n+1}) \geq -7$

و المقام موجب اذاً

متزايدة $u_{n+1} - u_n > 0$

3) برهن: نستعمل هنا بالتراجع

$6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$

نتثبت صحة الشرط الابتدائي

$6 - u_1 \leq \frac{5}{6}(6 - u_0)$

$6 - \sqrt{11} \leq \frac{5}{6}(6-1)$

$6 - \sqrt{11} \leq \frac{25}{6}$

صحيحة.

نفرض $6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6-u_n)$ صحيحة

ونبرهن صحة P_{n+1}

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

أي يبرهن صحة

$6-U_{n+2} \leq \frac{5}{6}(6-U_{n+1})$

لدينا:

$6-U_{n+2} = 6-\sqrt{5U_{n+1}+6}$

$= \frac{(6-\sqrt{5U_{n+1}+6})(6+\sqrt{5U_{n+1}+6})}{6+\sqrt{5U_{n+1}+6}}$

$= \frac{36-(5U_{n+1}+6)}{6+\sqrt{5U_{n+1}+6}} = \frac{30-5U_{n+1}}{6+\sqrt{5U_{n+1}+6}}$

$= \frac{5(6-U_{n+1})}{6+\sqrt{5U_{n+1}+6}}$

سوف معايا واش نكملوا:

لدينا:

$1 \leq U_{n+1} \leq 6$

$5 \leq 5U_{n+1} \leq 30$

$11 \leq 5U_{n+1}+6 \leq 36$

$\sqrt{11} \leq \sqrt{5U_{n+1}+6} \leq 6$

$6 \leq 6+\sqrt{11} \leq 6+\sqrt{5U_{n+1}+6} \leq 12$

نقلب:

$\frac{1}{6} \geq \frac{1}{6+\sqrt{11}} \geq \frac{1}{6+\sqrt{5U_{n+1}+6}}$

نضرب:

$\frac{1}{6+\sqrt{5U_{n+1}+6}} \leq \frac{1}{6}$

بضرب الطرفين في العدد الموجب $5(6-U_{n+1})$

فنحصل:

$\frac{5(6-U_{n+1})}{6+\sqrt{5U_{n+1}+6}} \leq \frac{5}{6}(6-U_{n+1})$

إذا:

$6-U_{n+2} \leq \frac{5}{6}(6-U_{n+1})$

صحيحة وهذه صحيحة $6-U_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6-U_n)$

ب) بين أن:

$0 \leq 6-U_n \leq 6^n$

لدينا:

$6-U_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6-U_n)$

$6-U_1 \leq \frac{5}{6}(6-U_0)$

$6-U_2 \leq \frac{5}{6}(6-U_1)$

$6-U_3 \leq \frac{5}{6}(6-U_2)$

$\vdots$

$6-U_n \leq \frac{5}{6}(6-U_{n-1})$ بالجداء

$6-U_n \leq \left(\frac{5}{6}\right)^n (6-U_0)$

$6-U_n \leq \left(\frac{5}{6}\right)^n (6-1)$

$6-U_n \leq 5\left(\frac{5}{6}\right)^n$

$0 \leq 6-U_n \leq 6^n$

النهاية:

$\lim_{n\to+\infty}(6-U_n) \leq \lim_{n\to+\infty} 2^n$

$6-\lim_{n\to+\infty} U_n = 0$

$\lim_{n\to+\infty} U_n = 6$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تمرين 07

$I=[1,2]$

1) $f(x)=\dfrac{x+2}{-x+4}$

أ) بين أن f متزايدة على I

$f'(x)=\dfrac{1(-x+4)-(-1)(x+2)}{(-x+4)^2}$

$=\dfrac{-x+4+x+2}{(-x+4)^2}$

$f'(x)=\dfrac{6}{(-x+4)^2}$

لدينا $6>0$ و $(-x+4)^2>0$

إذا $f'(x)>0$ ، ومنه

f متزايدة على I

ب) ليكن $f(I)$ تأطير I لدينا:

$1\leq x\leq 2$

① $\quad 3\leq x+2\leq 4$

ولدينا،

$-2\leq -x\leq -1$

$2\leq -x+4\leq 3$

نقلب،

② $\quad \dfrac{1}{3}\leq \dfrac{1}{-x+4}\leq \dfrac{1}{2}$

نضرب ① × ②

$\dfrac{3}{3}\leq \dfrac{x+2}{-x+4}\leq \dfrac{4}{2}$

$1\leq f(x)\leq 2$

ومنه f تأطير I

2) (U_n) متتالية،

$U_{n+1}=f(U_n)$ $\quad U_0=\dfrac{3}{2}$

$U_{n+1}=\dfrac{U_n+2}{-U_n+4}$

أ) برهن بالتراجع،

$1\leq U_n\leq 2$

نتحقق خاصية b الابتدائية

$U_0=\dfrac{3}{2}$ و $1\leq\dfrac{3}{2}\leq 2$

محققة

نفرض $1\leq U_n\leq 2$ صحيحة

ونبرهن صحة U_{n+1}

$1\leq U_n\leq 2$

ولدينا f متزايدة على I

فإن

$f(1)\leq f(U_n)\leq f(2)$

ولدينا:

$f(U_n)=U_{n+1}$

$f(1)=\dfrac{1+2}{-1+4}=1$

$f(2)=\dfrac{2+2}{-2+4}=2$

$1\leq U_{n+1}\leq 2$

صحيحة ومنه $1\leq U_n\leq 2$ وراثية

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ب) اتجاه تغير (U_n)

$$U_{n+1} - U_n = \frac{U_n + 2}{-U_n + 4} - U_n$$

$$= \frac{U_n + 2 + U_n^2 - 4U_n}{-U_n + 4}$$

فان

$$= \frac{U_n^2 - 3U_n + 2}{-U_n + 4}$$

فان

$$= \frac{(U_n^2 - 3U_n + 2)}{-U_n + 4}$$

ومنه

$$= \frac{(U_n - 2)(U_n - 1)}{-U_n + 4}$$

لدينا:

$1 \leq U_n \leq 2$

موجب $0 \leq U_n - 1 \leq 1$

سالب $-1 \leq U_n - 2 \leq 0$

و

موجب $3 \geq -U_n + 4 \geq 2$

وعليه:

$U_{n+1} - U_n < 0$

متناقصة

- استنتاج: التقارب:

لما (U_n) متناقصة ومحدودة من الاسفل فهي متقاربة نحو 1

3) البرهان بالتراجع:

$$U_n = 1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^n + 1}$$

تثبت صحة الخاصية الابتدائية

$$U_0 = 1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^0 + 1} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

الخاصية محققة من أجل $n = 0$

$U_0 = \frac{3}{2}$

نفرض صحة U_n ونبرهن صحة U_{n+1} أي:

$$U_{n+1} = 1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^{n+1} + 1} \quad \text{(1)}$$

ونبرهن من جهة ثانية:

$$U_{n+1} = \frac{U_n + 2}{-U_n + 4} = \frac{1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^n + 1} + 2}{-\left[1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^n + 1}\right] + 4}$$

$$= \frac{3 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^n + 1}}{3 - \frac{1}{(\frac{3}{2})^n + 1}} = \frac{3(\frac{3}{2})^n + 4}{3(\frac{3}{2})^n + 2}$$

$$= \frac{3(\frac{3}{2})^n + 4}{3(\frac{3}{2})^n + 2} = \frac{3(\frac{3}{2})^n + 2 + 2}{3(\frac{3}{2})^n + 2}$$

$$= 1 + \frac{2}{3(\frac{3}{2})^n + 2} = 1 + \frac{2}{2\left[\frac{3}{2}(\frac{3}{2})^n + 1\right]}$$

$$U_{n+1} = 1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^{n+1} + 1}$$

وهي نفسها العلاقة (1) أي أن

الخاصية وراثية ومنه

الخاصية $U_n = 1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^n + 1}$ محققة

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ب) النهاية:

$$\lim_{n\to+\infty} U_n = \lim_{n\to+\infty}\left[1+\frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^n+1}\right]$$

$\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$ لأن $-1<\frac{2}{3}<1$

$$= 1+0 = 1$$

ج) $\lim_{n\to+\infty} V_n$:

نقول أن (U_n) و (V_n) متجاورتان إذا كان أحدهما متزايدة والأخرى متناقصة ولهما نفس النهاية يعني

$$\lim_{n\to+\infty}(U_n - V_n) = 0$$

لدينا: تبع محايا التمرين.

$$V_{n+1} = \frac{U_n+3V_n}{4} \qquad V_0 = 1$$

$$U_{n+1} = \frac{U_n+2V_n}{3} \qquad U_0 = 12$$

$$W_n = U_n - V_n$$

1) اثبت (W_n) أنها هندسية

$$W_{n+1} = U_{n+1} - V_{n+1}$$

$$= \frac{U_n+2V_n}{3} - \frac{U_n+3V_n}{4}$$

$$= \frac{4U_n+8V_n-3U_n-9V_n}{12}$$

$$= \frac{U_n-V_n}{12} = \frac{1}{12}W_n$$

هندسية أساسها $\frac{1}{12}$

$$W_0 = U_0 - V_0 = 12-1 = 11$$

n بدلالة W_n (2

$$W_n = W_0\, q^n = 11\left(\frac{1}{12}\right)^n$$

نهاية:

$$\lim_{n\to+\infty} W_n = \lim_{n\to+\infty} 11\left(\frac{1}{12}\right)^n = 0$$

لأن $0<\frac{1}{12}<1$ فهمت!

3) اثبت (t_n) ثابتة:

يكفي نثبت أن $t_{n+1} = t_n$

لدينا $t_n = 3U_n + 8V_n$

$$t_{n+1} = 3U_{n+1} + 8V_{n+1}$$

$$= 3\frac{U_n+2V_n}{3} + 8\frac{U_n+3V_n}{4}$$

$$= U_n + 2V_n + 2(U_n+3V_n)$$

$$= 3U_n + 8V_n = t_n$$

ومنه (t_n) ثابتة

نهاية (t_n):

$$t_0 = 3U_0 + 8V_0 = 3(12)+8(1)$$

$$= 44$$

$$\lim_{n\to+\infty} t_n = 44$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

4) لنبيّن أن (u_n) و (v_n) متجاورتان

ندرس اتجاه التغير :

$$u_{n+1}-u_n=\frac{u_n+2v_n}{3}-u_n$$

$$=\frac{u_n+2v_n-3u_n}{3}=\frac{2v_n-2u_n}{3}$$

$$=\frac{-2(u_n-v_n)}{3}=-\frac{2}{3}w_n<0$$

لأن $w_n>0$ و $-\frac{2}{3}<0$

ومنه (u_n) متناقصة

$$v_{n+1}-v_n=\frac{u_n+3v_n}{4}-v_n$$

$$=\frac{u_n+3v_n-4v_n}{4}=\frac{u_n-v_n}{4}$$

$$=\frac{1}{4}w_n>0$$

لأن $\frac{1}{4}>0$ و $w_n>0$

ومنه (v_n) متزايدة

$$\lim_{n\to+\infty}(u_n-v_n)=\lim_{n\to+\infty}w_n=0$$

ومنه (u_n) و (v_n) متجاورتان

5) استنتاج :

$$\begin{cases}u_n-v_n=w_n=11\left(\frac{1}{12}\right)^n\\3u_n+8v_n=44\end{cases}$$

نضرب (1) في 8 ونجمع

$$\begin{cases}8u_n-8v_n=88\left(\frac{1}{12}\right)^n\\3u_n+8v_n=44\end{cases}$$

بالجمع

$$11u_n=44+88\left(\frac{1}{12}\right)^n$$

$$u_n=4+8\left(\frac{1}{12}\right)^n$$

نعوض في :

$$u_n-v_n=11\left(\frac{1}{12}\right)^n$$

$$4+8\left(\frac{1}{12}\right)^n-v_n=11\left(\frac{1}{12}\right)^n$$

$$v_n=4-3\left(\frac{1}{12}\right)^n$$

وحسب نتائج :

$$\lim_{n\to+\infty}v_n=\lim_{n\to+\infty}\left(4-3\left(\frac{1}{12}\right)^n\right)=4$$

$$\lim_{n\to+\infty}u_n=\lim_{n\to+\infty}\left(4+8\left(\frac{1}{12}\right)^n\right)=4$$

b) لدينا $3u_n+8v_n=44$

$$\lim_{n\to+\infty}u_n=\lim_{n\to+\infty}v_n=\ell$$

(لأن)

$$3\ell+8\ell=44$$

$$11\ell=44$$ ومنه $\boxed{\ell=4}$

$$\lim_{n\to+\infty}v_n=\lim_{n\to+\infty}u_n=4$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تمرين 09 ص 08

I) $U_n = e^{\frac{1}{2}-n}$

1) بيّن أن (U_n) هندسية:

$U_{n+1} = e^{\frac{1}{2}-(n+1)} = e^{\frac{1}{2}-n-1}$

$= e^{-1} e^{\frac{1}{2}-n} = e^{-1} U_n$

هندسية أساسها e^{-1}

شوف معايا:

$U_n = e^{an+b}$ ← لاحظ $\boxed{e^a}$

الحد الأول:

$U_0 = e^{\frac{1}{2}-0} = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$

2) نهاية:

$\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \lim\limits_{n\to+\infty} e^{\frac{1}{2}-n} = 0$

الاستنتاج: جاءت تستنتج اتمامستقارية نحو 0

3) المجموع:

$S_n = U_0 + U_1 + \cdots\cdots U_n$

$= U_0 \frac{q^{n+1}-1}{q-1} = \sqrt{e}\,\frac{(e^{-1})^{n+1}-1}{e^{-1}-1}$

$= \sqrt{e}\,\frac{e^{-n-1}-1}{e^{-1}-1}$

II) نختبر $V_n = \ln(U_n)$

1) عبّر:

$V_n = \ln(U_n) = \ln e^{\frac{1}{2}-n}$

$V_n = \frac{1}{2} - n$

نوع المتتالية:

$V_{n+1} - V_n = \left[\frac{1}{2} - (n+1)\right] - \left[\frac{1}{2} - n\right]$

$= \frac{1}{2} - n - 1 - \frac{1}{2} + n = -1$

حسابية أساسها -1

2) حساب P_n:

$P_n = \ln(U_0 * U_1 \times U_2 \times \cdots U_n)$

$= \ln U_0 + \ln U_1 + \ln U_2 + \cdots \ln U_n$

لدينا:

$\ln U_n = V_n$

$\ln U_0 = V_0$

$\ln U_1 = V_1$

$\ln U_n = V_n$ بجمع

$P_n = V_0 + V_1 + \cdots V_n$ حسابية

$P_n = \frac{n+1}{2}(V_0 + V_n)$

$= \frac{n+1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - n\right)$

$P_n = \frac{n+1}{2}(1-n)$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ب) تعيين n بحيث:

$P_n + 4n > 0$

$\frac{n+1}{2}(1-n) + 4n > 0$

$\frac{(n+1)(1-n)+8n}{2} > 0$

$-n^2 + 8n + 1 > 0$

حل المعادلة:

$-n^2 + 8n + 1 = 0$

$\Delta = 68$

$n_1 = \frac{-8-\sqrt{68}}{-2} = 8{,}12$

$n_2 = \frac{-8+\sqrt{68}}{-2} = -0{,}12$

$-\infty$	$-0{,}12$	$+$	$8{,}12$	$-$	$+\infty$

نجد الأعداد الطبيعية المحصورة بين $8{,}12$ و $-0{,}12$

$n = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

جـ) $P_{10} = 0$

$\begin{cases} u_0 = e^3 \\ u_{n+1} = e\sqrt{u_n} \end{cases}$

$v_n = \ln(u_n) - 2$

1) برهان (v_n) هندسية

$v_{n+1} = \ln u_{n+1} - 2 = \ln e\sqrt{u_n} - 2$

$= \ln e + \ln \sqrt{u_n} - 2$

$= 1 + \ln u_n^{\frac{1}{2}} - 2$

$= \frac{1}{2}\ln u_n - 1 = \frac{1}{2}(\ln u_n - 2)$

$v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$

هندسية أساسها $\frac{1}{2}$

$v_0 = \ln u_0 - 2 = \ln e^3 - 2$

$= 3 - 2 = 1$

2) عبارة v_n بدلالة n ثم عبارة $\ln u_n$ بدلالة n

$v_n = v_0 \, q^n = 1\left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

لدينا:

$v_n = \ln u_n - 2$

$\ln u_n = v_n + 2 = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$

3) حساب النهاية:

$\lim_{n\to+\infty} v_n = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

لأن $0 < \frac{1}{2} < 1$

ب) تقارب (U_n) نحو e^2

لدينا:

$\ln u_n = v_n + 2$

$u_n = e^{v_n + 2}$

$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} e^{v_n+2} = e^2$

ومنه (U_n) متقاربة نحو e^2

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

تمرين 11 ص

1) $\begin{cases} v_0 = \alpha \\ v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n + \frac{9}{4} \end{cases}$

- قيمة α حتى تكون (v_n) ثابتة.

نقول ثابتة:

$v_0 = v_1 = v_2 = \dots = v_n = v_{n+1}$

لدينا

$v_{n+1} = v_n = v_0 = \alpha$

نعوض

$\alpha = \frac{1}{4}\alpha + \frac{9}{4}$

$\alpha - \frac{1}{4}\alpha = \frac{9}{4}$

$\frac{3}{4}\alpha = \frac{9}{4}$

$\boxed{\alpha = 3}$ $v_0 = 3$

II) نضع $\alpha = 4$ أي $v_0 = 4$

1) حساب الحدود:

$v_1 = \frac{1}{4}v_0 + \frac{9}{4} = \frac{1}{4}\cdot 4 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4}$

$v_2 = \frac{1}{4}v_1 + \frac{9}{4} = \frac{1}{4}\cdot\frac{13}{4} + \frac{9}{4} = \frac{49}{16}$

2) لتكن $u_n = v_n - 3$

أ) برهن هندسية:

$u_{n+1} = v_{n+1} - 3 = \frac{1}{4}v_n + \frac{9}{4} - 3$

$= \frac{1}{4}v_n - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}(v_n - 3)$

$u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n$

هندسية أساسها $\frac{1}{4}$

$u_0 = v_0 - 3 = 4 - 3 = 1$

ب) u_n و v_n بدلالة n

$u_n = u_0 q^n = 1\left(\frac{1}{4}\right)^n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$

لدينا:

$u_n = v_n - 3$

$v_n = u_n + 3 = \left(\frac{1}{4}\right)^n + 3$

2)

$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

$= u_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = 1 \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{4} - 1}$

$= \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} - 1}{-\frac{3}{4}} = -\frac{4}{3}\left(\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} - 1\right)$

ج)

$S'_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

لدينا:

$v_n = u_n + 3$

$S'_n = S_n + 3(n+1) = -\frac{4}{3}\left[\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} - 1\right] + 3(n+1)$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$P_n = u_0 + 4u_1 + 4^2 u_2 + \dots 4^n u_n$

لدينا:

$u_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{4^n}$

$u_0 = 1$ ، $u_1 = \frac{1}{4}$ ، $u_2 = \frac{1}{4^2}$

نعوض

$P_n = 1 + 4^1 \times \frac{1}{4} + 4^2 \times \frac{1}{4^2} + \dots 4^n \times \frac{1}{4^n}$

$= 1 + 1 + 1 + \dots 1 = 1(n+1)$

ب) الجداء

$P_n = u_0 \times u_1 \times u_2 \times \dots u_n$

$= \left(\frac{1}{4}\right)^0 \times \left(\frac{1}{4}\right)^1 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \dots \left(\frac{1}{4}\right)^n$

$= \left(\frac{1}{4}\right)^{0+1+2+\dots n}$

حساب حدها الأول 0 وأخير n

$P_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{n+1}{2}(0+n)} = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{n^2+n}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2+n}$

تمرين 12

$u_0 = 1$
$u_1 = 2$

$u_{n+2} = \frac{3}{2} u_{n+1} - \frac{1}{2} u_n$

$v_n = u_{n+1} - u_n$

1) بين أن (v_n) هندسية

$v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{3}{2} u_{n+1} - \frac{1}{2} u_n - u_{n+1}$

$= \frac{1}{2} u_{n+1} - \frac{1}{2} u_n = \frac{1}{2}(u_{n+1} - u_n)$

$v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$

هندسية أساسها $\frac{1}{2}$

$v_0 = u_1 - u_0 = 2 - 1 = 1$

ب) v_n بدلالة n

$v_n = v_0 q^n = 1 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

ج) بين أن

لدينا:

$v_n = u_{n+1} - u_n$

$v_0 = u_1 - u_0$

$v_1 = u_2 - u_1$

$v_2 = u_3 - u_2$

$\vdots$

$v_{n-1} = u_n - u_{n-1}$

بالجمع

$v_0 + v_1 + \dots v_{n-1} = u_n - u_0$

$u_n = u_0 + (v_0 + v_1 + \dots v_{n-1})$

u_n بدلالة n نجد $\frac{1}{4}$

$u_n = u_0 + v_0 \frac{q^n - 1}{q - 1}$

$= 1 + 1 \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{\frac{1}{2} - 1}$

$u_n = 1 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{-\frac{1}{2}}$

$u_n = 1 - 2\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right]$

$u_n = 1 + 2\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com