المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المجال:** التطورات الرتيبة **الوحدة:** تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن.

الدرس الأول: pH محلول مائي **المدة: حصتين**



❖ مفهوم الأحماض والأسس حسب برونشتد ولوري.

1 - تعريف الحمض:

هو كل فرد كيميائي قادر على فقدان بروتون (H^+) خلال تفاعل كيميائي.

$$AH = A^- + H^+$$

2 - تعريف الاساس:


هو كل فرد كيميائي قادر على اكتساب بروتون (H^+) خلال تفاعل كيميائي.

$$B + H^+ = BH^+$$

3 - الثنائية (أساس/ حمض):

لكل حمض أساس مرافق له والعكس ونكتب الثنائية على الشكل (أساس / حمض)، مما سبق (AH/H^-) و (BH^+/B).

	المعادلة الكيميائية	الثنائية (أساس/ حمض)
أمثلة عن الاحماض	$H_3O^+ = H_2O + H^+$	(H_3O^+/H_2O)
	$HCl = Cl^- + H^+$	(HCl/Cl^-)
	$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{2-}$	(H_2SO_4/SO_4^{2-})
أمثلة عن الاسس	$NH_3 + H^+ = NH_4^+$	(NH_4^+/NH_3)
	$OH^- + H^+ = H_2O$	(H_2O/OH^-)
	$HCOO^- + H^+ = HCOOH$	$(HCOOH/HCOO^-)$



4 - التفاعل حمض – أساس:

التفاعل حمض - أساس هو تفاعل يحدث فيه انتقال بروتون أو أكثر من الحمض للثنائية الأولى (أساس 1 / حمض 1) إلى أساس الثنائية الثانية (أساس 2 / حمض 2) بحيث كل البروتونات التي يتخلى عنها الحمض يأخذها الاساس.



❖ مفهوم pH محلول مائي مخفف.

للتمييز بين الأحماض فيما بينها والأسس فيما بينها اقترح العالم الدانماركي سورسن مفهوما هو مفهوم ال pH

1 - تعريف:

يعبر pH المحلول عن درجة حموضته ويحسب pH من العلاقة

$$pH = -Log[H_3O^+] \Leftrightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}$$


عند درجة الحرارة $25°C$ يعطى pH محلول مائي مخفف

- ✓ المحلول المائي معتدلا $pH = 7$
- ✓ المحلول المائي حمضيا $pH < 7$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المجال:** التطورات الرتيبة **الوحدة:** تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن.

✓ المحلول المائي أساسيا $pH > 7$



❖ قياس pH محلول مائي:

تستعمل لقياس pH المحاليل طريقتان عمليتان وذلك حسب الدقة المطلوبة.

1 - طريقة كيفية:

نستعمل الكواشف الملونة، حيث تمكننا هذه الطريقة من معرفة طبيعة المحلول(حامضي، معتدل ، قاعدي) حسب التغير اللوني للمحلول في وجود الكاشف حيث إن الكواشف الملونة لا تحدد قيمة واحدة ل pH بل مجالا لقيمه.

الكاشف الملون	الهيليانتين	أزرق البروموتيمول	فينول فتالين
وسط حامضي	أحمر	أصفر	شفاف
مجال التغير اللوني	$3,1 < pH > 4,4$	$6,2 < pH > 7,6$	$8,2 < pH > 10$
وسط قاعدي	أصفر	أزرق	بنفسجي

2 - طريقة كمية:


✓ **جهاز ال pH متر :**

يعين بشكل دقيق pH المحلول المائي.



✓ **ورق ال pH :**

يعين بصفة تقريبية قيمة pH المحلول المائي.



المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المجال:** التطورات الرتيبة **الوحدة:** تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن.

الدرس الثاني: تأثير حمض وأساس على الماء. **المدة:** حصتين

❖ تأثير حمض وأساس على الماء.

إشكالية: هل كل التحولات تامة؟

الأدوات المستعملة: حوجلة سعتها $(100\ ml)$ – ميزان – حمض الايثانويك CH_3COOH - ماصة عيارية – الماء المقطر – حمض كلور الهيدروجين(HCl) محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+،OH^-)$ - محلول ميثيل أمين CH_3NH_2 - مقياس pH متر

العمل التجريبي

1 - النشاط التجريبي 1: الحمض القوي والحمض الضعيف.

نعتبر المحلولين عند نفس درجة الحرارة 25°C

(S_1) محلول لكلور الهيدروجين تركيزه المولي $C_1 = 10^{-2}mol/L$ وله $pH = 2$

(S_2) محلول حمض الايثانويك تركيزه المولي $C_2 = 10^{-2}mol/L$ وله $pH = 3,4$

1- أكتب معادلة تفاعل كل حمض مع الماء.

$HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$ و $CH_3COOH + H_2O = H_3O^+ + CH_3COO^-$

2- قارن بين $[H_3O^+]_f$ و C في محلول.

المحلول (S_1) نجد ..... $[H_3O^+]_f = 10^{-pH} = 10^{-2} = C_1$

المحلول (S_1) نجد ..... $[H_3O^+]_f = 10^{-pH} = 10^{-3,4} = 3,9.10^{-4} < C_2$

3- من خلال المقارنة ماذا تستنتج بالنسبة لكل محلول؟

نستنتج بالنسبة للمحلول (S_1) **أن حمض HCl تشرد كليا في الماء.**

نستنتج بالنسبة للمحلول (S_2) **أن حمض CH_3COOH تشرد جزئيا في الماء.**

4- أعط تعريف للحمض القوي والحمض الضعيف.

تعريف الحمض القوي: **هو الحمض الذي يتحلل (يتشرد) كليا في الماء وبالتالي تفاعله تام.**

تعريف الحمض الضعيف: **هو الحمض الذي يتحلل (يتشرد) جزئيا في الماء ويكون تفاعله غير تام.**

1 - النشاط التجريبي 2: الاساس القوي والاساس الضعيف.

الجداء الشاردي للماء: $\boldsymbol{Ke = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}}$

نعتبر المحلولين عند نفس درجة الحرارة **25**°C

$\boldsymbol{(S_1)}$ محلول لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_1 = 10^{-2}mol/L$ وله $pH = 12$

(S_2) محلول ميثيل أمين تركيزه المولي $C_2 = 10^{-2}mol/L$ وله $pH = 10,8$

1- أكتب معادلة تفاعل كل أساس مع الماء.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

$NaOH_{(S)} \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$ و $CH_3NH_2 + H_2O = CH_3NH_3^+ + OH^-$

2- قارن بين $[OH^-]_f$ و C في محلول.

المحلول (S_1) نجد ..... $[OH^-]_f = 10^{-14}.10^{+12} = 10^{-2} = C_1$

المحلول (S_1) نجد ..... $[OH^-]_f = 10^{-14}.10^{+10,8} = 10^{-3,4} = 6,3.10^{-4} < C_2$

3- من خلال المقارنة ماذا تستنتج بالنسبة لكل محلول؟

نستنتج بالنسبة للمحلول (S_1) **أن $NaOH_{(S)}$ تشرد (انحل) كليا في الماء.**

نستنتج بالنسبة للمحلول (S_2) **أن CH_3NH_2 تشرد (ينحل) جزئيا في الماء.**

4- أعط تعريف للأساس القوي والاساس الضعيف.

تعريف الاساس القوي: **هو الأساس الذي يتحلل (يتشرد) كليا في الماء وبالتالي تفاعله تام.**

تعريف الاساس الضعيف: **هو الأساس الذي يتحلل (يتشرد) جزئيا في الماء ويكون تفاعله غير تام.**

3 - مفهوم حالة التوازن الكيميائي:

✓ **على المستوى العياني:** نقول إن الجملة الكيميائية في حالة توازن كيميائي إذا كانت المتفاعلات والنواتج المتواجدة في الحالة النهائية بكميات ثابتة.

✓ **على المستوى المجهري:** يبقى التفاعل مستمرا في الاتجاهين عند حالة التوازن أي ما ينتجه التفاعل في الاتجاه المباشر يخفيه في الحين ما ينتجه التفاعل في الاتجاه المعاكس (سرعة اختفاء المتفاعلات تساوي سرعة التشكل للنواتج).

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المجال:** التطورات الرتيبة **الوحدة:** تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن.

الدرس الثالث: تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن. **المدة:** ثلاثة حصص

❖ تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن

1 - النسبة النهائية لتقدم تفاعل τ_f :

تعطى النسبة لنهائية لتقدم التفاعل بالعلاقة التالية: $\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}}$

في حالة انحلال حمض في الماء	في حالة انحلال أساس في الماء
$\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]_f}{C} = \frac{10^{-pH}}{C}$	$\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[OH^-]_f}{C} = \frac{10^{pH-14}}{C}$

ملاحظة:

- ✓ يكون التفاعل تام إذا كان $x_f = x_{max}$ أي أن $\tau_f = 1$
- ✓ يكون التفاعل غير تام إذا كان $x_f < x_{max}$ أي أن $\tau_f < 1$

2 - كسر التفاعل Q_r:

ليكن التفاعل الكيميائي المنمذج بالمعادلة التالية: $\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$

يعبر عن كسر التفاعل ب: $Q_r = \frac{[C]^{\gamma}.[D]^{\delta}}{[A]^{\alpha}.[B]^{\beta}}$

حيث ان قيمة كسر التفاعل تحدد مدى تقدم التفاعل بين الحالة الابتدائية والنهائية

ملاحظة:

- ✓ في حالة وجود الماء في النواتج أو المتفاعلات فإنه $[H_2O] = 1$
- ✓ في حالة وجود مادة صلبة في النواتج أو المتفاعلات فإنه يعبر عن تركيزه ب 1
- ✓ في حالة التفاعل العكسي $\gamma C + \delta D = \alpha A + \beta B$ فإن كسر تفاعله Q'_r هو $Q'_r = \frac{1}{Q_r}$

مثال:

أعط عبارة كسر التفاعل للتفاعلات التالية:

$$I_{2(aq)} + 2S_2O_{3(aq)}^{2-} = 2I_{(aq)}^{-} + S_4O_{6(aq)}^{2-} \Rightarrow Q_r = \frac{[I^-]^2.[S_4O_6^{2-}]^1}{[I_2]^1.[S_2O_3^{2-}]^2}$$

$$Cu_{(s)} + 2Ag_{(aq)}^{+} = Cu_{(aq)}^{2+} + 2Ag_{(s)} \Rightarrow Q_r = \frac{[Cu^{2+}]^1}{[Ag^+]^2}$$

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+{}_{(aq)} + CH_3COO^-{}_{(aq)} \Rightarrow Q_r = \frac{[CH_3COO^-].[H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المجال:** التطورات الرتيبة **الوحدة:** تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن.

3 - ثابت التوازن K:

عندما تبلغ الجملة الكيميائية حالة توازنها النهائي يكون كسر التفاعل غير مرتبط بالتركيب الابتدائي للجملة فيؤول كسر التفاعل إلى قيمة K ثابت التوازن النهائي.

$$K = Q_{rf} = \frac{[C]^{\gamma}_f.[D]^{\delta}_f}{[A]^{\alpha}_f.[B]^{\beta}_f}$$

ملاحظة:

- ✓ ثابت التوازن مقدار يتعلق بدرجة الحرارة فقط ولا يتعلق بالحالة الابتدائية للجملة.
- ✓ إذا كان ثابت التوازن $K > 10^4$ فإن التفاعل تام.

4 - علاقة النسبة النهائية لتدم التفاعل τ_f مع ثابت التوازن K:

$$K = \frac{{\tau_f}^2}{1-\tau_f} C$$

مثال تطبيقي:

نعتبر محلولين لحمض الايثانويك CH_3COOH عند نفس درجة الحرارة $25°C$

المحلول (S_1) تركيزه المولي $C_1 = 10^{-2} mol/L$ وله $pH = 3,4$

المحلول (S_2) تركيزه المولي $C_2 = 5.10^{-3} mol/L$ وله $pH = 3,56$

1- أكتب معادلة انحلال الحمض في الماء ثم انشئ جدول التقدم للتفاعل.

2- أثبت أن عبارة ثابت التوازن K تعطى بالعلاقة $K = \frac{{\tau_f}^2}{1-\tau_f} C$

3- أحسب ثابت التوازن في كل حالة ماذا تستنتج؟

الحل:

معادلة انحلال الحمض: $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = {H_3O^+}_{(aq)} + {CH_3COO^-}_{(aq)}$

جدول التقدم:

المعادلة	AH +	H_2O =	A^-	+ H_3O^+
$x = 0$	$C.V$	بوفرة	0	0
$x(t)$	$CV - x$		x	x
x_f	$CV - x_f$		x_f	x_f

أثبات عبارة ثابت التوازن K

نعلم أن $K = \frac{[H_3O^+]_f.[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} \ldots . (1)$

لدينا $\tau_f = \frac{[H_3O^+]_f}{C}$

ومنه $[H_3O^+]_f = \tau_f.C$

من جدول التقدم

$[H_3O^+]_f = [CH_3COO^-]_f = \tau_f.C$

$[CH_3COOH]_f = C - \frac{x_f}{V} = C - [H_3O^+]_f \Rightarrow$

$[CH_3COOH]_f = C(1-\tau_f)$

بالتعويض في العلاقة (1)

$K = \frac{\tau_f.C \times \tau_f.C}{C(1-\tau_f)} = \frac{{\tau_f}^2}{1-\tau_f} C$

حساب ثابت التوازن K

$\tau_{f(1)} = \frac{10^{-3,4}}{10^{-2}} = 4.10^{-2} = 4\%$

$\tau_{f(2)} = \frac{10^{-3,56}}{10^{-2}} = 5,5.10^{-2} = 5,5\%$

$K_{(1)} = \frac{(4.10^{-2})^2}{1-4.10^{-2}}.10^{-2} = 1,7.10^{-5}$

$K_{(2)} = \frac{(5,5.10^{-2})^2}{1-5,5.10^{-2}}.5.10^{-3} = 1,7.10^{-5}$

نستنتج: تزداد قيمة τ_f كلما كان المحلول ممددا اما K يبقى ثابت لكل المحاليل ذات نفس الحمض.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المجال:** التطورات الرتيبة **الوحدة:** تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن.

الدرس الرابع: التحولات حمض أساس. **المدة:** ثلاثة حصص

❖ التحولات حمض أساس.

1 - التشرد الذاتي للماء:

الماء المقطر يتفكك ذاتيا وفق المعادلة: $2H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

عند 25°C يكون الجداء الشاردي للماء $Ke = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$

$Ke = 10^{-PKe}$ ؛ $pKe = -LogKe$ ؛ $pKe = 14$

2 - ثابت الحموضة K_a و pKa للثنائية (أساس/ حمض)

للتمييز بين الأحماض الضعيفة فيما بينها والتمييز بين الأسس الضعيفة فيما بينها نعرف مقدارا كيميائيا ندعوه ثابت الحموضة Ka

❖ ننمذج معادلة انحلال الحمض في الماء $AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

$$K_a = \frac{[H_3O^+]_f.[A^-]_f}{[AH]_f}$$

ملاحظة:

بصفة عامة وفي أي محلول مائي يعطى ثابت الحموضة بالعلاقة التالية

$$K_a = \frac{[H_3O^+]_f.[\text{الأساس}]_f}{[\text{الحمض}]_f}$$

نعرف pK_a للثنائية (AH/H^-) كما يلي:

$$K_a = 10^{-pKa} \Leftrightarrow pKa = -LogK_a$$

❖ هام جدا من اجل انحلال أساس في الماء $B_{(aq)} + H_2O_{(l)} = BH^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$

نعرف ثابت الحموضة للثنائية (BH^+/B)

$$K_a = \frac{[H_3O^+]_f.[B]_f}{[BH^+]_f}$$

ثابت التوازن للتفاعل السابق يعطى ب

$$K = \frac{[BH^+]_f.[HO^-]_f}{[B]_f} = \frac{[BH^+]_f.[HO^-]_f.[H_3O^+]_f}{[B_{(aq)}]_f.[H_3O^+]_f} = \frac{Ke}{Ka}$$


ملاحظة:

- ✓ الحمض يكون اقوى كلما كان Ka أكبر أي pKa أصغر.
- ✓ الأساس يكون اقوى كلما كان Ka أصغر أي pKa أكبر.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المجال:** التطورات الرتيبة **الوحدة:** تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن.

3 - العلاقة بين pH و pK_a (علاقة أندرسون)



نعلم أن $K_a = \frac{[H_3O^+]_f.[A^-]_f}{[AH]_f} \Leftrightarrow \frac{Ka}{[H_3O^+]_f} = \frac{[A^-]_f}{[AH]_f}$

$$\frac{10^{-PKa}}{10^{-pH}} = \frac{[A^-]_f}{[AH]_f} \Leftrightarrow 10^{-PKa+pH} = \frac{[A^-]_f}{[AH]_f}$$


$$pH - PKa = log\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}$$

$$pH = PKa + log\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}$$


4 - مجالات تغلب الصفة الحمضية أو الأساسية للثنائية (AH/H^-):

لدينا العلاقة $pH = PKa + log\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}$ نميز ثلاثة حالات:

- ذا كان $pH = pK_a$ فإن $[A^-]_f = [HA]_f$، فإنه لا توجد صفة غالبة.
- إذا كان $pH < pK_a$ فإن $[A^-]_f < [HA]_f$، فإن الصفة الحمضية هي الغالبة.
- إذا كان $pH > pK_a$ فإن $[A^-]_f > [HA]_f$، فإن الصفة الأساسية هي الغالبة.




مثال: لدينا الثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) حيث إن $pKa = 4,8$ على مخطط مدرج ال pH بين مجالات تغلب تفوق الصفة الحمضية والصفة الاساسية



4 1- مخطط توزيع الصفة الغالبة:

مخطط يمثل النسبة المئوية للصفة الحمضية والصفة الأساسية بدلالة pH



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

5 - الكاشف الملون:

✓ عبارة عن ثنائية (أساس/حمض) يتغير لونه حسب الوسط الموجود فيه حمض أو أساس.

❖ يرمز للثنائية (أساس/حمض) للكاشف الملون ب $(HIn\ /In^-)$

❖ يتفكك الكاشف الملون في الماء حسب المعادلة التالية: $HIn_{(aq)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + In^-_{(aq)}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المجال:** التطورات الرتيبة **الوحدة:** تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن.

الدرس الرابع: **المعايرة ال pH مترية.** **المدة:** حصتين

❖ المعايرة ال pH مترية. معايرة حمض ضعيف بأساس قوي.

الأدوات المستعملة: كأس بيشر سعته $(250\ ml)$ – ميزان – حمض الايثانويك CH_3COOH - ماصة عيارية – الماء المقطر – محلول هيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+_{(aq)}, OH^-_{(aq)}\right)$ - كواشف ملونة - مخلاط مغناطيس - سحاحة – ماصة عيارية- إجاصة - مقياس pH متر


العمل التجريبي

1 - النشاط التجريبي: معايرة محلول حمض الايثانويك بمحلول الصود.

البروتوكول التجريبي لعملية المعايرة:

- نملأ السحاحة بالمحلول المُعَايِر (محلول هيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+_{(aq)}, OH^-_{(aq)}\right)$ معلوم التركيز $C_b = 0{,}1mol/L$ ونضبط سطحه الحر على التدريجة 0 من السحاحة.
- بواسطة ماصة عيارية سعتها $10ml$ نأخذ حجما قدره $V_a = 10\ ml$ من محلول لحمض الايثانويك (المحلول المُعايَر) ونضعه في كأس البيشر فوق المخلاط المغناطيسي.
- نغمر مسبار مقياس ال pH مترفي محلول حمض الايثانويك الموجود في البيشر ونضيف له كمية من الماء المقطر حتى يكون المسبار مغمورا بما فيه الكفاية ثم نشغل المخلاط المغناطيسي.
- نسجل قيمة pH محلول الايثانويك قبل بداية عملية المعايرة.
- نفتح صنبور السحاحة ببطئ بعد سكب $V_b = 1ml$ من محلول الصود إلى محلول حمض الايثانويك نسجل قيمةpH بعدما تستقر قيمته.
- نكرر العملية من أجل حجوم مختلفة V_b لمحلول الصود وندون النتائج في الجدول التالي.

$V_b(ml)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
pH	3,14	3,75	4,07	4,29	4,47	4,65	4,82	5,01	5,23
$V_b(ml)$	9	9,5	10	10,5	11	12	13	14	15
pH	5,6	5,87	6,43	9,85	10,81	11,45	11,7	11,83	11,92



1- هل اضافة الماء تؤثر على عملية المعايرة؟

لا تتغير كمية الحمض الابتدائية فإضافة الماء تسمح بجعل المسبار مغمورا في الحمض.

2- أرسم مخططا توضيحيا لعملية المعايرة

younesmekki078@gmail.com


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المجال:** التطورات الرتيبة **الوحدة:** تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن.

3- أكتب معادلة تفاعل المعايرة

$$CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

4- أرسم المنحنى البياني $pH = f(V_b)$



5- حلل أجزاء المنحنى مبينا في كل جزء منه المتفاعل المحد وطبيعة المحلول

- ✓ من أجل $0 \leq V_b \leq 10ml$ يزداد ال pH ببطئ ومنه المتفاعل المحد شوارد $HO^-_{(aq)}$ المحلول حامضي.
- ✓ من أجل $10ml \leq V_b \leq 10,5ml$ يزداد ال pH بشدة هذه المنطقة تشمل نقطة التكافؤ يكون المزيج في الشروط الستكيومترية.
- ✓ من أجل $V_b \leq 10,5ml$ يزداد ال pH ببطئ وينتهي إلى قيمة حدية ومنه المتفاعل المحد هو $CH_3COOH_{(aq)}$ طبيعة المحلول قاعدي.

6- حدد من البيان إحداثيات نقطة التكافؤ

باستعمال طريقة المماسين نجد $(pH_E = 8,8 \quad V_{bE} = 10,24ml)$

7- أنجز جدول لتقدم تفاعل المعايرة واستنتج العلاقة التي تربط C_a ب C_b، V_a و V_{bE} حجم محلول الصود المضاف حتى نقطة التكافؤ ثم إستنتج قيمة C_a التركيز المولي للمحلول الحمضي

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + OH^-_{(aq)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$			
حالة الجملة	تقدم التفاعل	كميات المادة بالمول			
الابتدائية	$x = 0$	$C_a.V_a$	$C_b.V_b$	0	بزيادة
عند التكافؤ	x_E	$C_a.V_a - x_E$	$C_b.V_{bE} - x_E$	x_E	بزيادة

عند التكافؤ يكون المزيج ستوكيومتري

$$\begin{cases} C_a.V_a - x_E = 0 \\ C_b.V_{bE} - x_E = 0 \end{cases} \Leftrightarrow C_b.V_{bE} = C_a.V_a$$

استنتاج قيمة C_a

$$C_b.V_{bE} = C_a.V_a \Leftrightarrow C_a = \frac{C_b.V_{bE}}{V_a} = \frac{0,1 \times 10,24}{10} \Rightarrow C_a = 0,1024mol/L$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

8- ماذا تمثل النقطة التي يكون فيها $V_b = \frac{V_{bE}}{2}$ حدد بيانيا قيمة ال pH الموافقة لها. ماذا تمثل هذه القيمة؟

هي نقطة نصف التكافؤ E' قيمتها بيانيا $\left(V_b = \frac{V_{bE}}{2} = \frac{10,24}{2} = 5,12ml\right)$ قيمة ال pH الموافقة لها $pH_{E'} = 4,8$

تمثل قيمة الpKa $pH_{E'} = pKa = 4,8$

9- أحسب ثابت التوازن K للتفاعل الحادث ماذا تستنتج؟

$$K = \frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f . [HO^-]_f} = \frac{[CH_3COO^-]_f . [H_3O^+]_f}{[CH_3COOH]_f . [HO^-]_f . [H_3O^+]_f} = \frac{Ka}{Ke} = \frac{10^{-pKa}}{10^{pKe}} \Rightarrow$$

$$K = 10^{-pKa+pKe} = 10^{-4,8+14} \Rightarrow K = 10^{9,2}$$

نستنتج أن تفاعل المعايرة تام لأن $K = 10^{9,2} > 10^4$

10- في غياب ال pH ما هو الكاشف المناسب لهذه المعايرة من بين الكواشف التالية:

الكاشف الملون	الهيليانتين	أزرق البروموتيمول	الفينول فتالين
مجال التغير اللوني	4,4 − 3,2	7,6 − 6,2	10,0 − 8,2

بما أن $pH_E = 8,8$ فإن الفينول فتالين هو الكاشف المناسب لهذه المعايرة لأن مجال تغيره اللوني يشمل نقطة التكافؤ.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com