najah213.com · نجاح 213

نص التمرين:

لتكن الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ : $f(x)=\frac{2x-1}{x-1}$

$(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$.

1) تحقق من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ أن: $f(x)=2+\frac{1}{x-1}$

2) أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$.

3) انطلاقا من التمثيل البياني للدالة مقلوب، اشرح كيفية رسم المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ ثم ارسمه.

4) برهن أن النقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$.

5) أرسم -في نفس المعلم السابق- المنحنى $(\mathcal{C}_g)$ الممثل للدالة g حيث: $g(x)=|f(x)|$.

6) نعتبر الدالة h المعرفة على $]-\infty;\frac{1}{2}]\cup]1;+\infty[$ بـ : $h(x)=\sqrt{\frac{2x-1}{x-1}}$

أ- تحقق أن الدالة h مركبة من الدالة f ودالة مرجعية يطلب تعيينها.

بـ- استنتج اتجاه تغير الدالة h على المجالين $]-\infty;\frac{1}{2}]$ و $]1;+\infty[$.

الحل المفصل:

1) التحقق من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ أن: $f(x)=2+\frac{1}{x-1}$

الطريقة 1:

من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا:

$$2+\frac{1}{x-1}=\frac{2(x-1)+1}{x-1}=\frac{2x-2+1}{x-1}=\frac{2x-1}{x-1}=f(x)$$

الطريقة 2:

من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا:

$$f(x)=\frac{2x-1}{x-1}=\frac{2x-2+1}{x-1}=\frac{2(x-1)+1}{x-1}=\frac{2(x-1)}{x-1}+\frac{1}{x-1}=2+\frac{1}{x-1}$$


ومنه:

من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا: $f(x)=2+\frac{1}{x-1}$

2) دراسة اتجاه تغير الدالة f على المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$:

من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا: $f(x)=2+\frac{1}{x-1}$

لاحظ المخطط التالي:



فنكتب: $f=uov=u[v(x)]$ حيث $u(x)=2+\frac{1}{x}$ و $v(x)=x-1$.

بما أن:

- الدالة v متزايدة تماما على المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$.

لأن: v دالة تآلفية معاملها موجب من الشكل $x\mapsto ax+b$ حيث $a>0$.

- والدالة u متناقصة تماما على المجالين $]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$.

لأن: u دالة مقلوب زائد عدد حقيقي من الشكل $x\mapsto k+\frac{1}{x}$ حيث $k\in\mathbb{R}$.

مع: $u(]-\infty;0[\cup]0;+\infty[)\subset]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$

فإن: الدالة $f=uov$ متناقصة تماما على المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$.

مبرهنة:

v دالة رتيبة تماما على مجال I.

u دالة رتيبة تماما على مجال J حيث: $v(I)\subset J$.

- إذا كان للدالتين v و u نفس اتجاه التغير، تكون الدالة uov متزايدة تماما على I.

- إذا كان اتجاها تغير الدالتين v و u متعاكسين، تكون الدالة uov متناقصة تماما على I.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3) شرح كيفية رسم المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ انطلاقا من التمثيل البياني للدالة مقلوب:

لتكن F الدالة مقلوب المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $X \longmapsto F(X) = Y = \frac{1}{X}$

و $(\mathcal{C}_F)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

ومن أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا: $x \longmapsto f(x)-2 = y-2 = \frac{1}{x-1}$


بوضع: $\begin{cases} X = x-1 \\ \text{و} \\ Y = y-2 \end{cases}$ حيث: $X \in \mathbb{R}^*$ أي: $\begin{cases} x = X+1 \\ \text{و} \\ y = Y+2 \end{cases}$ حيث: $x \in \mathbb{R}-\{1\}$

ينتج: $Y = \frac{1}{X}$ و $X \in \mathbb{R}^*$

ومنه:

المنحنى البياني $(\mathcal{C}_f)$ الممثل للدالة f هو صورة المنحنى البياني $(\mathcal{C}_F)$ الممثل للدالة مقلوب $X \longmapsto \frac{1}{X}$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{V} = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$.

رسم المنحنى $(\mathcal{C}_f)$:



4) نبرهن أن النقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$:

نعلم أن:

الدالة مقلوب $X \longmapsto F(X) = Y = \frac{1}{X}$ هي دالة فردية من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$

لأن: من أجل X من $\mathbb{R}^*$ ومن أجل $(-X)$ من $\mathbb{R}^*$: $F(-X) = \frac{1}{-X} = -\frac{1}{X} = -F(X)$

وبالتالي:

مبدأ المعلم $O(0;0)$ مركز تناظر للمنحنى البياني $(\mathcal{C}_F)$ الممثل للدالة مقلوب في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

وبما أن:

المنحنى البياني $(\mathcal{C}_f)$ الممثل للدالة f هو صورة المنحنى البياني $(\mathcal{C}_F)$ الممثل للدالة مقلوب $X \longmapsto \frac{1}{X}$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{V} = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$ (نتيجة السؤال **3**).

فإن:

النقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

ملاحظة:

يمكن أن نتحقق أيضا من أجل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ ومن أجل $(2-x)$ من $\mathbb{R}-\{1\}$ أن:

$$f(2-x)+f(x) = 4$$

$$f(2-x)+f(x) = 2+\frac{1}{2-x-1}+2+\frac{1}{x-1} = 4-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-1} = 4$$

ومنه:

النقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تذكير:

$\omega(a\,;b)$ مركز تناظر لمنحنى دالة f إذا كان:

من أجل x من D_f و $(x-2a)$ من D_f:

$$f(2a-x)+f(x)=2b$$

5) رسم -في نفس المعلم السابق- المنحنى $(\mathcal{C}_g)$ الممثل للدالة $g(x)=|f(x)|$:

نكتب عبارة الدالة g دون رمز القيمة المطلقة حيث:

$$g(x)=\begin{cases}-f(x) & ;\ f(x)\le 0\\ +f(x) & ;\ f(x)\ge 0\end{cases}$$

نبحث عن إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}-\{1\}$:

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		1		$+\infty$
$2x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)=\frac{2x-1}{x-1}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	


من جدول الإشارة أعلاه ينتج:

$$g(x)=\begin{cases}-f(x) & ;\ x\in\left[\frac{1}{2}\,;1\right[\\ +f(x) & ;\ x\in\left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right]\cup\left]1\,;+\infty\right[\end{cases}$$

ومنه:

- يكون المنحنى البياني $(\mathcal{C}_g)$ الممثل للدالة g منطبقا على المنحنى البياني $(\mathcal{C}_f)$ الممثل للدالة f على المجال $\left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right]\cup\left]1\,;+\infty\right[$ (لأن: $g(x)=f(x)$).

- يكون المنحنى البياني $(\mathcal{C}_g)$ الممثل للدالة g نظيرا للمنحنى البياني $(\mathcal{C}_f)$ الممثل للدالة f بالنسبة إلى حامل محور الفواصل على المجال $\left[\frac{1}{2}\,;1\right[$ (لأن: $g(x)=-f(x)$).



6) نعتبر الدالة h المعرفة على $\left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right]\cup\left]1\,;+\infty\right[$ بـ: $h(x)=\sqrt{\frac{2x-1}{x-1}}$

أ- نتحقق أن الدالة h مركبة من الدالة f ودالة مرجعية يطلب تعيينها:

لاحظ المخطط التالي:

$$x\xrightarrow{f}\frac{2x-1}{x-1}\xrightarrow{t}\sqrt{x}$$
$$h=tof$$

ومنه:

الدالة h مركبة من الدالة f ودالة مرجعية t هي الدالة الجذر التربيعي $x\longmapsto\sqrt{x}$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ب- **نستنتج اتجاه تغير الدالة h على المجالين $\left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right]$ و $]1\,;+\infty[$:**

بما أن:

- الدالة f متناقصة تماما على المجالين $\left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right]$ و $]1\,;+\infty[$.

أنظر نتيجة السؤال 2).

- والدالة الجذر التربيعي $t : x \mapsto \sqrt{x}$ متزايدة تماما على المجال $[0\,;+\infty[$.

مع: $f\left(\left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right] \cup\,]1\,;+\infty[\right) \subset [0\,;+\infty[$

فإن: الدالة $h = tof$ متناقصة تماما على المجالين $\left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right]$ و $]1\,;+\infty[$.

أنظر المبرهنة في الصفحة رقم **1**.



- جميع حقوق النشر محفوظة -
2020/2019

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com