najah213.com · نجاح 213

السنة الثانية هندسة الطرائق (2GP)

الأستاذة : نورة ايت مزيان

26 – افريل- 2021

المدة : ساعة و نصف

الفرض(1) للفصل الثاني

التمرين الأول : (07 ن)

لدينا الجزيئات التالية : ① $CH_3-CH=CH-CH_3$ و ② $CH_3-(CH_2)_3-COOH$

③ $CH_3-CH_2-C(CH_3)=C(CH_3)-CH(OH)-CH_3$

أ) - أعط متماكب موضعي ، متماكب سلسلي و متماكب وظيفي لكل من الجزئين ① و② و أسمائها النظامية (4.0 ن)

ب)- يمتاز الجزيء ③ بنوعين من التماكب الفراغي ما هما مبررا اجابتك ؟ مثل المتماكبات الفراغية لكل نوع (3.0 ن)

التمرين الثاني : (13 ن)

1- ألسين (A) نسبة الكربون فيه $\%C = 88,9$

أ- أوجد الصيغة الجزيئية المجملة لهذا الألسين (A) (1.5 ن)

ب- اقترح كل الصيغ نصف المفصلة الممكنة له (1 ن)

2- نجري انطلاقا من الألسين (A) سلسلة التفاعلات التالية :

1) $(A) \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} 2\,(B)$

2) $(A) \xrightarrow[Pd_{(des)}]{H_2} (C)$

3) $(C) + H_2O \xrightarrow{H_2SO_4} (D)$

4) $(D) \xrightarrow[350°C]{Cu} (E) + H_2$

5) $(B) + (D) \rightleftharpoons (F) + H_2O$

6) $(E) + DNPH \longrightarrow (G) + H_2O$

أ- أوجد الصيغ نصف المفصلة للمركبات المجهولة :
G, F, E, D, C, B, A بإعادة كتابة التفاعلات (3 ن)

ب- ماذا يعطي المركب (E) مع كاشف طولنس
مبررا اجابتك ؟ (1 ن)

ج - ما اسم التفاعل 5) ، ما مردوده ، برر اجابتك (1.5 ن)

3- بإعتبار المركب (D') متماكب موضعي مع المركب (D)

أ- أكتب معادلة تفاعل حذف الماء من المركب (D') بوجود H_2SO_4 عند 140°C (بالصيغ نصف المفصلة) (1.5 ن)

ب- ما نوع الوظيفة العضوية التي يحملها المركب الناتج ؟ (0.5 ن)

4- يتم تحضير المركب التالي : $CH_3-CHOH-CHOH-CH_3$ انطلاقا من المركب (C) في مرحلتين :

أ- أكتب معادلة التفاعل الحادث في كل مرحلة موضحا شروط التفاعل . (2 ن)

ب- ما اسم التفاعل الحادث في كل مرحلة ؟ (1 ن)

بالتوفيق

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

السنة الثانية هندسة الطرائق (2GP)
الأستاذة : نورة ايت مزيان

المادة : التكنولوجيا

تصحيح الفرض (1) الفصل الثاني

تصحيح التمرين الأول (7 نقاط)

التنقيط الجزئي	التنقيط الكلي
	4,0
0,75	
0,75	
0,75	
0,25	
0,75	
0,75	
0,5	3,0
0,5	
1,0	
1,0	


أ)- المتماكبات المستوية للجزيئين ① و ② و اسمائها النظامية :

	متماكب موضعي	متماكب سلسلي	متماكب وظيفي
①	$CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$ بوت - 1 – ن But – 1 – ène	$CH_3 - C(CH_3) = CH_2$ 2- ميثيل بروب - 1 – ن 2-Methylprop – 1 – ène	$CH_2 - CH_2$ / $CH_2 - CH_2$ حلقي بوتان Cyclobutane
②	لا يوجد لأن وظيفة الحمض الكربوكسيلي تكون دائما على الكربون الأول	$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - COOH$ حمض 3- ميثيل بوتانويك Acide 3-methylbutanoique	$CH_3 - CH_2 - C(=O) - O - CH_2 - CH_3$ بروبانوات الأيتيل Propanoate d'ethyle


ب)- يمتاز الجزيء ③ بنوعين من التماكب الفراغي ما هما :

✓ التماكب الضوئي (الإينونسيوميري) لاحتوائه على كربون غير متناظر C* هو الكربون C_2
✓ التماكب الهندسي لاحتوائه على رابطة مضاعفة (C=C)

☜ المتماكبات الضونية :



☜ المتماكبات الهندسية :



تصحيح التمرين الثاني (13 نقاط)

التنقيط الجزئي	التنقيط الكلي
0,25	1,5
0,25	
0,25	
0,5	
0,25	

1- لدينا ألسين (A) نسبة الكربون فيه تقدر بـ 88,9 % :

أ)- تعيين الصيغة الجزيئية المجملة لهذا الألسين :

☜ علما أن الصيغة العامة للألسينات : C_nH_{2n-2}

$M_A = 12n + 2n - 2 \Longrightarrow \boxed{M_A = 14n - 2}$

☜ باستعمال قانون النسب : $\frac{m_c}{\%C} = \frac{M_A}{100} \Longrightarrow \frac{12\,n}{88,9} = \frac{14\,n - 2}{100}$

$88,9\,(14\,n - 2) = 1200\,n \Longrightarrow 1244,6\,n - 177,8 = 1200\,n$

$1244,6\,n - 1200\,n = 177,8 \Longrightarrow 44,6\,n = 177,8 \Longrightarrow n = \frac{177,8}{44,6} \Longrightarrow \boxed{n = 4}$

☜ منه الصيغة الجزيئية المجملة للألسين (A) : $\boxed{C_4H_6}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ب)- الصيغ نصف المفصلة الممكنة له :

1,0 — 0,5 — 0,5

$CH_3 - C\equiv C - CH_3$; $CH_3 - CH_2 - C\equiv CH$

2- نجري سلسلة من تفاعلات كيميائية انطلاقا من المركب (A) :

5,5

أ- الصيغ نصف المفصلة للمركبات : G , F , E , D , C , B , A

0,5 × 6

1- $CH_3 - C\equiv C - CH_3 \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} 2\ CH_3 - C(=O)OH$
(A) (B)

2- $CH_3 - C\equiv C - CH_3 \xrightarrow[Pd_{(des)}]{H_2} CH_3 - CH = CH - CH_3$
(A) (C)

3- $CH_3 - CH = CH - CH_3 + H_2O \xrightarrow{H_2SO_4} CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH_3$
(C) (D)

4- $CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH_3 \xrightarrow[350°C]{Cu} CH_3 - CH_2 - C(=O) - CH_3 + H_2$
(D) (E)

5- $CH_3 - C(=O)OH + CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH_3 \rightleftharpoons CH_3 - C(=O) - O - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3 + H_2O$
(B) (D) (F)

6- $CH_3 - CH_2 - C(=O) - CH_3 + DNPH \longrightarrow CH_3 - CH_2 - C(CH_3) = N - NH - C_6H_3(NO_2)_2 + H_2O$
(E) (G)

1,0 — ب- المركب (E) : لا يتفاعل مع كاشف طولنس لأنه سيتون لا يمتلك خواص ارجاعية

1,5 — ج- اسم التفاعل 4 : أسترة و أكبر مردود له 60 % لأن الكحول المستعمل كحول ثانوي

2,0 — 3- باعتبار المركب(D') متماكب موضعي للمركب (D) :

أ- معادلة تفاعل حذف الماء من المركب (D') عند 140°C بوجود H_2SO_4 :

1,5 — $2\ CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH \xrightarrow[140°C]{H_2SO_4} CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3 + H_2O$

0,5 — ب- نوع الوظيفة التي يحملها المركب الناتج : وظيفة أيثير

3,0 — 4- مراحل تحضير المركب التالي $CH_2OH - CH_2OH$ انطلاقا من المركب (C):

أ- معادلات التفاعلات الحادث في المرحلتين :

1,0 — $CH_3 - CH = CH - CH_3 + Ag_2O \xrightarrow{200°C} CH_3 - CH(O) - CH - CH_3 + 2Ag$

1,0 — $CH_3 - CH(O) - CH - CH_3 + H_2O \longrightarrow CH_3 - CH(OH) - CH(OH) - CH_3$

0,5 — ب- اسم التفاعل الحادث في كل مرحلة : - في المرحلة الأولى ايبوكسدة (Epoxydation)

0,5 — - في المرحلة الثانية هيدروكسلة مفروقة (Trans hydroxylation)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com