najah213.com · نجاح 213

الفرض الثالث للسنوات الثانية علوم تجريبية

التمرين الأول :

أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ ان وجد

1/ 2004π قيس رئيسي للقوس التي قيسها $0rad$

2/ القيس الرئيسي للقوس التي قيسها $\frac{1443\pi}{6}$ هو $\frac{7\pi}{6}$

3/ $(-\pi)$ هو قيس مكافىء للقوس التي طولها π

4/أذاكان $(\vec{u};\vec{v}) = 2\pi k / k\epsilon\mathbb{Z}$ فإن الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطين خطيا

5/ من أجل كل شعاع غير معدوم $\vec{u}$ فإن $-\pi = (\vec{u};-\vec{u})$

6/: $\left(-\overrightarrow{OF};\overrightarrow{OJ'}\right) = \left(\overrightarrow{OF},\overrightarrow{OI}\right) + \pi$

التمرين الثاني:

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o;\vec{oi};\vec{oj})$وحدة الطول cm2 نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ

$f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$: حيث (C_f) تمثيلها البياني

1-أحسب نهايات الدالة f عند حدود مجال تعريفها وفسر هندسيا النتائج التي تحصلت عليها

2-أدرس اتجاه تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

3-بين أن الدالة f تكتب من الشكل: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ حيث:a,b,c أعداد حقيقية يطلب تعيينها

4-بين أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل يطلب تعيين معادلته

5-أرسم (C_f) والمستقيمات المقاربة

Sabrine.sabrine49@gmail.com

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الحل النموذجي للفرض الأخير في مادة الرياضيات مرفق بسلم التنقيط للسنوات الثانية عتج الأستاذة عون الله صورية

الموضوع	التمرين الأول	العلامة
الزوايا الموجهة	1/ خطأ التعليل:rad0 هو القيس الرئيسي للقوس π2004 وليس العكس 2/خطأ التعليل القيس الرئيسي لـ $\frac{1443\pi}{6}$ هو $\frac{\pi}{2}$ 3/$(-\pi)$ هو قيس مكافيء لـ π صحيح 4/ $(\vec{u};\vec{v}) = 2\pi k$ من أجل كل عدد صحيح نسبي k صحيح 5/خطأ التعليل:$(\vec{u};-\vec{u}) = \pi$ 6/خطأ التعليل:$\left(-\overrightarrow{OF};\overrightarrow{OJ'}\right) = \left(\overrightarrow{OF};\overrightarrow{OJ'}\right) + \pi$	0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 1

الموضوع	االتمرين الثاني	العلامة
الدوال	$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x^2+1}{x-1} = \lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ التفسير الهندسي: إحتمال وجود مستقيم مقارب مائل $\lim\limits_{x\to<1}\frac{x^2+1}{x-1} = -\infty$ التفسير الهندسي: (C_f)يقبل مستقيم مقارب عمودي في جوار $-\infty$ معادلته $\times= 1$ $\lim\limits_{x\to<1}\frac{x^2+1}{x-1} = +\infty$ التفسير الهندسي: (C_f)يقبل مستقيم مقارب عمودي في جوار $-\infty$ معادلته $\times= 1$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2+1}{x-1} = \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ التفسير الهندسي: إحتمال وجود مستقيم مقارب مائل في جوار $+\infty$ دراسة إتجاه التغير: الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}-\{2\}$ودالتها المشتقة $f'(x) = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$ بما أن المقام موجب تماما فإن إشارة المشتقة من إشارة البسط $\Delta = 8$ $\begin{cases} x_1 = 1-\sqrt{2} \\ x_2 = 1+\sqrt{2} \end{cases}$ ومنه نستنتج أن إشارة الدالة المشتقة كما يلي: جدول تغيرات الدالة :f	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0.5 0.5 0.5 0,5 1

x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		1		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		1		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗		↘	‖	↘		↗	

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

حساب القيم الحدية:

0.5 $f(1-\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}+2$

0.5 $f(1+\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}+2$

إيجاد:c,b,a

0.5 0.5 0.5
$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = 2 \end{cases}$$

إثبات أن $y = x+2$ مستقيم مقارب مائل


0,5 $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(x+1)] = 0$

0,5 $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)] = 0$

ومنه بيان الدالة يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $y = x+2$

التمثيل البياني:

2



Sabrine.sabrine49@gmail.com

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com