najah213.com · نجاح 213

مديرية التربية لولاية ميلة — متقن علي جعفر - تاجنانت

﴿ إختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات﴾ 2016/02/29

الأقسام: 2 علوم تجريبية — **المدة:** ساعتان

التمرين الأول: (8 نقاط)

I) $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية حسابية حدها الأول u_0 و أساسها r بحيث : $\begin{cases} u_1 - u_4 = -6 \\ u_1 + u_5 = 28 \end{cases}$

1) عين أساس هذه المتتالية و حدها الأول .

2) أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n .

3) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = u_o + u_1 + u_2 + ... + u_n$

II) نعتبر المتتالية $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بـــ : $\begin{cases} v_0 = 6 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n - 1 \end{cases}$

1) احسب : v_1, v_2 .

2) نعتبر المتتالية $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بـــ: $w_n = v_n + 2$.

أ -برهن أن (w_n) هي متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

ب -أكتب عبارة w_n بدلالة n ثم استنتج عبارة v_n بدلالة n .

ت -أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = w_o + w_1 + w_2 + ... + w_n$

ث -استنتج عبارة S'_n بدلالة n حيث : $S'_n = v_o + v_1 + v_2 + ... + v_n$

التمرين الثاني: (12 نقطة)

f دالة عددية لمتغير حقيقي x معرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 3\}$ بالشكل : $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 2x - 3}$

و ليكن $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) بين أنه مهما يكن $x \in \mathbb{R} - \{-1; 3\}$: $f(x) = 1 + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-3}$ حيث c, b عددان حقيقيان ثابتان يطلب تعيينهما.

2) أدرس تغيرات الدالة f و شكل جدول تغيراتها.

3) بين أن المنحني $(\mathcal{C}_f)$ يقبل ثلاث مستقيمات مقاربة يطلب تعيين معادلاتها.

4) عين نقط تقاطع المنحني $(\mathcal{C}_f)$ مع محوري الإحداثيات.

5) بين أنه مهما يكن $x \in D_f$ و $2 - x \in D_f$ فإن : $f(2-x) = f(x)$

6) أكتب معادلة المماس (D) للمنحني $(\mathcal{C}_f)$ في النقطة التي فاصلتها 2.

7) أنشئ $(\mathcal{C}_f)$ و (D).

8) عين بيانيا **عدد و إشارة** حلول المعادلة : $f(x) = 6$.

أستاذ المادة: يوسفي كمال — www.youcefimaths.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

منقذه علي جعفر-ناجانان
المستوى: 2 علوم تجريبية
الأستاذ: يوسفي ك

الحل النموذجي للاختبار الأول

التمرين الأول:

$(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية حسابية أساسها r حيث:

$$\begin{cases} U_1 - U_4 = -6 \\ U_1 + U_5 = 28 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_0 + r - (U_0 + 4r) = -6 \\ U_0 + r + U_0 + 5r = 28 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3r = -6 \\ 2U_0 + 6r = 28 \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = 2 \\ U_0 = 8 \end{cases}$$ (0,5) (0,5)

كتابة عبارة الحد العام.

$U_n = U_0 + nr$

$U_n = 8 + 2n$ (1)

3) حساب المجموع

$S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \cdots + U_n$

$= \frac{n+1}{2}(U_0 + U_n)$

$= \frac{n+1}{2}(8 + 8 + 2n)$

$S_n = (n+1)(8+n)$ (1)

II

$$\begin{cases} V_0 = 6 \\ V_{n+1} = \frac{1}{2}V_n - 1 \end{cases}$$

$V_1 = \frac{1}{2}V_0 - 1 = 2$ (0,5)

$V_2 = \frac{1}{2}V_1 - 1 = 0$.

2) نعتبر المتتالية (W_n) المعرفة بـ

$W_n = V_n + 2$

أ) برهان أن (W_n) هي متتالية هندسية

$W_{n+1} = V_{n+1} + 2$

$= \frac{1}{2}V_n - 1 + 2$

$= \frac{1}{2}V_n + 1$ (1)

$= \frac{1}{2}(V_n + 2) = \frac{1}{2}W_n$

وعليه (W_n) هي متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول

(0,5) $W_0 = V_0 + 2 = 8$.

ب/ عبارة الحد العام W_n.

$W_n = W_0 \cdot q^n$

$= 8 \times (1/2)^n$ (0,5)

استنتاج عبارة V_n

$V_n = W_n - 2$

$V_n = 8(1/2)^n - 2$ (0,5)

ت) حساب المجموع S_n.

$S_n = W_0 + W_1 + W_2 + \cdots + W_n$

$= W_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1-q} = 8 \times \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2}$

$S_n = 16\left(1 - (1/2)^{n+1}\right)$ (1)

ث: استنتاج عبارة:

$S'_n = V_0 + V_1 + \cdots + V_n$

$= (W_0 - 2) + (W_1 - 2) + \cdots + (W_n - 2)$

$= W_0 + W_1 + \cdots + W_n - 2(n+1)$

$= 16\left(1 - (1/2)^{n+1}\right) - 2(n+1)$ (1)

التمرين الثاني:

$f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 2x - 3}$ $\quad D_f = \mathbb{R} - \{-1, 3\}$

1/ برهان أنه مهما كان $x \in \mathbb{R} - \{-1, 3\}$

$f(x) = 1 + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-3}$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$f(x)=\frac{(x+1)(x-3)+b(x-3)+c(x+1)}{(x+1)(x-3)}$

$=\frac{x^2+x-3x-3+bx-3b+cx+c}{(x^2-2x-3)}$

$=\frac{x^2+(b+c-2)x+c-3b-3}{(x^2-2x-3)}$

بالمطابقة نجد:

$\begin{cases} b+c-2=-2 \\ c-3b-3=-15 \end{cases}$ $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} b+c=0 \\ c-3b=-12 \end{cases}$ (1)

بحل الجملة نجد: $b=3$ و $c=-3$

ومنه $f(x)=1+\frac{3}{x+1}-\frac{3}{x-3}$.

لدراسة تغيرات الدالة f.

$D_f=]-\infty,-1[\cup]-1,3[\cup]3,+\infty[$.

النهايات: (1,5)

$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim \frac{x^2}{x^2}=1$ 0,25

$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim \frac{x^2}{x^2}=1$ 0,25

$\lim_{x\to-1^-} f(x)=\lim \frac{x^2-2x-15}{x^2-2x-3}=-\infty$ 0,25

($x^2-2x-15\to -12$, $x^2-2x-3\to 0^+$, $x<-1$)

$\lim_{x\to-1^+} f(x)=+\infty$ 0,25

(x^2-2x-3: $+$ sur $]-\infty,-1[$, $-$ sur $]-1,3[$, $+$ sur $]3,+\infty[$)

$\lim_{x\to3^+} f(x)=\lim \frac{x^2-2x-15}{x^2-2x-3}=+\infty$

($x^2-2x-15\to -12$, $x^2-2x-3\to 0^-$, $x>3$)

$\lim_{x\to3^-} f(x)=-\infty$ 0,25

المشتق:

$f'(x)=\frac{(2x-2)(x^2-2x-3)-(2x-2)(x^2-2x-15)}{(x^2-2x-3)^2}$

$=\frac{(2x-2)(12)}{(x^2-2x-3)^2}=\frac{24x-24}{(x^2-2x-3)^2}$ (1)

اشارة $f'(x)$ من اشارة $24x-24$ على D. (0,5)

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$24x-24$		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	$\|\|$	$+$	

جدول التغيرات: (1)

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	$\|\|$	$+$	
$f(x)$	1	$\searrow$	$+\infty$ || $-\infty$	$\searrow$	4	$\nearrow$	$+\infty$ || $-\infty$	$\nearrow$	1

3) المستقيمات المقاربة.

لدينا: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=1$ ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y=1$ بجوار $\pm\infty$ (0,5)

لدينا: $\lim_{x\to-1} f(x)=\pm\infty$ ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=-1$ (0,5)

لدينا: $\lim_{x\to3} f(x)=\pm\infty$ ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=3$ (0,5)

4) التقاطع مع المحاور:

1) مع محور الفواصل: $f(x)=0$ معناه $x^2-2x-15=0$

$\Delta=64$, $x_1=-3$ $x_2=5$

ومنه $(C)\cap(xx')=\{A(-3,0), B(5,0)\}$ (0,5)

ب) مع محور التراتيب

$f(0)=5$ ومنه $(C)\cap(yy')=\{C(0,5)\}$ (0,5)

5) برهان أن $\forall x\in D_f$, $2-x\in D_f$ و $f(2-x)=f(x)$.

لدينا: $f(x)=1+\frac{3}{x+1}-\frac{3}{x-3}$.

$f(2-x)=1+\frac{3}{2-x+1}-\frac{3}{2-x-3}$

$=1+\frac{3}{-x+3}-\frac{3}{-x-1}$

$=1-\frac{3}{x-3}+\frac{3}{x+1}=f(x)$ (1)


* نستنتج بيانيا أن منحنى الدالة f يقبل محور تناظر هو المستقيم ذو المعادلة $x=1$

6) كتابة معادلة المماس في النقطة التي فاصلتها 2.

$y=f'(2)(x-2)+f(2)$

$y=\frac{8}{3}(x-2)+5$ $\Leftrightarrow$ $y=\frac{8}{3}x-\frac{1}{3}$ (1)

7) المنحنى: (0,5)



http://www.youcefimaths.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

8) التمس البياني لعددا إشارة حلول المعادلة $f(x)=6$

حلول هذه المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى مع المستقيم $y=6$ (0.5)

إذن: المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة.

(0.5)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com