najah213.com · نجاح 213

الآلاء فى هندسة الطرائق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

– ثانوية دحمان خلاف – عين ولمان– – ثانوية المجاهد رابحي محمد – البويرة–

– ثانوية عمار مرناش – سطيف– – ثانوية تومي عبد القادر – غليزان–

امتحان بكالوريا تجريبي التعليم الثانوي دورة: **مـــــاي 2018**

الشعبـة: **تقــني رياضــي**

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة الطرائق) المدة: **04 سا**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (08 نقاط)

1- ان الاحتراق التام لـ 4,35 g من مركب عضوي (A) صيغته $C_nH_{2n}O$ يعطي 4,05 g من H_2O.

☜ أوجد الصيغة المجملة والصيغ نصف المفصلة الممكنة للمركب (A).

2- يتفاعل المركب (A) مع DNPH ولا يتفاعل مع محلول فيهلنك و يستعمل في التفاعلات الأتية:

1) (A) $\xrightarrow[H_2O]{LiAlH_4}$ (B)

2) (B) $\xrightarrow[170\ ^oC]{H_2SO_4}$ (C) + H_2O

3) (C) + HBr ⟶ (D)

4) (D) + Mg $\xrightarrow{R\text{-}O\text{-}R'}$ (E)

5) H_5C_2–COOH +PCl_5 ⟶ (F) +..... + ...

6) (F) +  $\xrightarrow{AlCl_3}$ (G) + ...

7) (G) + (E) ⟶ (H)

8) (H) + H_2O ⟶ (I) + MgBr(OH)

أ– عين الصيغ نصف مفصلة للمركبات (A), (B), (C), (D), (E), (f), (G), (H), (I)

و أكمل التفاعلات الكيميائية (5) و(6).

ب- أكتب تفاعل ارجاع كليمنس للمركب (G).

3- بلمرة المركب (C) تؤدي الى تشكل البوليمير (L) .

أ- ما نوع هذه البلمرة .

ب- اكتب تفاعل البلمرة و أعطي اسم البوليمير (L).

إعداد الأستاذين :عاتي + عماري

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

الآلاء فى هندسة الطرائق

4- نمزج 0,5 مول من حمض الايثانويك مع 0,5 مول من المركب (B) ، ثم نظيف له بعض القطرات حمض الكبريت المركز فنحصل (M) و الماء المتشكل عند التوازن .

أ- اذكر اسم و خصائص هذا التفاعل ثم استنتج مردوده.

ب- أكتب معادلة التفاعل الحاصل.

5- لدراسة حركية التفاعل بين المركب (M) مع NaOH بتراكيز مولية ابتدائية تساوي $0,5\ mol.L^{-1}$

الجدول الآتي يعطي تركيز المركب (M) بدلالة الزمن :

t (min)	0	7	12	17	22	32	42	52
$[M](mol.L^{-1})$	0,5	0,434	0,384	0,344	0,307	0,259	0,227	0,198

أ- أكتب معادلة التفاعل الحاصل بين (M) و NaOH .

ب- اثبت بيانيا ان التفاعل من الرتبة الثانية.

ج- احسب ثابت السرعة K بيانيا.

د- عين قيمة زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

هـ- اعطي قيمة سرعة التفاعل عند الزمن 40 min.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

I) لدينا رباعي ببتيد **A-B-C-D** مكون من اربع احماض المعطاة في الجدول التالي:

الرمز	pKa_1	pKa_2	pKa_R	الصيغة
Glu	2,19	9,67	4,25	$HOOC-(CH_2)_2-CH(NH_2)-COOH$
Phe	1,83	9,13	/////	$C_6H_5-CH_2-CH(NH_2)-COOH$
Lys	2,18	8,95	10,53	$H_2N-(CH_2)_4-CH(NH_2)-COOH$
Met	2,28	9,21	/////	$H_3C-S-(CH_2)_2-CH(NH_2)-COOH$

أ- كيف يمكن الكشف عن هذا الببتيد.

ب- لمعرفة الاحماض الامينية المكونة للببتيد قمنا بالتالي:

- الحمض الاميني (A) يتفاعل مع HNO_3 ثم مع NH_4OH.
- الاحماض الامينية الباقية عند وضعها في جهاز الهجرة الكهربائية عند pH=5,74 سجلنا:

(B)	(C)	(D)
يهاجر نحو المصعد	يهاجر نحو المهبط	يبقى في وسط الجهاز

- اوجد الصيغ الاحماض الأمينية المكونة للببتيد.

ج- عين الصيغة نصف المفصلة للببتيد مع التسمية.

إعداد الأستاذين :عاتي + عماري

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الآلاء فى هندسة الطرائق

د- أكتب صيغة الببتيد عند pH=1 و pH=12.

و- مثل المماكبات الضوئية للحمض الأميني (A) حسب إسقاط فيشر.

II) لتحديد قرينة التصبن I_s لغليسريد ثلاثي مكون لمادة دهنية قمنا بالتجربة التالية:

☜ نأخذ 2,2 g من المادة الدهنية ونضعه مع حجم من كحول معين ثم نظيف 25 mL من محلول KOH الكحولي (0,5 N) بعد التسخين نعاير الفائض من KOH بمحلول HCl (0,5 N) عند التكافؤ $V_{HCl}=10\,mL$.

أ- ما دور الكحول في التجربة.

ب- ما اسم التركيب التجريب المستعمل في التحضير .

ج- برهن العلاقة أن: $I_s=12,75\times(V_T-V_E)$ ثم احسب قيمتها. علما أن: $KOH=56,1\,g.mol^{-1}$

التمرين الثالث:(06 نقاط)

I) يحترق الهيدروجين وفق التفاعل التالي :

$$H_{2(g)}+\frac{1}{2}O_{2(g)}\longrightarrow H_2O_{(\ell)} \qquad \Delta H_1^\circ=-286\,kJmol^{-1}$$

- أحسب طاقة تشكل الرابطة $\Delta H_f^\circ(H\text{-}H)$.

علما أن:

$\Delta H_{vap}^\circ\,(kJ.mol^{-1})$	$E_{(O-H)}\,(kJ.mol^{-1})$	$E_{(O=O)}\,(kJ.mol^{-1})$
44	|463|	|498|

II) يحترق السيانوميد $CH_2N_{2(s)}$ عند 25 ° C :

1- أكتب معادلة الإحتراق.

2- أحسب أنطالبي الإحتراق ΔH_{comb}° .


يعطى: $\Delta H_f^\circ(CH_2N_2)_{(s)}=58.79kJ.mol^{-1}$, $\Delta H_f^\circ(CO_2)_{(g)}=-393kJ.mol^{-1}$

3- أحسب الفرق (Q_P-Q_V) عند 25 ° C. **حيث:** R = 8 .314 J/mol .K

4- احسب أنطالبي الإحتراق عند 75 °C .

المركب	$(CH_2N_{2(s)})$	$(CO_{2(g)})$	$(H_2O_{(\ell)})$	$(N_{2(g)})$	$(O_{2(g)})$
$Cp(Jmol^{-1}.K^{-1})$	78, 20	37.20	75.29	29.12	29.36

III) تتمدد كتلة 67,8 g من غاز مثالي و هو غاز الأزوت N_2 تمددا عكسيا عند درجة حرارة ثابتة T = 25 °C . ويحدث التمدد وفق المخطط التالي من حالة **1** إلى حالة 2 .



1- أوجد حجم الغاز V_1 قبل تمدده.

2- أحسب العمل W و ماذا تستنتج.

3- عين ΔU و Q .

يعطى: M(N) =14 g/mol , R = 8.314 J/mol.K

إعداد الأستاذين :عاتي + عماري


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الآلاء فى هندسة الطرائق

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (05 نقاط)

1. انطلاقا من المركب (A) يمكن تحضير المركب **(H)** وفق سلسلة التفاعلات التالية:



أ- أوجد الصيغ نصف المفصلة للمركبات(A)،(B)،(C)،(D)،(E)،(F)،(G) .

ب-سم التفاعلين رقم 01 و05. واعطي التسمية المشهورة للمركب (H).

ج- ما هو الوسيط الذي يمكن وضعه مكان $\frac{LiAlH_4}{H_2O}$ في التفاعل رقم 06.

2. تم تحضير المركب (H) مخبريا انطلاقا من وضع 5,5 g من المركب (G) و 7 mL من أندريد الايثانويك مع مذيب وماء مقطر داخل دورق كروي ، نركب مكثف مائي فوق الدورق ونقوم بالتسخين . بعد الفصل والتنقية تحصلنا على كتلة قدرها 4,62 g من المركب (H).

أ- ما اسم التركيب المستعمل في مرحلة التحضير.

ب-ما اسم العملية التي استعملت لتنقية المركب (H) .

ج- احسب مردود التجربة (R) اذا افترضنا ان نقاوة المركب (H) المحضر (P=90%)

يعطى: $O= 16\,g.mol^{-1}$ $H=1\,g.mol^{-1}$ $C=12\,g.mol^{-1}$ $N=14\,g.mol^{-1}$

إعداد الأستاذين: عاتي + عماري

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الآلاء فى هندسة الطرائق

التمرين الثاني:(05 نقاط)


I. لديك ثلاثي غليسيريد قرينة تصبنه $I_S = 264.15$ و نريد معرفة صيغته نصف المفصلة , التحليل المائي لمول واحد من ثلاثي غليسيريد يعطي 1 مول من غليسيرول و ثلاث أحماض دهنية مختلفة نرمز لها بالرمز : A_1 , A_2 , A_3 حيث:

☜ الحمض الدهني A_1 ترميزه هو : $C_{16} : 1\Delta^9$

☜ الحمض A_2 هو حمض دهني مشبع : لتعديل 1.28 g من A_2 يلزم 5 mL من محلول NaOH تركيزه المولي 1mol/L. **حيث:** $M_{NaOH} = 40\ g.mol^{-1}$

1. أحسب الكتلة المولية لثلاثي الغليسيريد TG .
2. أكتب الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A_1 .
3. أوجد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A_2 .
4. أستنتج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A_3 علما أنه لا يثبت اليود

II. يتأين حمض الأسبارتيك عند تغير الـ pH حسب المخطط التالي:




أ- اوجد الصيغ A,B,C.

ب- استنتج قيم pKa_R ,pH_i , pKa_2 .

ج- احسب قيمة pKa_1 لحمض الأسبارتيك.

د- نضع مزيج من الاحماض الامينية Arg,Asp,Val في جهاز الهجرة الكهربائية ذي pH محدد فنتحصل على النتائج الموضحة في الوثيقة التالية:



1- استنتج قيمة pH الوسط.

2- وضح على الرسم موضع الحمضين المتبقيين على جهاز الهجرة مع التعليل .

يعطى: $pH_{i(Arg)} = 10,76$

إعداد الأستاذين :عاتي + عماري

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الآلاء فى هندسة الطرائق

التمرين الثالث: (05 نقاط)

❖ إذا علمت أن كمية الحرارة الناتجة من احتراق 0,5 mol من ألسين C_nH_{2n-2} في مسعر حراري هي (– 969,35 kJ)

1- استنتج كمية الحرارة التي اكتسبها المسعر و محتواه .

2- أحسب أنطالبي الإحتراق ΔH°_{comb} .

3- أكتب معادلة احتراق الألسين .

4- استنتج الصيغة النصف مفصلة للألسين .

علما أن : $\Delta H^{\circ}_f(H_2O)_{(\ell)} = -286\ kJ.mol^{-1}$, $\Delta H^{\circ}_f(CO_2)_{(g)} = -393\ kJ.mol^{-1}$

$\Delta H^{\circ}_f(C_nH_{2n-2})_{(g)} = 186.6\ kJ.mol^{-1}$, $R = 8.314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$

5- أحسب التغير في الطاقة الداخلية ΔU لتفاعل الإحتراق عند 25°C .

6- أكتب معادلة تشكل الألسين ثم أحسب $\Delta H^{\circ}_{sub}(C_{(s)})$.

الرابطة	(H-H)	(C≡C)	(C-C)	(C-H)
$\Delta H^{\circ}_d(kJ.mol^{-1})$	436	839	348	413

التمرين الرابع: (05 نقاط)

☜ يتفكك غاز النشادر $NH_3(g)$ على سطح البلاتينيوم وفق التفاعل التالي :

$$NH_{3(g)} \longrightarrow \frac{1}{2}N_{2(g)} + \frac{3}{2}H_{2(g)}$$

☜ لديك الجدول التالي والذي يمثل تغير تركيز $NH_3(g)$ بدلالة الزمن:

t(s)	0	200	400	600	800	1000	1200
$[NH_3]10^{+3}(mol/L)$	2,1	1,79	1,47	1,16	0,86	0,57	0,28

1- بين أن التفاعل من الرتبة صفر (0).

2- أحسب ثابت السرعة k بيانيا .

3- أحسب زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

4- أحسب سرعة التفاعل عند الزمن t=500s .

5- أحسب الزمن اللازم لتفكك 75% من NH_3 .

إعداد الأستاذين :عاتي + عماري

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان بكالوريا الدورة التجريبية2018 :

اختبار مادة :التكنولوجيا(هندسة الطرائق) الشعبة :تقني رياضي المدة :04 سا و 04

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

التمرين الأول :(08 نقاط)

1- ايجاد الصيغة المجملة للمركب (A):


$$C_nH_{2n}O + \frac{3n}{2}O_{2(g)} \longrightarrow n\,CO_2 + n\,H_2O$$


$$1\,mol_{(C_nH_{2n}O)} \longrightarrow n\,mol_{(H_2O)}$$

$$\left|\begin{array}{l} M_{(C_nH_{2n}O)}\ g \longrightarrow n\,M_{(H_2O)}\ g \\ 4,35\,g \longrightarrow 4,05\,g \end{array}\right| \Rightarrow 4,05\times(14n+16) = 4,35\times 18n$$


$$\Rightarrow n = 3 \Rightarrow C_3H_6O$$


❖ الصيغ نصف المفصلة الممكنة:








2- أ- تعين الصيف نصف مفصلة للمركبات:



(A)



(B)



(C)



(D)


(E)



(F)



(G)


(H)



(I)

❖ اكمال التفاعلين:






ب- تفاعل ارجاع كليمنس للمركب (G):



3- أ- نزع البلمرة : بلمرة بالضم.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

ب- تفاعل البلمرة:




Poly(propylene)

4- أ- اسم وخصائص التفاعل:


❖ تفاعل الأسترة (بطيء، محدود، لا حراري،عكوس).

❖ مردود التفاعل: 60% لان المزيج متساوي عدد المولات و الكحول ثانوي.

ب- معادلة التفاعل:



5- أ- التفاعل الحاصل:



ب- اثبات ان التفاعل من الرتبة الثانية:

❖ اكمال الجدول:

t (min)	0	7	12	17	22	32	42	52
$[M](mol.L^{-1})$	0,5	0,434	0,384	0,344	0,307	0,259	0,227	0,198
$\frac{1}{[M]}(mol^{-1}.L)$	2	2,3	2,6	2,91	3,26	3,86	4,41	5,05

❖ رسم المنحنى : $\frac{1}{[M]} = f(t)$



❖ البيان $\frac{1}{[M]} = f(t)$ عبارة عن خط مستقيم موجب الميل لا يمر بالمبدأ ومنه نستنتج ان التفاعل من الرتبة الثانية.

ج- حساب ثابت السرعة بيانيا: حيث k يمثل ميل المماس.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

$$k = tg\alpha = \frac{5,05-2}{52-0} = 0,0586\ L.mol^{-1}\ min^{-1}$$

د- قيمة زمن نصف التفاعل:

❖ **التفاعل من الرتبة الثانية:**

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[M]_0} = \frac{1}{0,0586\times 0,5} = 34,13\,min$$

هـ- قيمة سرعة التفاعل عند الزمن40 دقيقة:

✓ حساب التركيز بعد 40 دقيقة:

$$\frac{1}{[CH_3COOC_2H_5]} = kt + \frac{1}{[CH_3COOC_2H_5]_0}$$

$$= 0,0586\times 40 + \frac{1}{0,5} = 4,344$$

$$[CH_3COOC_2H_5] = \frac{1}{4,344} = 0,23\,mol.L^{-1}$$

✓ حساب السرعة:

$$v = k[CH_3COOC_2H_5]^2$$

$$= 0,0586\times(0,23)^2 = 3,1\times10^{-3}\ mol.L^{-1}\ min^{-1}$$

التمرين الثاني:(06 نقاط)

I) أ- يمكن الكشف عن هذا الببتيد: بمفاعلته مع كاشف بيوري ($OH^- + CuSO_4$) فيظهر اللون البنفسجي .

ب- إيجاد صيغ الاحماض الأمينية المكونة للببتيد:

- الحمض الاميني (A) يتفاعل مع HNO_3 ثم مع NH_4OH فهو حمض أميني عطري (Phe) .
- الاحماض الامينية B و C و D .

• حساب pHi لـ Glu :

$$pHi = \frac{pKa_1 + pKa_r}{2} = \frac{2.19+4.25}{2} = 3.22$$

- $pHi_{(Glu)} \prec pH=5,74$ فإن الحمض الأميني يكون على شكل أنيون ويهاجر نحو القطب الموجب (المصعد) ومنه الحمض الأميني B هو Glu .

• حساب pHi لـ Lys :

$$pHi = \frac{pKa_2 + pKa_r}{2} = \frac{2.18+10.53}{2} = 6,35$$

- $pH_{i(Lys)} \succ pH=5,74$ فإن الحمض الأميني يكون على شكل كاتيون و يهاجر نحو القطب السالب (المهبط) ومنه الحمض الأميني C هو Lys .

• حساب pHi لـ Met :

$$pHi = \frac{pKa_1 + pKa_2}{2} = \frac{2.28+9.21}{2} = 5,74$$


- $pHi_{(Met)} = pH = 5,74$ فإن الحمض الاميني يكون على شكل ثنائي قطب وبالتالي يبقى في وسط الجهاز ومنه الحمض الأميني D هو Met .

إعداد الأستاذ عماري عاتق

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

ج- تعيين الصيغة نصف المفصلة للببتيد مع التسمية :


$$\mathbf{A-B-C-D} \longrightarrow \text{Phe -Glu - Lys-Met}$$




التسمية : **فنيل الانيل غلوتاميل ليزيل مثيونين .**

د- كتابة صيغة الببتيد عند:


pH=1



pH=12



و- تمثيل المماكبات الضوئية للحمض الأميني (**A**) حسب إسقاط فيشر:



II) أ - دور الكحول في التجربة : إذابة المادة الدهنية .

ب - إسم التركيب التجريبي المستعمل في التحضير :التقطير الارتدادي.

ج ـ البرهان على العلاقة $I_s=12,75\times(V_T-V_E)$ ثم حساب قيمتها:

- الحجم اللازم للتصبن هو (V_T-V_E)
- كمية المادة اللازم للتصبن : $n_{KOH}=n_{HCl}=C_{HCl}\times(V_T-V_E)$
- كتلة m_{KOH} اللازمة للتصبن: $m_{KOH}=n_{KOH}\times M_{KOH}=C_{HCl}\times(V_T-V_E)M_{KOH}$

$$\left|\begin{array}{l} m_{(TG)}\ g \longrightarrow m_{(KOH)}\ (mg) \\ 1\ g \longrightarrow I_s \end{array}\right| I_s=\frac{m_{(KOH)}}{m_{(TG)}}=\frac{C_{HCl}\times(V_T-V_E)\times M}{m_{(TG)}}$$

$$=\frac{0,5\times(V_T-V_E)\times 56,1}{2,2}$$

$$=12,75(V_T-V_E)$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

- حساب القيمة:

$$I_s = 12,75 \times (V_T - V_E)$$
$$= 12,75 \times (25-10) = 191,25$$

التمرين الثالث:(06 نقاط)

I) حساب طاقة تشكل الرابطة $E_{(H-H)}$:



$$\Delta H_1 = \Delta H_f^\circ = \Delta H_d(H\text{-}H) + \frac{1}{2}\Delta H_d(O{=}O) - 2\Delta H_d(O\text{-}H) - \Delta H_{vap}$$

$$\Delta H_d(H\text{-}H) = \Delta H_f^\circ - \frac{1}{2}\Delta H_d(O{=}O) + 2\Delta H_d(O\text{-}H) + \Delta H_{vap}$$

$$= -286 - \frac{1}{2}(498) + 2(463) + 44$$

$$= 435 \ \text{kJ/mol} \Rightarrow \Delta H_f^\circ(H\text{-}H) = -435 \ \text{kJ/mol}$$

II) 1- كتابة معادلة إحتراقه :

$$CH_2N_{2(S)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)} + N_{2(g)} \qquad \Delta H_{comb}^\circ = ?$$

2- حساب أنطالبي احتراقه :

$$\Delta H_{comb}^\circ = \sum \Delta H_{f(produits)}^\circ - \sum \Delta H_{f(reactifs)}^\circ$$

$$\Delta H_{comb}^\circ = \Delta H_f^\circ(CO_2)_{(g)} + \Delta H_f^\circ(H_2O)_{(\ell)} + \Delta H_f^\circ(N_2)_{(g)}^{0} - \Delta H_f^\circ(C_2H_2N_2)_{(S)} - \frac{3}{2}\Delta H_f^\circ(O_2)_{(g)}^{0}$$

$$= (-393) + (-286) - (58.79) = -737.79 \text{kJ.mol}^{-1}$$

3- حساب الفرق $(Q_P - Q_V)$ عند $25\,^\circ C$:

$$Q_V = Q_P - \Delta n_g . R.T$$

$$Q_P - Q_V = \Delta n_g . R.T$$

$$\Delta n_g = \sum n_{produits} - \sum n_{réactifs}$$

$$= 2 - \frac{3}{2} = 0.5 \, \text{mol}$$

$$Q_P - Q_V = (0.5).(8.314).(298) = 1238.79 \ \text{J}$$

4- حساب أنطالبي الإحتراق عند $110\,^\circ C$:

$$T_1 = 25 + 273 = 298K$$

$$T_2 = 75 + 273 = 348K$$

إعداد الأستاذين: عياش

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

$$\Delta H_{348}=\Delta H_{298}+\int_{298}^{348}\Delta C_{P1}dT$$

$$\Delta C_P=\sum C_{p(produits)}-\sum C_{p(reactifs)}$$

$$\Delta C_P=C_P\left(CO_{2(g)}\right)+C_P\left(H_2O_{(l)}\right)+C_P\left(N_{2(g)}\right)-C_p\left(CH_2N_{2_{(S)}}\right)-\frac{3}{2}C_P\left(O_{2(g)}\right)$$

$$=(37.20)+(75.29)+(29.12)-(78.20)-\frac{3}{2}(29.36)=19{,}37\ J/mol.K$$

$$\Delta H_{373}=\Delta H_{298}+\Delta C_P(T_2-T_1)$$

$$=-737.79+(19{,}37)(348-298).10^{-3}=-736{,}82\ kJ.mol^{-1}$$

III) 1- حساب حجم الغاز V_1 قبل تمدده:

ط 1)

$$P_1.V_1=n.R.T\Rightarrow V_1=\frac{n.R.T}{P_1}$$

$$n=\frac{m}{M}=\frac{67.8}{28}=2.42\ mol.$$

$$P_1=20\,atm=20\times1.013\times10^5=20.26\times10^5\ Pa$$

$$V_1=\frac{n.R.T}{P_1}=\frac{2.42\times8.314\times298}{20.26\times10^5}=0.0029=0.003m^3$$

$$V_1=0.003m^3=3L$$

ط 2)

$$P_1.V_1=P_2.V_2\Rightarrow V_1=\frac{P_2.V_2}{P_1}=\frac{1\times60}{20}=3L$$

2- حساب العمل W :

- بما أن التحول عند درجة حرارة ثابتة فإن:

$$W_{1\text{-}2}=n.R.T.\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)=n.R.T.\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

$$=(2.42).(8.314).(298).\ln\left(\frac{1}{20}\right)=-17961.58J$$

- ومنه نستنتج أن الغاز انجز عمل $(W<0)$.

3- حساب ΔU و Q :

- بما أن $T=Cte$ فإن $\Delta U=0$.

$$\Delta U=Q+W=0\Rightarrow Q=-W$$

$$=-(-17961.58)=+17961.58J$$


إعداد الأستاذين: عماري + عاتي

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)

التمرين الأول: 05 نقاط

1- أ- ايجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات:



ب- التسمية:

- التفاعل (01): تفاعل السلفنة.
- التفاعل (05): تفاعل النترجة.
- اسم المركب (H) المشهور : الباراسيتامول.

ج- الوسيط هو : $\frac{Fe}{HCl}$ أو $\frac{H_2}{Ni}$.

2- أ- اسم التركيب المستعمل في مرحلة التحضير:التقطير الارتدادي(التسخين بالارتداد)

ب- العملية التي استعملت للتنقية : إعادة البلورة .

ج- حساب مردود التجربة (R) :

- لدينا : $R=\frac{m_p}{m_T}\times 100$
- حساب m_T : من المعادلة رقم (7) نجد:

$$\begin{array}{l} 1\ mol\ (G) \longrightarrow 1\ mol\ (H) \\ \left|\begin{array}{ll} 109\,g & \longrightarrow 151\,g \\ 5{,}5\,g & \longrightarrow m_T \end{array}\right| \Rightarrow m_T=\frac{151\times 5{,}5}{109}=7{,}619\,g \end{array}$$

- حساب m_p النقية: حيث (P=90%)

$$\left|\begin{array}{ll} 4{,}62\,g & \longrightarrow 100\,\% \\ m_P & \longrightarrow 90\,\% \end{array}\right| \Rightarrow m_P=\frac{4{,}62\times 90}{100}=4{,}158\,g$$

- ومنه نجد:

$$R=\frac{m_p}{m_T}\times 100$$
$$=\frac{4{,}158}{7{,}619}\times 100=54.57\,\%$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثاني:05 نقاط

I) 1- حساب الكتلة المولية لثلاثي الغليسيريد TG :

$$\left|\begin{array}{l} M_G\ g \longrightarrow 3M_{KOH}.10^{+3}\ mg \\ 1\ \ g \longrightarrow I_S \end{array}\right| \Rightarrow M_G = \frac{3M_{KOH}10^{+3}}{I_S}$$

$$= \frac{3(56)10^{+3}}{(264.15)} = 636\ g.mol^{-1}$$

2- كتابة الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A_1 :

$$H_3C—(CH_2)_5—CH=CH—(CH_2)_7—COOH$$

3- إيجاد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A_2:

A_2- حمض دهني مشبع صيغته العامة من الشكل $C_nH_{2n}O_2$

$$n_{A_2} = CV_{(NaOH)} = 5.10^{-3} \times 1 = 5.10^{-3} mol$$

$$M_{A_2} = \frac{m}{n} = \frac{1,28}{5.10^{-3}} = 256\ g.mol^{-1}$$

- لدينا : صيغة الحمض من الشكل $C_nH_{2n}O_2$

$$14n + 32 = 256 \Rightarrow n = 16$$

ومنه صيغة الحمض من الشكل : $CH_3-(CH_2)_{14}-COOH$

4- إستنتاج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A_3 :

- بما أنه لا يثبت اليود فهو حمض دهني مشبع صيغته العامة من الشكل $C_nH_{2n}O_2$

$$M_G + 3M_{H_2O} = M_{Glycérol} + M_{A_1} + M_{A_2} + M_{A_3}$$

$$M_{A3} = M_{TG} + 3M_E - M_{GL} - M_{A1} - M_{A2}$$

$$= 636 + 3 \times 18 - 92 - 254 - 256$$


$$= 88 g.mol^{-1}$$

- لدينا : صيغة الحمض من الشكل $C_nH_{2n}O_2$

$$14n + 32 = 88 \Rightarrow n = 4$$

ومنه صيغة الحمض من الشكل : $CH_3-(CH_2)_2-COOH$

II) أ . إيجاد الصيغ A,B,C:



ب- استنتاج قيم pKa_2 , pH_i ,pKa_R :

$$pKa_2 = 9.6 \quad \cdots \quad pH_i = 2.77 \qquad pKa_R = 3.66$$

ج- حساب قيمة pKa_1 لحمض الأسبارتيك:

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


$$pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_R}{2} = \frac{pKa_1 + 3,66}{2} = 2.77$$

$$pKa_1 = 2(pH_i) - 3,66 = 2(2.77) - 3,66 = 1.88$$

$$pKa_1 = 1.88$$

د- 1 . استنتج قيمة pH الوسط : **pH = 5,96**

د- 2 . التوضيح على الرسم موضع الحمضين المتبقيين على جهاز الهجرة مع التعليل :



التعليل :

- بالنسبة لـ Asp :
  - $pH \succ pHi_{(Asp)}$ يكون على شكل أنيون يهاجر نحو القطب الموجب .
- بالنسبة لـ Arg :
  - $pHi_{(Arg)} \succ pH$ يكون على شكل كاتيون يهاجر نحو القطب السالب .

التمرين الثالث:05 نقاط

1- استنتاج كمية الحرارة التي اكتسبها المسعر و محتواه Q :

$$\sum Q = 0$$

$$Q + Q_{comb} = 0 \Rightarrow Q = -Q_{comb}$$

$$= -(-969,35) = 969,35\,kJ$$

2- حساب أنطالبي الإحتراق ΔH°_{comb}

$$\Delta H^\circ_{comb} = \frac{Q_{comb}}{n} = \frac{-969.35}{0.5} = -1938.7\ kJ.mol^{-1}$$

3- كتابة معادلة احتراق الألسين :

$$C_nH_{2n-2(g)} + \frac{(3n-1)}{2}O_{2(g)} \longrightarrow nCO_{2(g)} + (n-1)H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H^\circ_{comb} = -1938.7\,kJ/mol$$

4- استنتاج الصيغة النصف مفصلة للألسين: من معادلة الاحتراق نجد:

$$\Delta H^\circ_{comb} = n\Delta H^\circ_f(CO_2)_{(g)} + (n-1)\Delta H^\circ_f(H_2O)_{(\ell)} - \Delta H^\circ_f(C_nH_{2n-2})_{(g)} - \frac{(3n-1)}{2}\Delta H^\circ_f(O_2)_{(g)}$$

$$\Delta H^\circ_{comb} = n(-393) + (n-1)(-286) - (186.6)$$

$$-1938.7 = n(-393-286) + 286 - 186.6$$

$$n = 3 \Rightarrow C_nH_{2n-2} \Rightarrow C_3H_4 \Rightarrow CH_3\text{-}C \equiv CH$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

5- حساب التغير في الطاقة الداخلية ΔU لتفاعل الإحتراق عند 25°C .

$$C_3H_{4(g)}+4O_{2(g)} \longrightarrow 3CO_{2(g)}+2H_2O_{(l)} \qquad \Delta H^\circ_{comb}=-1938.7\ kJ.mol^{-1}$$

$$\Delta U=\Delta H-\Delta n_g.R.T$$


$$\Delta n_g=\sum n_{produits}-\sum n_{réactifs}$$

$$=3-1-4=-2mol$$

$$\Delta U=-1938.7-(-2)\times(8,314)\times(298)\times10^{-3}$$

$$=-1933.74\ kJ$$

6- كتابة معادلة تشكل الألسين ثم حساب $\Delta H^\circ_{sub}(C_{(s)})$:



$$\Delta H^\circ_f(C_3H_4)=3\Delta H_{sub}(C)+2\Delta H_d(H\text{-}H)-4\Delta H_d(C\text{-}H)-\Delta H_d(C\text{-}C)-\Delta H_d(C\equiv C)$$

$$-3\Delta H_{sub}(C)=2\Delta H_d(H\text{-}H)-4\Delta H_d(C\text{-}H)-\Delta H_d(C\text{-}C)-\Delta H_d(C\equiv C)-\Delta H^\circ_f(C_3H_4)$$


$$-3\Delta H_{sub}(C)=2(436)-4(413)-(348)-(839)-(186.6)$$

$$\Delta H^\circ_{sub}(C)=\frac{-2153.6}{-3}=717\ kJ.mol^{-1}$$

التمرين الرابع: 05 نقاط

1- تبيان أن التفاعل من الرتبة صفر:

- رسم المنحنى $[NH_3]=f(t)$:



- البيان $[NH_3]=f(t)$ عبارة عن خط مستقيم مائل وميله سالب (-K) فالتفاعل من الرتبة صفر

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2- حساب ثابت السرعة K بيانيا:

$$k = -tg\alpha = -\frac{[NH_3]_2 - [NH_3]_1}{t_2 - t_1}$$

$$= -\frac{(0,28 - 2,1)\times 10^{-3}}{1200 - 0} = 1,51\times 10^{-6}\ mol.L^{-1}.s^{-1}$$

3- حساب زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

❖ التفاعل من الرتبة الصفر:

$$t_{1/2} = \frac{[NH_3]_0}{2k} = \frac{2,1\times 10^{-3}}{2\times 1,51\times 10^{-6}} = 695,36\ s$$

$$= 10^4\ s$$

4- حساب سرعة التفاعل عند الزمن t=500s :

❖ لتفاعل من الرتبة الصفر:

$$v = k[NH_3]^0 = k = 1,51\times 10^{-6}\ mol.L^{-1}.s^{-1}$$

5- حساب الزمن اللازم لتفكك 75% من NH_3:

❖ حساب التركيز المتبقي:

$$\left|\begin{array}{l} 100\% \longrightarrow [NH_3]_0\ mol.L^{-1} \\ 25\% \longrightarrow [NH_3]\ mol.L^{-1} \end{array}\right| \Rightarrow [NH_3] = \frac{25\times 2,1\times 10^{-3}}{100} = 0.26\times 10^{-3}\ mol.L^{-1}$$

❖ لدينا التفاعل من الرتبة صفر:

$$[NH_3] = -tk[NH_3]_0 \Rightarrow t = \frac{[NH_3]_0 - [NH_3]}{k}$$

$$= \frac{(2,1-0,26)\times 10^{-3}}{1,51\times 10^{-6}} = 1218.54\,s$$

إعداد الأستاذين: عاتي + عماري

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com