najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية: أحمد مدغري – تيارت | وزارة التربية الوطنية | المستوى: أولى ثانوي

السنة الدراسية: **2017 / 2018** | الشعبة: جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

الفرض الأول للثلاثي الثالث في مادة : **العلوم الفيزيائية** | المدة : **01 ساعة**

Sujet A

<u>التمرين الأول :</u> (10 نقاط)

I- تُمثّل الوثيقة المقابلة نتائج الفحوصات لدم شخص :

نُعطِي : $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_N = 14\ g/mol$ ، $M_C = 12\ g/mol$

Laboratoire d'analyses de biologie médicale :


Glycémie à jeune	1,10 *g/L* 6,11 *mmol/L*
Urée	0,41 *g/L* 6,81 *mmol/L*
Cholestérol	2,29 *g/L* 5,93 *mmol/L*

1- أحسب الكتلة المولية للكوليسترول (*Cholestérol*) باعتماد معطيات الوثيقة .

2- صيغة الكوليسترول هي : $C_xH_{2x-8}O$:

أ/ أعْطِ عبارة الكتلة المولية بدلالة x .

ب/ أحسب x ، و استنتج الصيغة العامة للكوليسترول .



II- تحتوي لاصقة قارورة محلول تجاري المعلومات التالية :

الحجم $1\ L$.

الأمونياك (النشادر) NH_3 .

النسبة المئوية الكتلية للأمونياك (النشادر) $28\ \%$.

الكثافة $d = 0,95$.

الكتلة المولية $M = 17\ g/mol$.

1- ماذا تعني النسبة المئوية الكتلية للأمونياك (النشادر) ؟

2- أحسب التركيز المولي لهذا المحلول .

3- نُريد تحضير محلول S_1 حجمه $V_1 = 500\ mL$ و تركيزه $C_1 = 0,1\ mol/L$ إنطلاقا من المحلول التجاري .

أ/ ما إسم العملية التي بواسطتها يتم تحضير المحلول S_1 ؟

ب/ أذكر الخطوات التجريبية التي يجب إتباعها للحصول على المحلول S_1 ، مع تحديد الأدوات المخبرية اللازمة .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثاني: (10 نقاط)

لتحضير محلول (A) لمحلول كلور الهيدروجين HCl ، قمنا عند الشرطين النظاميين بحلّ حجم $1,12\ L$ من غاز كلور الهيدروجين في $100\ mL$ من الماء المقطر .

1- أحسب التركيز المولي C للمحلول (A) و كذا تركيزه الكتلي C_m .

2- أحسب كمية مادة كلور الهيدروجين HCl المنحلّة في $10\ mL$ من المحلول (A) .

3- نأخذ $10\ mL$ من المحلول (A) ، و نُضيف لها $90\ mL$ من الماء المقطر .

أ/ كيف تُسمى هذه العملية ؟

ب/ أحسب التركيز المولي للمحلول الناتج .

جـ/ أحسب بطريقتين مختلفتين معامل التمديد F .

4- نأخذ $10\ mL$ أخرى من المحلول (A) ، و نُضيف إليها $0,112\ L$ من غاز كلور الهيدروجين في الشرطين النظاميين .

- أحسب التركيز المولي للمحلول الناتج .

5- نأخذ $10\ mL$ أخرى من المحلول (A) ، و نُضيف إليها $15\ mL$ من محلول آخر لكلور الهيدروجين تركيزه المولي $1\ mol/L$ ، أحسب التركيز المولي للمحلول الناتج .

يُعطى : الحجم المولي في الشروط النظامية $V_M = 22,4\ L/mol$.

$M(H) = 1\ g/mol$ ، $M(Cl) = 35,5\ g/mol$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية: أحمد مدغري – تيارت | وزارة التربية الوطنية | المستوى: أولى ثانوي

السنة الدراسية: **2017 / 2018** | الشعبة: جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

الفرض الأول للثلاثي الثالث في مادة : **العلوم الفيزيائية** | المدة : **01 ساعة**

Sujet B

التمرين الأول : (10 نقاط)

I- الكتلة الحجمية للهواء في الشرطين النظاميين لدرجة الحرارة و الضغط $\rho_a = 1{,}29\ g/L$.

الحجم المولي للغازات في الشرطين النظاميين لدرجة الحرارة و الضغط $V_M = 22{,}4\ L.mol^{-1}$.


الكتل الذرية المولية : $C = 12\ g/mol$ ، $H = 1\ g/mol$.

1- عرّف كثافة غاز بالنسبة للهواء ، و بيّن أنها لا تتعلق بدرجة الحرارة و الضغط .

2- استنتج أنّ كثافة غاز بالنسبة للهواء تُعطى بالعبارة : $d = \frac{M}{29}$ ، حيث : M هي الكتلة الجزيئية المولية للغاز .

3- يتألف مزيج غازي من الغازين C_2H_4 و C_3H_6 ، كثافة هذا المزيج بالنسبة للهواء $d = 1{,}06$. لتكن x و y هما النسبتان المئويتان الحجميتان لهذين الغازين في المزيج ، أوجد قيمتي x و y .

II- قارورة محلول تجاري لحمض كلور الهيدروجين (S_0) تحمل البطاقة المقابلة :



1- ما المقصود بالحروف التالية : P ، M ، d ، R ، S ؟

2- ما هو مدلول الصورة على البطاقة ؟

3- أحسب التركيز المولي لهذا المحلول .

4- أذكر الطريقة المتبعة لتحضير محلول لحمض كلور الهيدروجين (S) حجمه $V = 500\ mL$ و تركيزه المولي $C = 0{,}11\ mol/L$ إنطلاقا من (S_0) ، مع ذكر الزجاجيات المستعملة .

تُعطى : الكتل الذرية المولية : $Cl = 35{,}5\ g/mol$ ، $H = 1\ g/mol$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثاني: (10 نقاط)

لتحضير محلول (B) لهيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ قمنا بحلّ $4\ g$ من هيدروكسيد الصوديوم النقي في $200\ mL$ من الماء المقطر .

1- أوجد التركيز المولي للمحلول (B) .

2- أوجد بطريقتين مختلفتين التركيز الكتلي للمحلول (B) .

3- ما هي كمية مادة $NaOH$ المنحلّة في $50\ mL$ من المحلول (B) ؟

4- نأخذ $10\ mL$ من المحلول (B) ، و نُضيف لها $90\ mL$ من الماء المقطر .

أ/ كيف تُسمى هذه العملية ؟

ب/ استنتج معامل التمديد F .

جـ/ أوجد بطريقتين مختلفتين ، التركيز المولي للمحلول الجديد .

5- نأخذ $10\ mL$ أخرى من المحلول (B) ، و نُضيف لها $0{,}4\ g$ من هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$.

- أوجد التركيز المولي للمحلول الجديد .

يُعطى : $M(H) = 1\ g/mol$ ، $M(O) = 16\ g/mol$ ، $M(Na) = 23\ g/mol$.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

تمرينين إضافيين للمراجعة

التمرين الأول :

للحصول على محلول (A) لحمض كلور الهيدروجين HCl تركيزه المولي $C = 2\ mol.L^{-1}$ ، قمنا عند الشرطين النظامين بحلّ حجم $V_{(HCl)}$ من غاز كلور الهيدروجين في $100\ mL$ من الماء المقطر .

1- أوجد قيمة $V_{(HCl)}$.

2- أوجد حجم الماء المقطر اللازم إضافته إلى $10\ mL$ من المحلول (A) حتى نحصل على محلول تركيزه المولي $0{,}5\ mol.L^{-1}$.

3- ما هو حجم غاز كلور الهيدروجين اللازم إضافته عند الشرطين النظامين إلى $10\ mL$ من المحلول (A) حتى نحصل على محلول لكلور الهيدروجين تركيزه المولي $3\ mol.L^{-1}$ ؟

4- نأخذ $10\ mL$ من المحلول (A) و نُضيف لها $40\ mL$ من محلول آخر لكلور الهيدروجين تركيزه $1\ mol.L^{-1}$ ، أوجد تركيز المحلول الجديد .

5- إنطلاقا من المحلول (A) السابق و عن طريق التمديد ، نُريد تحضير عيّنة من المحلول (A) حجمها $V_2 = 20\ mL$ ، و تركيزها المولي $C_2 = 0{,}5\ mol.L^{-1}$ ، أُذكر البروتوكول التجريبي اللازم لذلك .

يُعطى : الحجم المولي في الشروط النظامية $V_M = 22{,}4\ L/mol$.

التمرين الثاني:

1- لتحضير محلول (A) لحمض كلور الهيدروجين HCl تركيزه المولي $C_1 = 0{,}2\ mol.L^{-1}$ ، قمنا بحلّ كمية من غاز كلور الهيدروجين حجمها $V_{(HCl)}$ في $400\ mL$ من الماء المقطر .

- أوجد قيمة $V_{(HCl)}$ في الشرطين النظامين .

2- إنطلاقا من المحلول (A) ، نُريد تحضير محلول آخر لحمض كلور الهيدروجين HCl تركيزه المولي $C_2 = 0{,}1\ mol.L^{-1}$ و حجمه $V_2 = 100\ mL$ ، أي من الحلّين التاليين تختار مع التعليل :

- إضافة حجم V_0 من الماء المقطر ؟

- إضافة حجم V'_{HCl} من غاز كلور الهيدروجين ؟

3- أحسب في الحالة المختارة الحجم (V_0 أو V'_{HCl}) اللازم إضافته إلى حجم معيّن من المحلول (A) ، و كذلك حجم العيّنة المأخوذة من المحلول (A) .

4- نأخذ كمية أخرى من المحلول (A) حجمها $V_1 = 100\ mL$ ، و نُضيف لها كمية من غاز كلور الهيدروجين HCl حجمها $V_{HCl} = 6{,}72\ L$ مُقاسة في الشرطين النظاميين ، أحسب التركيز المولي الجديد للمحلول المأخوذ .

يُعطى : الحجم المولي في الشروط النظامية $V_M = 22{,}4\ L/mol$.